

| 非小細胞肺癌                                        | レジメンシート                  | レジメンシート2                  | レジメンシート3                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <術後>CDDP+VNR療法(short hydration)               | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| <術後>Atezolizumab療法                            | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| <術後>Durvalumab療法                              | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| <術後>Osimertinib療法                             | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| <術後>Pembroliumab療法                            | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| <術後>Pembroliumab療法(6w)                        | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| <術前>Durva+CBDCA+PEM療法                         | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| <術前>Durva+CBDCA+PTX療法                         | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| <術前>Nivolumab+CBDCA+GEM療法                     | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| <術前>Nivolumab+CBDCA+PEM療法                     | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| <術前>Nivolumab+CBDCA+PTX療法                     | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| <術前>Nivolumab+CDDP+GEM療法(short hydration)     | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| <術前>Nivolumab+CDDP+PEM療法(short hydration)     | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| <術前>Pembrolizumab+CDDP+GEM療法(short hydration) | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| <術前>Pembrolizumab+CDDP+PEM療法(short hydration) | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| Afatinib療法                                    | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| Alectinib療法                                   | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| Amivantamab+Lazertinib療法(80kg以上)(SC)          | <a href="#">(1J-8目)</a>  | <a href="#">(2J-8目以降)</a> |                           |
| Amivantamab+Lazertinib療法(80kg未満)(SC)          | <a href="#">(1J-8目)</a>  | <a href="#">(2J-8目以降)</a> |                           |
| Amivantamab+Lazertinib療法(80kg以上)              | <a href="#">(1J-8目)</a>  | <a href="#">(2J-8目以降)</a> |                           |
| Amivantamab+Lazertinib療法(80kg未満)              | <a href="#">(1J-8目)</a>  | <a href="#">(2J-8目以降)</a> |                           |
| Ami+CBDCA+PEM療法(80kg以上)(SC)                   | <a href="#">(1J-8目)</a>  | <a href="#">(2-4J-8目)</a> |                           |
| Ami+CBDCA+PEM療法(80kg未満)(SC)                   | <a href="#">(1J-8目)</a>  | <a href="#">(2-4J-8目)</a> |                           |
| Ami+CBDCA+PEM療法(80kg以上)                       | <a href="#">(1J-8目)</a>  | <a href="#">(2J-8目)</a>   | <a href="#">(3-4J-8目)</a> |
| Ami+CBDCA+PEM療法(80kg未満)                       | <a href="#">(1J-8目)</a>  | <a href="#">(2J-8目)</a>   | <a href="#">(3-4J-8目)</a> |
| Ami+PEM維持療法(SC)                               | <a href="#">(80kg以上)</a> | <a href="#">(80kg未満)</a>  |                           |
| Ami+PEM維持療法                                   | <a href="#">(80kg以上)</a> | <a href="#">(80kg未満)</a>  |                           |
| Atezolizumab+Bev+CBDCA+PTX療法                  | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| Atezolizumab+CBDCA+nab-PTX療法                  | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| Atezolizumab+CBDCA+PEM療法                      | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| Atezolizumab+CDDP+PEM療法(short hydration)      | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| Atezolizumab+PEM療法(メテナス)                      | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| Atezolizumab療法                                | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| BLM心嚢内注入療法(維持)                                | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| BLM心嚢内注入療法(導入)                                | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| CBDCA+nab-PTX療法                               | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| CBDCA+PEM+Gefitinib療法                         | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| CBDCA+PEM療法                                   | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| CBDCA+PTX+Bevacizumab療法                       | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| CBDCA+PTX療法                                   | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| CBDCA+S-1療法                                   | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| CDDP+CPT-11療法                                 | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| CDDP+DTX療法(short hydration)                   | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| CDDP+DTX療法+RT                                 | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| CDDP+GEM療法(short hydration)                   | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| CDDP+PEM療法(short hydration)                   | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |
| CDDP+S-1療法(short hydration)+RT                | <a href="#">シート</a>      |                           |                           |

|                                           |                     |  |  |
|-------------------------------------------|---------------------|--|--|
| CDDP+VNR療法                                | <a href="#">シート</a> |  |  |
| CDDP+VNR療法 + RT                           | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Crizotinib療法                              | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Dabrafenib /Trametinib療法                  | <a href="#">シート</a> |  |  |
| DTX+Ramucirumab療法                         | <a href="#">シート</a> |  |  |
| DTX単独療法                                   | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Durva+PEM療法(メテナス)                         | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Durva+Treme+CBDCA+nab-PTX療法               | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Durva+Treme+CBDCA+PEM療法                   | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Durva+Treme+CDDP+PEM療法(short hydration)   | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Durva+Treme+PEM療法(メテナス)                   | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Durva+Treme療法(メテナス)                       | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Durvalumab維持療法                            | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Durvalumab療法(メテナス)                        | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Entrectinib療法                             | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Erlotinib+Bevacizumab療法                   | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Erlotinib+Ramucirumab療法                   | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Erlotinib療法                               | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Gefitinib療法                               | <a href="#">シート</a> |  |  |
| GEM単独療法                                   | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Low-dose CBDCA+RT療法                       | <a href="#">シート</a> |  |  |
| nab-PTXweekly療法                           | <a href="#">シート</a> |  |  |
| nab-PTX療法                                 | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Necitumumab+CDDP+GEM療法(short hydration)   | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Necitumumab療法(メテナス)                       | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Nivo+Ipi+CBDCA+PEM療法                      | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Nivo+Ipi+CBDCA+PTX療法                      | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Nivo+Ipi+CDDP+PEM療法                       | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Nivo+Ipi維持療法                              | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Nivolumab(2w)+Ipilimumab療法                | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Nivolumab(3w)+Ipilimumab療法                | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Nivolumab療法                               | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Osimertinib+CBDCA+PEM療法                   | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Osimertinib+CDDP+PEM療法(short hydration)   | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Osimertinib+PEM維持療法                       | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Pembrolizumab+CBDCA+nab-PTX療法             | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Pembrolizumab+CBDCA+PEM療法                 | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Pembrolizumab+CBDCA+PTX療法                 | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Pembrolizumab+CDDP+PEM療法(short hydration) | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Pembrolizumab+PEM療法(メテナス)                 | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Pembrolizumab療法                           | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Pembrolizumab療法(6w)                       | <a href="#">シート</a> |  |  |
| PEM単独療法                                   | <a href="#">シート</a> |  |  |
| T-DXT療法                                   | <a href="#">シート</a> |  |  |
| Tepotinib療法                               | <a href="#">シート</a> |  |  |
| VNR単独療法                                   | <a href="#">シート</a> |  |  |
| weeklyCBDCA+PTX療法+RT                      | <a href="#">シート</a> |  |  |

| 小細胞肺癌                                    | レジメンシート                 | レジメンシート2                  |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| AMR単独療法                                  | <a href="#">シート</a>     |                           |
| Atezolizumab+CBDCA+VP-16療法               | <a href="#">シート</a>     |                           |
| Atezolizumab維持療法                         | <a href="#">シート</a>     |                           |
| CBDCA+VP-16療法                            | <a href="#">シート</a>     |                           |
| CDDP+CPT-11療法                            | <a href="#">シート</a>     |                           |
| CDDP+VP-16療法(short hydration)            | <a href="#">シート</a>     |                           |
| CDDP+VP-16療法(short hydration) (RT併用)     | <a href="#">シート</a>     |                           |
| Durvalumab+CBDCA+VP-16療法                 | <a href="#">シート</a>     |                           |
| Durvalumab+CDDP+VP-16療法(short hydration) | <a href="#">シート</a>     |                           |
| Durvalumab維持療法                           | <a href="#">シート</a>     |                           |
| Nogitecan療法                              | <a href="#">シート</a>     |                           |
| Tarlatamab療法                             | <a href="#">(1コース目)</a> | <a href="#">(2コース目以降)</a> |
| weekly CPT-11単独療法                        | <a href="#">シート</a>     |                           |

| 胸腺腫    | レジメンシート             |
|--------|---------------------|
| ADOC療法 | <a href="#">シート</a> |

| 胸腺癌                      | レジメンシート             |
|--------------------------|---------------------|
| Atezolizumab+CBDCA+PTX療法 | <a href="#">シート</a> |
| Atezolizumab維持療法         | <a href="#">シート</a> |
| CBDCA+AMR療法              | <a href="#">シート</a> |

| 悪性胸膜中皮腫                                   | レジメンシート             |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Nivolumab(2w)+Ipilimumab療法                | <a href="#">シート</a> |
| Nivolumab(3w)+Ipilimumab療法                | <a href="#">シート</a> |
| Pembrolizumab+CBDCA+PEM療法                 | <a href="#">シート</a> |
| Pembrolizumab+CDDP+PEM療法(short hydration) | <a href="#">シート</a> |
| Pembrolizumab療法(メテナス)                     | <a href="#">シート</a> |
| Pembrolizumab療法(メテナス)(6w)                 | <a href="#">シート</a> |

レジメン名： **ADOC療法**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|        |       |
|--------|-------|
| 患者ID : | #REF! |
| 患者氏名 : | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |              |
|-----------|--------------|
| 授与スケジュール: | 1 コース 2 1 日間 |
| 目標コース:    | 4 コース        |
| 使用基準:     | class A      |

指示 1： 体重測定 毎日起床時  
指示 2： 利尿剤投与指示 以下条件でフロセミド 1 A iv  
化学療法開始直前と比べて 2 kg 以上の体重増加があり、利尿剤未使用

シスプラチン (CDDP) : シスプラチン注 50mg/100mL/V、10mg/20mL/V  
ドキシソルピシン (ADR) : (ドキシソルピシン塩酸塩注射用) 10mg/V、50mg/V  
ビンクリスチン (VCR) : (オンコビン) 1mg/V  
シクロホスファミド (CPA) : エンドキサン注 100mg/V、500mg/V

| 薬 剤 名   | 標準投与量    | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|---------|----------|-------|---------|-----|
| シスプラチン  | 50 mg/㎡  | #REF! |         | 1   |
| ドキソルビシン | 40 mg/㎡  | #REF! |         | 1   |
| オシコビン   | 0.6 mg/㎡ | #REF! |         | 3   |
| エンドキサン  | 700 mg/㎡ | #REF! |         | 4   |

Day1 ; 1月1日(月)

|       |    |                                           |     |        |
|-------|----|-------------------------------------------|-----|--------|
| 0時00分 | ①  | 生理食塩液 500mL                               |     |        |
|       |    | 2 時間で点滴静注                                 |     |        |
| 1時15分 | 内服 | アプレピタントカプセル 125mg 1 × (1) ドキソリシン開始 1 時間前頃 |     |        |
| 2時00分 | ②  | 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1A + デキサート 9.9mg     |     |        |
|       |    | 15 分で点滴静注                                 |     |        |
| 2時15分 | ③  | 生理食塩液 50mL + ドキソリシン                       | 0mg |        |
|       |    | 全開 (10分以内) で点滴静注                          |     |        |
| 2時25分 | ④  | 生理食塩液 50mL                                |     |        |
|       |    | 全開 (5分以内) で点滴静注                           |     |        |
| 2時30分 | ⑤  | 生理食塩液 700 mL + シスプラチン                     | 0mg | 0.00mL |
|       |    | 2 時間で点滴静注                                 |     |        |
| 4時30分 | ⑥  | 生理食塩液 500mL                               |     |        |
|       |    | 2 時間で点滴静注                                 |     |        |
| 6時30分 | ⑦  | ソリタ T 3 号 500mL × 3                       |     |        |
|       |    | 6 時間 (2時間 × 3) で点滴静注                      |     |        |

Day2 ; 1月2日(火)

|       |    |                                             |
|-------|----|---------------------------------------------|
| 起床後   | 内服 | アプレピタントカプセル 80mg 1 × (2) 起床後                |
| 2時00分 | ①  | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注       |
| 2時15分 | ②  | ソリタ T 3 号 500mL × 3<br>6 時間 (2時間 × 3) で点滴静注 |

Day3 ; 1月3日(水)

| 起床後   | 内服 | アプレピタントカプセル 80mg 1 × (2)                          | 起床後 |
|-------|----|---------------------------------------------------|-----|
| 2時00分 | ①  | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注             |     |
| 2時15分 | ②  | 生理食塩液 50mL + オンコピン (VCR) 0.0mg<br>全開 (5分以内) で点滴静注 |     |
| 2時20分 | ③  | 生理食塩液 50mL<br>全開 (5分以内) で点滴静注                     |     |
| 2時25分 | ④  | ソリタ T 3 号 500mL × 3<br>6 時間 (2時間×3) で点滴静注         |     |

Day4 ; 1月4日(木)

|       |   |                                             |
|-------|---|---------------------------------------------|
| 2時00分 | ① | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注       |
| 2時15分 | ② | 生理食塩液 250mL + エンドキサン (CPA) 0mg<br>2 時間で点滴静注 |
| 4時15分 | ③ | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                         |

Adriano Fornasiero,MD, Otello Daniele,MD, Cristina Ghiotto, MD, et al: Cancer 68:30-33, 1991  
Chemotherapy for Invasive Thymoma A 13-year experience  
2011年4月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2011年4月11日 更新:2016年7月14日

対象： 悪性胸膜中皮腫 1st Line  
レジメン名： **Nivolumab(2w)+Ipilimumab療法**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |             |
|-----------|-------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 4 2 日 |
|-----------|-------------|

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

- ※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)  
重度のInfusion reaction (アフィネン様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等) が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。
- ※ 免疫関連副作用 (間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等) に注意
- ※ **体重30kg未満の患者にはオプジーボの総液量100mLにすること**
- ※ **体重38kg未満の患者にはヤーボイの希釈液を調節すること (最終濃度1-4mg/mL)**

《 使用薬剤 》

ニボルマブ：オプジーボ (240mg/24mL・120mg/mL・100mg/10mL・20mg/2mL)  
イピリムマブ：ヤーボイ (50mg/10mL)

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名 | 標準投与量       | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日     |
|-------|-------------|-------|---------|---------|
| オプジーボ | 240 mg/body | 240   |         | 1.15.29 |
| ヤーボイ  | 1 mg/kg     | #REF! |         | 1       |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

Day1； 1月1日(土)

|       |   |                                                                                                                   |
|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0時00分 | ① | 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                                                                     |
| 0時05分 | ② | 生理食塩液 100mL + オプジーボ注 0mg 0.00mL<br>30 分で点滴静注<br>0.2μm or 0.22μmのフィルター一体型輸液セットを使用する<br>※体重30kg未満の患者には総液量100mLにすること |
| 0時35分 | ③ | 生理食塩液 100mL<br>30 分で点滴静注                                                                                          |
| 1時05分 | ④ | 生理食塩液 30mL + ヤーボイ注 0mg 0.00mL<br>30 分で点滴静注<br>0.2μm or 0.22μmのフィルター一体型輸液セットを使用する<br>※体重38kg未満の場合は適宜生食の量を調節すること    |
| 1時35分 | ⑤ | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                                               |

|           |          |                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Day15,29； | 1月15日(土) | 1月29日(土)                                                                                                          |
| 0時00分     | ①        | 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                                                                     |
| 0時05分     | ②        | 生理食塩液 100mL + オプジーボ注 0mg 0.00mL<br>30 分で点滴静注<br>0.2μm or 0.22μmのフィルター一体型輸液セットを使用する<br>※体重30kg未満の患者には総液量100mLにすること |
| 0時35分     | ③        | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                                               |

REFERENCE

First-line nivolumab plus ipilimumb in unresectable malignant pleural mesothelioma(CheckMate743)  
Paul Baas,Arnaud Scherpereel,Anna K Nowak, et al: Lancet 2021;397:375-86  
2021年9月度化学療法プロトコール審査委員会承認：2021年9月13日

対象： 悪性胸膜中皮腫 1st Line  
レジメン名： **Nivolumab(3w)+Ipilimumab療法**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |             |
|-----------|-------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 4 2 日 |
|-----------|-------------|

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

- ※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)  
重度のInfusion reaction (アフィネン様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等) が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。
- ※ 免疫関連副作用 (間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等) に注意
- ※ **体重30kg未満の患者にはオプジーボの総液量100mLにすること**
- ※ **体重38kg未満の患者にはヤーボイの希釈液を調節すること (最終濃度1-4mg/mL)**

《 使用薬剤 》

ニボルマブ：オプジーボ (240mg/24mL・120mg/mL・100mg/10mL・20mg/2mL)  
イピリムマブ：ヤーボイ (50mg/10mL)

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名 | 標準投与量       | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日  |
|-------|-------------|-------|---------|------|
| オプジーボ | 360 mg/body | 360   |         | 1.22 |
| ヤーボイ  | 1 mg/kg     | #REF! |         | 1    |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

Day1； 1月1日(土)

|       |   |                                                                                                                   |
|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0時00分 | ① | 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                                                                     |
| 0時05分 | ② | 生理食塩液 100mL + オプジーボ注 0mg 0.00mL<br>30 分で点滴静注<br>0.2μm or 0.22μmのフィルター一体型輸液セットを使用する<br>※体重30kg未満の患者には総液量100mLにすること |
| 0時35分 | ③ | 生理食塩液 100mL<br>30 分で点滴静注                                                                                          |
| 1時05分 | ④ | 生理食塩液 30mL + ヤーボイ注 0mg 0.00mL<br>30 分で点滴静注<br>0.2μm or 0.22μmのフィルター一体型輸液セットを使用する<br>※体重38kg未満の場合は適宜生食の量を調節すること    |
| 1時35分 | ⑤ | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                                               |

Day22； 1月22日(土)

|       |   |                                                                                                                   |
|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0時00分 | ① | 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                                                                     |
| 0時05分 | ② | 生理食塩液 100mL + オプジーボ注 0mg 0.00mL<br>30 分で点滴静注<br>0.2μm or 0.22μmのフィルター一体型輸液セットを使用する<br>※体重30kg未満の患者には総液量100mLにすること |
| 0時35分 | ③ | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                                               |

REFERENCE

First-line nivolumab plus ipilimumb in unresectable malignant pleural mesothelioma(CheckMate743)  
Paul Baas,Arnaud Scherpereel,Anna K Nowak, et al: Lancet 2021;397:375-86  
2021年9月度化学療法プロトコール審査委員会承認：2021年9月13日

対象： 肺小細胞癌（進行・再発） 準1st、2nd Line

レジメン名： **AMR単独療法**

コース目

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間           |
| 使用基準：     | class A （次回以降 class B） |

《 注 意 》

準 1 st Lineでは 4 5 mg/m<sup>2</sup>、 2 nd Lineでは 4 0 mg/m<sup>2</sup>を推奨。

《 使 用 薬 剤 》

アムルビシン（AMR）：（カルセド） 50mg/V、20mg/V

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名 | 標準投与量 |                   | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|-------|-------|-------------------|-------|---------|-----|
| カルセド  | 40    | mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1～3 |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

Day1～3； 1月1日(月) ～ 1月3日(水)

|       |   |                                                     |
|-------|---|-----------------------------------------------------|
| 0時00分 | ① | 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1 A + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注 |
| 0時15分 | ② | 生理食塩液 50mL<br>5 分で点滴静注                              |
| 0時20分 | ③ | 生理食塩液 50mL + <b>カルセド 0mg</b><br>全開（10分以内）で点滴静注      |
| 0時30分 | ④ | 生理食塩液 250m L<br>30 分で点滴静注                           |

REFERENCE

Sayaka Onoda, Noriyuki Masuda, Takashi Seto, et al

Phase III trial of amrubicin for treatment of refractory or relapsed small-cell lung cancer:Thoracic oncology research group study 0301.

J Clin Oncol 24：5448-5453, 2006

第 8 回化学療法プロトコール審査委員会承認：2009年6月11日 更新:2011年2月14日

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |            |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|------------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    | アルコールアレルギー |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |            |

※必ず無しを確認

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間                          |
| 目標コース：    | <b>4 コース施行後、Atezolizumabにて維持療法を行う</b> |
| 使用基準：     | class A                               |

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

※ **Infusion reaction** に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アフィキシ-様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用（間質性肺炎患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意

《 使 用 薬 剤 》

アテゾリズマブ（Atezolizumab）：テセントリク点滴静注 1200mg/20mL/V

カルボプラチン（CBDCA）：カルボプラチン点滴静注 150mg/15mL/V、450mg/45mL/V

エトポシド（VP-16）：エトポシド点滴静注 100mg/5mL/V

《 投 与 量 》

|             |                       |                                              |         |     |
|-------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------|-----|
| Cre値（mg/dl） |                       | Calvertの計算式：投与量(mg/body) = 目標AUC値 × (GFR+25) |         |     |
| 目標AUC       | 5                     | GFRはCcrを代用して計算。                              |         |     |
| 薬 剤 名       | 標準投与量                 | 計算値                                          | 投与量(mg) | 投与日 |
| テセントリク      | 1200 mg/body          | 1200                                         |         | 1   |
| カルボプラチン     | 5 AUC                 | #REF!                                        |         | 1   |
| エトポシド       | 100 mg/m <sup>2</sup> | #REF!                                        |         | 1～3 |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

Day1： 1月1日(土)

※**エクステンションチューブを付け、フィルター有ルートで投与すること**

※CVポートより投与の場合はコアレスニードルセットに**セイフTポート**を接続して投与開始

|       |   |                                                                                                        |        |  |
|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 0時00分 | ① | 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                                                          |        |  |
| 0時05分 | ② | 生理食塩液 250mL + テセントリク 0mg<br>60 分で点滴静注<br>(60分で忍容性が良好であれば30分に変更可)<br>0.2μm or 0.22μmのフィルター一体型輸液セットを使用する | 0.00mL |  |
| 1時05分 | ③ | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                                    |        |  |
| 1時10分 | ④ | 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1A + デキサート 13.2mg<br>15 分で点滴静注                                                    |        |  |
| 1時25分 | ⑤ | 生理食塩液 500mL + エトポシド 0mg<br>90 分で点滴静注<br>※フィルターなしルートで投与                                                 | 0.00mL |  |
| 2時55分 | ⑥ | 5 %ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン<br>60 分で点滴静注                                                                  | 0.00mL |  |
| 3時55分 | ⑦ | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                                    |        |  |

|         |         |                                                        |         |
|---------|---------|--------------------------------------------------------|---------|
| Day2～3： | 1月2日(日) | ～                                                      | 1月3日(月) |
| 1時10分   | ①       | 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1A + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注     |         |
| 1時25分   | ②       | 生理食塩液 500mL + エトポシド 0mg<br>90 分で点滴静注<br>※フィルターなしルートで投与 | 0.00mL  |
| 2時55分   | ③       | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                    |         |

REFERENCE

L.Horn, A.S.Manfield, A.Szczesna,et al :N Engl J Med 2018;379:2220-9

First-Line Atezolizumab plus Cehmotherapy in Extensive-Stage Small-Cell Lung Cancer

2019年9月化学療法プロトコル審査委員会承認：2019年9月9日

対象： 小細胞肺癌（進展型） 1st Line

レジメン名： **Atezolizumab維持療法**

コース目

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |              |
|-----------|--------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間 |
|-----------|--------------|

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

**Atezolizumab+CBDCA+VP-16療法後のメンテナンスとして使用すること。**

- ※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)
- 重度のInfusion reaction（アフィキシー様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。
- ※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意

《 使 用 薬 剤 》

アテゾリズマブ：（テセントリク）1200mg／V

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名  | 標準投与量        | 計算値  | 投与量(mg) | 投与日 |
|--------|--------------|------|---------|-----|
| テセントリク | 1200 mg/body | 1200 |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

**※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。**

|       |                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Day1； | 1月1日(土)                                                                                                                |
| 0時00分 | ① 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                                                                        |
| 0時05分 | ② 生理食塩液 250mL + テセントリク 0mg 0.00mL<br>60 分で点滴静注<br>(60分で忍容性が良好であれば30分に変更可)<br><u>0.2μm or 0.22μmのフィルター一体型輸液セットを使用する</u> |
| 1時05分 | ③ 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                                                  |

REFERENCE

L.Horn, A.S.Manfield, A.Szczesna,et al :N Engl J Med 2018;379:2220-9  
First-Line Atezolizumab plus Cehmotherapy in Extensive-Stage Small-Cell Lung Cancer  
2019年9月化学療法プロトコル審査委員会承認：2019年9月9日

対象： 肺小細胞癌（進行・再発） 準1st Line  
レジメン名： **CBDCA+VP-16療法**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |            |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|------------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    | アルコールアレルギー |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |            |

※必ず無しを確認

|           |               |
|-----------|---------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 21～28日間 |
| 目標コース：    | 4 コース         |
| 使用基準：     | class A       |

《 使用 薬 剤 》

カルボプラチン（CBDCA）：カルボプラチン点滴静注 150mg/15mL/V、450mg/45mL/V

エトポシド（VP-16）：エトポシド点滴静注 100mg/5mL/V

《 投 与 量 》

| Cre値（mg/dl） |                      | Calvertの計算式：投与量(mg/body) = 目標AUC値 × (GFR+25) |         |     |
|-------------|----------------------|----------------------------------------------|---------|-----|
| 目標AUC       | 5                    | GFRはCcrを代用して計算。                              |         |     |
| 薬 剤 名       | 標準投与量                | 計算値                                          | 投与量(mg) | 投与日 |
| カルボプラチン     | 5 AUC                | #REF!                                        |         | 1   |
| エトポシド       | 80 mg/m <sup>2</sup> | #REF!                                        |         | 1～3 |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|         |                   |                                        |        |        |
|---------|-------------------|----------------------------------------|--------|--------|
| Day1；   | 1月1日(土)           |                                        |        |        |
| 0時00分   | ①                 | 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1A + デキサート 13.2mg |        |        |
|         |                   | 15 分で点滴静注                              |        |        |
| 0時15分   | ②                 | 生理食塩液 500mL + エトポシド 0mg                | 0.00mL |        |
|         |                   | 90 分で点滴静注                              |        |        |
|         |                   | ※フィルターなしルートで投与                         |        |        |
| 1時45分   | ③                 | 5 %ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン 0mg           |        |        |
|         |                   | 60 分で点滴静注                              |        | 0.00mL |
| 2時45分   | ④                 | 生理食塩液 50mL                             |        |        |
|         |                   | フラッシュ                                  |        |        |
| Day2～3； | 1月2日(日) ～ 1月3日(月) |                                        |        |        |
| 0時00分   | ①                 | 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1A + デキサート 6.6mg  |        |        |
|         |                   | 15 分で点滴静注                              |        |        |
| 0時15分   | ②                 | 生理食塩液 500mL + エトポシド 0mg                | 0.00mL |        |
|         |                   | 90 分で点滴静注                              |        |        |
|         |                   | ※フィルターなしルートで投与                         |        |        |
| 1時45分   | ③                 | 生理食塩液 50mL                             |        |        |
|         |                   | フラッシュ                                  |        |        |

REFERENCE

H. Okamoto, K. Watanabe, H. Kunikane, et al：British Journal of Cancer 97：162-169, 2007  
Randomized phase III trial of carboplatin plus etoposide vs split doses of cisplatin plus etoposide in elderly or poor-risk patients with extensive disease small-cell lung cancer: JCOG 9702  
第9回化学療法プロトコール審査委員会承認：2009年8月6日 更新:2015年6月8日

対象： 肺小細胞癌 （進行・再発） 1st Line  
レジメン名： **CDDP+CPT-11療法**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 28日間              |
| 使用基準：     | class A Day8、15：class C |

《 注 意 》

※**下痢・腸閉塞の患者には禁忌！！**

※ U G T 1 A 1 遺伝子多型検査を考慮

指示 1： 体重測定 毎日起床時

指示 2： 利尿剤投与指示 以下条件でフロセミド 1 A iv

化学療法開始直前と比べて 2 kg以上の体重増加があり、利尿剤未使用

注意： Day4以降も水分摂取が少ない場合や尿量が少ない場合には、輸液を考慮すること

《 使用 薬 剤 》

シスプラチン；（C D D P）：シスプラチン注（50mg/100mL/V、10mg/20mL/V）

イリノテカン（CPT-11）：（イリノテカン塩酸塩点滴静注液） 40mg／2mL／V、100mg／5mL／V

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名  | 標準投与量 |                   | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日    |
|--------|-------|-------------------|-------|---------|--------|
| シスプラチン | 60    | mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1      |
| イリノテカン | 60    | mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1,8,15 |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※**記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。**

|       |         |                                                                    |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| Day1； | 1月1日(土) |                                                                    |
| 0時00分 | ①       | 生理食塩液 500mL<br>2 時間で点滴静注                                           |
| 2時00分 | ②       | 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1 A + デキサート 9.9mg<br>15 分で点滴静注                |
| 2時15分 | ③       | 生理食塩液 250mL + <b>イリノテカン 0mg</b> <b>0.00mL</b><br>90 分で点滴静注         |
| 2時45分 |         | <b>内服</b> アブレビタントカプセル 125mg 1 × (1) シスプラチン開始 1 時間前頃                |
| 3時45分 | ④       | 生理食塩液 <b>700 mL</b> + <b>シスプラチン 0mg</b> <b>0.00mL</b><br>2 時間で点滴静注 |
| 5時45分 | ⑤       | 生理食塩液 500mL<br>2 時間で点滴静注                                           |
| 7時45分 | ⑥       | ソリタ T 3 号 500mL × 3<br>6 時間 (2時間 × 3) で点滴静注                        |

|       |           |                                             |         |
|-------|-----------|---------------------------------------------|---------|
| Day2； | 1月2日(日)   | ～                                           | 1月3日(月) |
| 起床後   | <b>内服</b> | アブレビタントカプセル 80mg 1 × (2) 起床後                |         |
| 2時00分 | ①         | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注       |         |
| 2時15分 | ②         | ソリタ T 3 号 500mL × 3<br>6 時間 (2時間 × 3) で点滴静注 |         |

|          |         |                                                            |
|----------|---------|------------------------------------------------------------|
| Day8,15； | 1月8日(土) | 1月15日(土)                                                   |
| 2時00分    | ①       | 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1 A + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注        |
| 2時15分    | ②       | 生理食塩液 250mL + <b>イリノテカン 0mg</b> <b>0.00mL</b><br>90 分で点滴静注 |
| 3時45分    | ③       | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                        |

REFERENCE

Kazumasa Noda, M.D., Yutaka Nishiwaki, M.D., Masaaki Kawahara, M.D., et al: N Engl J Med, Vol.346, No.2, 85-91, 2002  
Irinotecan plus cisplatin compared with etoposide plus cisplatin for extensive small-cell lung cancer  
第10回化学療法プロトコール審査委員会承認:2009年10月28日 更新:2016年7月14日

対象： 肺小細胞癌 （進行・再発） 1st Line  
レジメン名： **CDDP+VP-16療法(short hydration)**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |            |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|------------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    | アルコールアレルギー |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |            |

※必ず無しを確認

|           |              |
|-----------|--------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間 |
| 目標コース：    | 6 コース        |
| 使用基準：     | class A      |

《 注 意 》

指示 1： 体重測定                      毎日起床時  
注意： Day4以降も水分摂取が少ない場合や尿量が少ない場合には、輸液を考慮すること

《 使 用 薬 剤 》

シスプラチン；（C D D P）：シスプラチン注（50mg/100mL/V、10mg/20mL/V）  
エトポシド（VP-16）：エトポシド点滴静注100mg／5mL／V

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名  | 標準投与量 |                   | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|--------|-------|-------------------|-------|---------|-----|
| シスプラチン | 80    | mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1   |
| エトポシド  | 100   | mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1～3 |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|         |    |                                                               |
|---------|----|---------------------------------------------------------------|
| Day1；   |    | 1月1日(土)                                                       |
| 0時00分   | ①  | 生理食塩液 500mL + 硫酸Mg補正液 8mL<br>1 時間で点滴静注                        |
| 1時00分   | ②  | ソリタ T 3 号 500mL<br>1 時間で点滴静注                                  |
| 2時00分   | ③  | 生理食塩液 50mL + パロノセトロン 1 V + デキサート 9.9mg<br>15 分で点滴静注           |
| 2時15分   | ④  | 生理食塩液 500mL + エトポシド 0mg 0.00mL<br>60 分で点滴静注<br>※フィルターなしルートで投与 |
| 2時45分   | 内服 | アプレビタントカプセル 125mg 1 × (1) シスプラチン開始 1 時間前頃                     |
| 3時15分   | ⑤  | マンニトール 300mL<br>30 分で点滴静注                                     |
| 3時45分   | ⑥  | 生理食塩液 700 mL + シスプラチン 0mg 0.00mL<br>90 分で点滴静注                 |
| 5時15分   | ⑦  | 生理食塩液 500mL<br>1 時間で点滴静注                                      |
| 6時15分   | ⑧  | ソリタ T 3 号 500mL<br>1 時間で点滴静注                                  |
| Day2～3； |    | 1月2日(日) ～ 1月3日(月)                                             |
| 起床後     | 内服 | アプレビタントカプセル 80mg 1 × (2) 起床後                                  |
| 2時00分   | ①  | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注                         |
| 2時15分   | ②  | 生理食塩液 500mL + エトポシド 0mg 0.00mL<br>60 分で点滴静注<br>※フィルターなしルートで投与 |
| 3時15分   | ③  | ソリタ T 3 号 500mL × 3<br>4.5 時間 (1.5時間 × 3) で点滴静注               |

REFERENCE

Kazumasa Noda, M.D., Yutaka Nishiwaki, M.D., Masaaki Kawahara, M.D., et al: N Engl J Med, Vol.346,85-91, No.2, 2002  
Irinotecan plus cisplatin compared with etoposide plus cisplatin for extensive small-cell lung cancer  
第10回化学療法プロトコル審査委員会承認：2009年10月28日 更新:2011年11月14日(SH), 2016年7月14日

対象： 肺小細胞癌 （進行・再発） 1st Line  
レジメン名： **CDDP+VP-16療法(short hydration) (RT併用)**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |            |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|------------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    | アルコールアレルギー |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |            |

※必ず無しを確認

|           |              |
|-----------|--------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 8 日間 |
| 使用基準：     | class A      |

《 注 意 》  
R T：1.5Gy ×2回/日 15日間（3週間）  
指示 1： 体重測定 毎日起床時  
注意： Day4以降も水分摂取が少ない場合や尿量が少ない場合には、輸液を考慮すること

《 使 用 薬 剤 》  
シスプラチン；（C D D P）：シスプラチン注（50mg/100mL/V、10mg/20mL/V）  
エトポシド（VP-16）：エトポシド点滴静注100mg／5mL／V

| 薬 剤 名  | 標準投与量                 | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|--------|-----------------------|-------|---------|-----|
| シスプラチン | 80 mg/m <sup>2</sup>  | #REF! |         | 1   |
| エトポシド  | 100 mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1～3 |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》  
※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|         |                   |                                                               |
|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Day1；   | 1月1日(土)           |                                                               |
| 0時00分   | ①                 | 生理食塩液 500mL + 硫酸Mg補正液 8mL<br>1 時間で点滴静注                        |
| 1時00分   | ②                 | ソリタ T 3 号 500mL<br>1 時間で点滴静注                                  |
| 2時00分   | ③                 | 生理食塩液 50mL + パロノセトロン 1 V + デキサート 9.9mg<br>15 分で点滴静注           |
| 2時15分   | ④                 | 生理食塩液 500mL + エトポシド 0mg 0.00mL<br>60 分で点滴静注<br>※フィルターなしルートで投与 |
| 2時45分   | 内服                | アプレビタントカプセル 125mg 1 × (1) シスプラチン開始 1 時間前頃                     |
| 3時15分   | ⑤                 | マンニトール 300mL<br>30 分で点滴静注                                     |
| 3時45分   | ⑥                 | 生理食塩液 700 mL + シスプラチン 0mg 0.00mL<br>90 分で点滴静注                 |
| 5時15分   | ⑦                 | 生理食塩液 500mL<br>1 時間で点滴静注                                      |
| 6時15分   | ⑧                 | ソリタ T 3 号 500mL<br>1 時間で点滴静注                                  |
| Day2～3； | 1月2日(日) ～ 1月3日(月) |                                                               |
| 起床後     | 内服                | アプレビタントカプセル 80mg 1 × (2) 起床後                                  |
| 2時00分   | ①                 | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注                         |
| 2時15分   | ②                 | 生理食塩液 500mL + エトポシド 0mg 0.00mL<br>60 分で点滴静注<br>※フィルターなしルートで投与 |
| 3時15分   | ③                 | ソリタ T 3 号 500mL × 3<br>4.5 時間 (1.5時間 × 3) で点滴静注               |

対象： 肺小細胞癌（進行・再発） 2nd Line以降

レジメン名： **weekly CPT-11単独療法**

コース目

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 8 日間             |
| 使用基準：     | class B （Day8以降 class C） |

《 注 意 》

※下痢・腸閉塞の患者には禁忌！！

※ U G T 1 A 1 遺伝子多型検査をおこなうこと

《 使用 薬 剤 》

イリノテカン（CPT-11）：（イリノテカン塩酸塩点滴静注液） 40mg／2mL／V、100mg／5mL／V

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名  | 標準投与量                 | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日    |
|--------|-----------------------|-------|---------|--------|
| イリノテカン | 100 mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1.8.15 |

day22は休薬

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

| Day1,8,15 | 1月1日(土)                                                      | 1月8日(土) | 1月15日(土) |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 0時00分     | ① 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1 A + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注        |         |          |
| 0時15分     | ② 生理食塩液 250mL + <b>イリノテカン 0mg</b> <b>0.00mL</b><br>90 分で点滴静注 |         |          |
| 1時45分     | ③ 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                        |         |          |

## REFERENCE

Sayaka Onoda, Noriyuki Masuda, Takashi Seto, et al

Phase III trial of amrubicin for treatment of refractory or relapsed small-cell lung cancer:Thoracic oncology research group study 0301.

J Clin Oncol 24：5448-5453, 2006

第 8 回化学療法プロトコール審査委員会承認：2009年6月11日 更新:2011年2月14日

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |            |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|------------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    | アルコールアレルギー |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |            |

※必ず無しを確認

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間                        |
| 目標コース：    | <b>4 コース施行後、Durvalumabにて維持療法を行う</b> |
| 使用基準：     | class B                             |

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction (アフラクシ-様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等) が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用 (間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等) に注意

※ **体重30kg以下の場合、イミフィンジの投与量は20mg/kgとする。**

《 使 用 薬 剤 》

デュルバルマブ (Durvalumab)：イミフィンジ 点滴静注 120mg/2.4mL/V、500mg/10mL/V

カルボプラチン (CBDCA)：カルボプラチン点滴静注 150mg/15mL/V、450mg/45mL/V

エトポシド (VP-16)：エトポシド点滴静注 100mg/5mL/V

《 投 与 量 》

|              |                       |                                              |         |     |  |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------|-----|--|
| Cre値 (mg/dl) |                       | Calvertの計算式：投与量(mg/body) = 目標AUC値 × (GFR+25) |         |     |  |
| 目標AUC        | 6                     | GFRはCcrを代用して計算。                              |         |     |  |
| 薬 剤 名        | 標準投与量                 | 計算値                                          | 投与量(mg) | 投与日 |  |
| イミフィンジ       | 1500 * mg/body        | #REF!                                        |         | 1   |  |
| カルボプラチン      | 6 AUC                 | #REF!                                        |         | 1   |  |
| エトポシド        | 100 mg/m <sup>2</sup> | #REF!                                        |         | 1～3 |  |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

Day1； 1月1日(土)

|                                              |   |                                        |                 |                                                          |  |                                    |  |
|----------------------------------------------|---|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| ※エクステンションチューブを付け、フィルター有ルートで投与すること            |   |                                        |                 |                                                          |  |                                    |  |
| ※CVポートより投与の場合はコアレスニードルセットにセイフTポートを接続して投与開始   |   |                                        |                 |                                                          |  |                                    |  |
| 0時00分                                        | ① | 生理食塩液 50mL                             | 血管確保用で速度適宜に点滴静注 |                                                          |  |                                    |  |
| 0時05分                                        | ② | 生理食塩液 100mL + イミフィンジ 0mg               | 0.00mL          | 60 分で点滴静注<br><u>0.2 μm or 0.22 μmのフィルター一体型輸液セットを使用する</u> |  |                                    |  |
| 1時05分                                        | ③ | 生理食塩液 50mL                             | フラッシュ           |                                                          |  |                                    |  |
| ※④をフィルター無ルートでプライミングし、エクステンションチューブの側管から投与すること |   |                                        |                 |                                                          |  |                                    |  |
| 1時10分                                        | ④ | 生理食塩液 50mL + パロノセトロン 1V + デキサート 13.2mg | 15 分で点滴静注       |                                                          |  |                                    |  |
| 1時25分                                        | ⑤ | 生理食塩液 500mL + エトポシド 0mg                | 0.00mL          |                                                          |  | 90 分で点滴静注<br><u>※フィルターなしルートで投与</u> |  |
| 2時55分                                        | ⑥ | 5 %ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン 0mg           | 0.00mL          |                                                          |  |                                    |  |
| 3時55分                                        | ⑦ | 生理食塩液 50mL                             | フラッシュ           |                                                          |  |                                    |  |
| Day2～3 ; 1月2日(日) ～ 1月3日(月)                   |   |                                        |                 |                                                          |  |                                    |  |
| 1時10分                                        | ① | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg               | 15 分で点滴静注       |                                                          |  |                                    |  |
| 1時25分                                        | ② | 生理食塩液 500mL + エトポシド 0mg                | 0.00mL          | 90 分で点滴静注<br><u>※フィルターなしルートで投与</u>                       |  |                                    |  |
| 2時55分                                        | ③ | 生理食塩液 50mL                             | フラッシュ           |                                                          |  |                                    |  |

REFERENCE

Luis Paz-Ares et al. Lancet. Nov 23;384(10212):1929-1939.

Durvalumab plus platinum-etoposide versus platinum-etoposide in first-line treatment of Extensive-Stage Small-Cell Lung Cancer(CASPAN)

2021年11月化学療法プロトコル審査委員会承認：2021年11月8日

対象： 小細胞肺癌（進展型） 1st Line

レジメン名： Durvalumab+CDDP+VP-16療法(short hydration)

コース目

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |            |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|------------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    | アルコールアレルギー |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |            |

※必ず無しを確認

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間                |
| 目標コース：    | 4コース施行後、Durvalumabにて維持療法を行う |
| 使用基準：     | class A                     |

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

※ Infusion reaction に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction (7/7/7/7-様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等) が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用 (間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等) に注意

※ 体重30kg以下の場合、イミフィンジの投与量は20mg/kgとする。

指示 1： 体重測定 毎日起床時

注意： Day4以降も水分摂取が少ない場合や尿量が少ない場合には、輸液を考慮すること

《 使用薬 剤 》

デュルバルマブ (Durvalumab)：イミフィンジ 点滴静注 120mg/2.4mL/V、500mg/10mL/V

エトポシド (VP-16)：エトポシド点滴静注 100mg/5mL/V

シスプラチン (CDDP)：シスプラチン注 (50mg/100mL/V、10mg/20mL/V)

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名  | 標準投与量                 | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|--------|-----------------------|-------|---------|-----|
| イミフィンジ | 1500 * mg/body        | #REF! |         | 1   |
| エトポシド  | 100 mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1～3 |
| シスプラチン | 80 mg/m <sup>2</sup>  | #REF! |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

Day1； 1月1日(土)

※エクステンションチューブを付け、フィルター有ルートで投与すること

※CVポートより投与の場合はコアレスニードルセットにセイフポートを接続して投与開始

|                                              |   |                                                                           |        |  |
|----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 0時00分                                        | ① | 生理食塩液 50mL<br>血管確保で速度適宜に点滴静注                                              |        |  |
| 0時05分                                        | ② | 生理食塩液 100mL + イミフィンジ 0mg<br>60 分で点滴静注<br>0.2μm or 0.22μmのフィルター型輸液セットを使用する | 0.00mL |  |
| 1時05分                                        | ③ | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                       |        |  |
| 1時10分                                        | ④ | 生理食塩液 500mL + 硫酸Mg補正液 8mL<br>1 時間で点滴静注                                    |        |  |
| 2時10分                                        | ⑤ | ソリタ T 3 号 500mL<br>1 時間で点滴静注                                              |        |  |
| ※④をフィルター無ルートでプライミングし、エクステンションチューブの側管から投与すること |   |                                                                           |        |  |
| 3時10分                                        | ⑥ | 生理食塩液 50mL + バロノセトロン 1V + デキサート 9.9mg<br>15 分で点滴静注                        |        |  |
| 3時25分                                        | ⑦ | 生理食塩液 500mL + エトポシド 0mg<br>60 分で点滴静注<br>※フィルターなしルートで投与                    | 0.00mL |  |
| 3時55分                                        |   | 内服 アプレビタントカプセル 125mg 1 × (1) シスプラチン開始 1 時間前頃                              |        |  |
| 4時25分                                        | ⑧ | マンニトール 300mL<br>30 分で点滴静注                                                 |        |  |
| 4時55分                                        | ⑨ | 生理食塩液 700 mL + シスプラチン 0mg<br>90 分で点滴静注                                    | 0.00mL |  |
| 6時25分                                        | ⑩ | 生理食塩液 500mL<br>1 時間で点滴静注                                                  |        |  |
| 7時25分                                        | ⑪ | ソリタ T 3 号 500mL<br>1 時間で点滴静注                                              |        |  |

Day2～3； 1月2日(日) ～ 1月3日(月)

起床後 内服 アプレビタントカプセル 80mg 1 × (2) 起床後

|       |   |                                                        |        |  |
|-------|---|--------------------------------------------------------|--------|--|
| 3時10分 | ① | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注                  |        |  |
| 3時25分 | ② | 生理食塩液 500mL + エトポシド 0mg<br>60 分で点滴静注<br>※フィルターなしルートで投与 | 0.00mL |  |
| 4時25分 | ③ | ソリタ T 3 号 500mL × 3<br>4.5 時間 (1.5時間 × 3) で点滴静注        |        |  |

REFERENCE

Luis Paz-Ares et al. Lancet. Nov 23;384(10212):1929-1939.

Durvalumab plus platinum-etoposide versus platinum-etoposide in first-line treatment of Extensive-Stage Small-Cell Lung Cancer(CASPIAN)

2021年11月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2021年11月8日

対象： 小細胞肺癌  
レジメン名： **Durvalumab維持療法**

コース目

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 28日間                       |
| 目標コース：    | 限局型SCLCにおける根治的CRT後の維持療法は、最長24ヵ月間 |

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

**Durvalumab+CDDP+VP-16療法又は、Durvalumab+CBDCA+VP-16療法後のメンテナンスとして使用すること。  
限局型SCLCにおける根治的CRT後の維持療法として使用すること。**

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction (アフィキシー様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等) が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用 (間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等) に注意

※ **体重30kg以下の場合、イミフィンジの投与量は20mg/kgとする。**

※ **LD-SCLCに対してcCRT、PCIを行う場合、Durvalumab開始前の1-42日前に完了すること**

《 使用 薬 剤 》

デュルバルマブ (Durvalumab)：イミフィンジ 点滴静注 120mg/2.4mL/V、500mg/10mL/V

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名  | 標準投与量          | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|--------|----------------|-------|---------|-----|
| イミフィンジ | 1500 * mg/body | #REF! |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Day1； | 1月1日(土)                                                                             |
| 0時00分 | ① 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                                     |
| 0時05分 | ② 生理食塩液 100mL + イミフィンジ 0mg 0.00mL<br>60分で点滴静注<br>0.2μm or 0.22μmのフィルター一体型輸液セットを使用する |
| 1時05分 | ③ 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                               |

REFERENCE

Luis Paz-Ares et al. Durvalumab plus platinum-etoposide versus platinum-etoposide in first-line treatment of Extensive-Stage Small-Cell Lung Cancer(CASPIAN). Lancet. Nov 23;384(10212):1929-1939.

Y Cheng, DR Spigel, BC Cho, et al. Durvalumab after chemoradiotherapy in limited-stage small-cell lung cancer. N Engl J Med. 2024 Oct 10;391(14):1313-1327.

2021年11月化学療法プロトコル審査委員会承認：2021年11月8日、2025年4月14日修正。

対象： 肺小細胞癌（進行・再発） 2nd Line

レジメン名： **Nogitecan療法**

コース目

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |              |
|-----------|--------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間 |
| 使用基準：     | class A      |

《 注 意 》

※添付文書の注意に従う。腎機能低下時には減量が必要。

※クレアチンクリアランス20～39mL/min→初回投与量は通常量の半量とする。

※次コースの投与量は患者の状態により適宜増減すること。

1段階増量 1.2mg/m<sup>2</sup>/日

1段階減量 0.8mg/m<sup>2</sup>/日

《 使用 薬 剤 》

ノギテカン：（ハイカムチン）1mg/1ml

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名  | 標準投与量               | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|--------|---------------------|-------|---------|-----|
| ハイカムチン | 1 mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1～5 |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|        |         |                                                |         |
|--------|---------|------------------------------------------------|---------|
| Day1～5 | 1月1日(土) | ～                                              | 1月5日(水) |
| 0時00分  | ①       | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注          |         |
| 0時15分  | ②       | 生理食塩液 100mL + ハイカムチン 0.0mg 0.00mL<br>30 分で点滴静注 |         |
| 0時45分  | ③       | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                            |         |

REFERENCE

Joachim von pawel,Joan H.Schiller,Frances A.Shepherd, et al：CPT-11: J Clin Oncol 17:658-667,1999

Topotecan versus cyclophosphamide,doxorubicin,and vincristine for the treatment of recurrent small-cell lung cancer

Koji Takeda,Shunichi Negoro,Toshiyuki Sawa,et al :Clinical Lung Cancer 4:224-228,2003

A phase II study of topotecan in patients with relapsed small-cell lung cancer

2011年9月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2011年9月12日

対象： 非小細胞肺癌 （術後）  
レジメン名： <術後>CDDP+VNR療法（short hydration）

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 21日間           |
| 目標コース：    | 6コース                 |
| 使用基準：     | class A, Day8 classC |

《 注 意 》

指示1： 体重測定 毎日起床時  
注意： Day4以降も水分摂取が少ない場合や尿量が少ない場合には、輸液を考慮すること

《 使 用 薬 剤 》

シスプラチン；（C D D P）：シスプラチン注（50mg/100mL/V、10mg/20mL/V）  
ビノレルビン（VNR）：（ロゼウス）40mg／4mL／V、10mg／1mL／V

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名  | 標準投与量                | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|--------|----------------------|-------|---------|-----|
| シスプラチン | 80 mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1   |
| ロゼウス   | 25 mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1,8 |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Day1； | 1月1日(土)                                                                     |
| 0時00分 | ① 生理食塩液 500mL + 硫酸Mg補正液 8mL<br>1 時間で点滴静注                                    |
| 1時00分 | ② ソリタ T 3 号 500mL<br>1 時間で点滴静注                                              |
| 1時15分 | 内服 アプレビタントカプセル 125mg 1 × (1) シスプラチン開始 1 時間前頃                                |
| 2時00分 | ③ 生理食塩液 50mL + パロノセトロン 1V + デキサート 9.9mg<br>15 分で点滴静注                        |
| 2時15分 | ④ 生理食塩液 50mL + ロゼウス 0mg 0.00mL<br>全開 10分以内で点滴静注（終了後、直ちに⑤を開始）<br>※血管痛、静脈炎に注意 |
| 2時25分 | ⑤ マンニトール 300mL（ロゼウス終了後直ちに）<br>30 分以内で点滴静注                                   |
| 2時55分 | ⑥ 生理食塩液 700 mL + シスプラチン 0mg 0.00mL<br>90 分で点滴静注                             |
| 4時25分 | ⑦ 生理食塩液 500mL<br>1 時間で点滴静注                                                  |
| 5時25分 | ⑧ ソリタ T 3 号 500mL<br>1 時間で点滴静注                                              |

|       |         |                                               |         |
|-------|---------|-----------------------------------------------|---------|
| Day2； | 1月2日(日) | ～                                             | 1月3日(月) |
| 起床後   | 内服      | アプレビタントカプセル 80mg 1 × (2)                      | 起床後     |
| 2時00分 | ①       | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注         |         |
| 2時15分 | ②       | ソリタ T 3 号 500mL × 3<br>4.5 時間（1.5時間 × 3）で点滴静注 |         |

|       |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Day8； | 1月8日(土)                                                                     |
| 0時00分 | ① 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注                                     |
| 0時15分 | ② 生理食塩液 50mL + ロゼウス 0mg 0.00mL<br>全開 10分以内で点滴静注（終了後、直ちに③を開始）<br>※血管痛、静脈炎に注意 |
| 0時25分 | ③ 生理食塩液 250mL（ロゼウス終了後直ちに）<br>全開 20分以内で点滴静注                                  |

REFERENCE

The International Adjuvant Lung Cancer Trial Collaborative Group: N Engl Med 350:351-360, 2004  
Cisplatin-Based Adjuvant Chemotherapy in Patients with Completely Resected Non-Small-Cell-Lung Cancer.  
第9回化学療法プロトコル審査委員会承認：2009年8月6日 更新:2011年11月14日(SH), 2016年7月14日

対象： 非小細胞肺がん（進行・再発） 1st、2nd、3rd Line

レジメン名： **Afatinib療法**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 通常、成人には1日1回40mgを空腹時に経口投与。なお、患者の状態により適宜増減するが、1日1回50mgまで増量できる。 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|

《 注 意 》

EGFR遺伝子変異陽性の切除不能又は再発非小細胞肺がん

適正使用ガイドに準じる

※ 食事の影響を避けるため食事の1時間前から食後3時間までの間の服用は避けること

※ 間質性肺疾患を起こすことがあるので、観察を十分に行うこと

※ 心機能異常に要注意

《 使 用 薬 剤 》

アファチニブ：ジオトリフ錠 20mg、30mg、40mg

|       |            |     |         |     |
|-------|------------|-----|---------|-----|
| 薬 剤 名 | 標準投与量      | 計算値 | 投与量(mg) | 投与日 |
| ジオトリフ | 40 mg/body | 40  |         | 連日  |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

|    |            |                      |
|----|------------|----------------------|
| 内服 | ジオトリフ錠 0mg | 空腹時（食前1時間、食後3時間は避ける） |
|----|------------|----------------------|

---

REFERENCE

Lecia V. Sequist,James Chih-Hsin Yang,Nobuyuki Yamamoto, et al: J Clin Oncol 31:3327-3334

Phase III study of Afatinib or Cisplatin Plus Pemetrexed in Patients With Metastatic Lung Adenocarcinoma With EGFR Mutations

2014年5月度化学療法プロトコール審査委員会承認：2014年5月12日

対象： 非小細胞肺癌 （ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発例）

レジメン名： **Alectinib療法**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1回 300mgを1日2回経口投与する。(食事の影響を避けるため、本剤の投与時期は、臨床試験における設定内容に準じて空腹時に投与することが望ましい) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|

《 注 意 》

ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

適正使用ガイドに準じる

※間質性肺疾患を起こすことがあるので、観察を十分に行うこと。

※肝機能障害を起こすことがあるので、観察を十分に行うこと。

※好中球減少・白血球減少を起こすことがあるので、観察を十分に行うこと。

※消化管穿孔を起こすことがあるので、観察を十分に行うこと。

※血栓塞栓症を起こすことがあるので、観察を十分に行うこと。

《 使 用 薬 剤 》

アレクチニブ：アレセンサカプセル20mg、40mg

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名 | 標準投与量       | 計算値 | 投与量(mg) | 投与日 |
|-------|-------------|-----|---------|-----|
| アレセンサ | 600 mg/body | 600 |         | 連日  |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

|    |           |     |           |
|----|-----------|-----|-----------|
| 内服 | アレセンサカプセル | 0mg | 1日2回 経口投与 |
|----|-----------|-----|-----------|

---

REFERENCE

Seto T,Kiura K,Nishio M, et al; Lancet Oncol. 2013; 14(7):590-8

CH5424802(R05424802) for patients with ALK-rearranged advanced non-small-cell-lung cancer (AF-001JP study): a single-arm, open-label, phase 1-2 study

2015年1月度化学療法プロトコール審査委員会承認：2015年1月19日

対象： 非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）（進行・再発） 1st Line

レジメン名： **Atezolizumab+Bev+CBDCA+PTX療法**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |            |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|------------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    | アルコールアレルギー |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |            |

※必ず無しを確認

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1コース 2日間                                            |
| 目標コース：    | <b>4又は6コース施行後、Atezolizumab+Bevacizumabにて維持療法を行う</b> |
| 使用基準：     | class A                                             |

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アライアンス様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用（間質性肺炎患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意

※ **喀血**（2.5mL以上の鮮血の咯血）の既往のある患者には禁忌。

※ 投与前に凝固系(PT-INR,D-ダイマー、等)の検査を実施し、投与中にも必要に応じ検査を行うこと。

※ 原則、埋め込み式ポート挿入後1週間以上、腹部手術前後は6週間以上空けて投与。

《 使 用 薬 剤 》

アテゾリズマブ：（テセントリク）1200mg/20mL

カルボプラチン：（カルボプラチン） 150mg/15mL/V、450mg/45mL/V

パクリタキセル：（パクリタキセル） 30mg/5mL/V、100mg/16.7mL/V

ベバシズマブ：（ベバシズマブBS） 100mg/4mL/V、400mg/16mL/V

|             |                       |                                              |         |     |  |
|-------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------|-----|--|
| Cre値（mg/dl） |                       | Calvertの計算式：投与量(mg/body) = 目標AUC値 × (GFR+25) |         |     |  |
| 目標AUC       | 6                     | GFRはCcrを代用して計算。                              |         |     |  |
| 薬 剤 名       | 標準投与量                 | 計算値                                          | 投与量(mg) | 投与日 |  |
| テセントリク      | 1200 mg/body          | 1200                                         |         | 1   |  |
| ベバシズマブBS    | 15 mg/kg              | #REF!                                        |         | 1   |  |
| パクリタキセル     | 200 mg/m <sup>2</sup> | #REF!                                        |         | 1   |  |
| カルボプラチン     | 6 AUC                 | #REF!                                        |         | 1   |  |

|                                          |         |                                       |           |  |  |
|------------------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|--|--|
| 《 タイムスケジュール：開始時刻 》                       |         |                                       |           |  |  |
| ※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。 |         |                                       |           |  |  |
| Day1；                                    | 1月1日(土) |                                       |           |  |  |
| 0時00分                                    | ①       | 生理食塩液 50mL                            |           |  |  |
|                                          |         | 血管確保用で速度適宜に点滴静注                       |           |  |  |
| 0時05分                                    | ②       | 生理食塩液 250mL + テセントリク 0mg              | 0.00mL    |  |  |
|                                          |         | 60分で点滴静注                              |           |  |  |
|                                          |         | (60分で忍容性が良好であれば30分に変更可)               |           |  |  |
|                                          |         | 0.2μm or 0.22μmのフィルター体型輸液セットを使用する     |           |  |  |
| 1時05分                                    | ③       | 生理食塩液 50mL                            |           |  |  |
|                                          |         | フラッシュ                                 |           |  |  |
| 1時10分                                    | ④       | 生理食塩液 100mL + ベバシズマブBS 0mg            | 0.00mL    |  |  |
|                                          |         | 90分で点滴静注                              |           |  |  |
|                                          |         | (初回は90分、2回目以降は60分・30分に変更可)            |           |  |  |
| 2時40分                                    | ⑤       | 生理食塩液 50mL                            |           |  |  |
|                                          |         | フラッシュ                                 |           |  |  |
| 2時45分                                    | 内服      | レスタミンコーワ錠(10mg) 5錠                    | ⑥の点滴直前に内服 |  |  |
| 2時45分                                    | ⑥       | 生理食塩液 50mL + ファモチジン 1A + デキサート 16.5mg |           |  |  |
|                                          |         | 15分で点滴静注                              |           |  |  |
| 3時00分                                    | ⑦       | 生理食塩液 100mL + バロノセトロン 1V              |           |  |  |
|                                          |         | 30分で点滴静注                              |           |  |  |
| 3時30分                                    | ⑧       | 生理食塩液 500mL + パクリタキセル 0mg             | 0.00mL    |  |  |
|                                          |         | 3時間で点滴静注                              |           |  |  |
|                                          |         | 0.22μm以下のフィルター体型輸液セットを使用する            |           |  |  |
| 6時30分                                    | ⑨       | 5%ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン 0mg           | 0.00mL    |  |  |
|                                          |         | 60分で点滴静注                              |           |  |  |
| 7時30分                                    | ⑩       | 生理食塩液 50mL                            |           |  |  |
|                                          |         | フラッシュ                                 |           |  |  |

REFERENCE

M.A. Socinski, R.M. Jotte, F. Cappuzzo, et al：N Engl J Med 2018;378:2288-301

Atezolizumab for First-Line Treatment of Metastatic Nonsquamous NSCLC

2019年1月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2019年1月21日

対象： 非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）（進行・再発） 1st Line

レジメン名： **Atezolizumab+CBDCA+PEM療法**

コース目

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1コース 21日間                                   |
| 目標コース：    | <b>4又は6コース施行後、Atezolizumab+Pemetrexed投与</b> |
| 使用基準：     | class A （扁平上皮癌への使用は避けること。）                  |

#### 《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アライジー様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意

#### 《 使用 薬 剤 》

アテゾリズマブ：（テセントリク）1200mg/V

カルボプラチン（CBDCA）：（カルボプラチン）150mg/V、450mg/V

ペメトレキセド（PEM）：（ペメトレキセド）100mg・500mg・800mg/V

#### 《 投 与 量 》

|              |                       |                                              |         |     |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------|-----|
| Cre値 (mg/dl) |                       | Calvertの計算式：投与量(mg/body) = 目標AUC値 × (GFR+25) |         |     |
| 目標AUC        | 5                     | GFRはCcrを代用して計算。                              |         |     |
| 薬 剤 名        | 標準投与量                 | 計算値                                          | 投与量(mg) | 投与日 |
| テセントリク       | 1200 mg/body          | 1200                                         |         | 1   |
| カルボプラチン      | 5 AUC                 | #REF!                                        |         | 1   |
| ペメトレキセド      | 500 mg/m <sup>2</sup> | #REF!                                        |         | 1   |

#### 《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|              |         |                                                                                                                 |         |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 初回投与 7 日以上前に |         |                                                                                                                 |         |
|              | 筋注      | メチコバール注500 μ g 2 A 筋注。以後、3 クール（9 週間）毎に1 回投与。                                                                    |         |
|              | 内服      | バンピタン末1 g / 日（葉酸 0.5mg/日）毎日内服。                                                                                  |         |
| Day1 ；       | 1月1日(土) |                                                                                                                 |         |
| 0時00分        | ①       | 生理食塩液 50mL<br>血管確保用に速度適宜に点滴静注                                                                                   |         |
| 0時05分        | ②       | 生理食塩液 250mL + テセントリク 0mg 0.00mL<br>60 分で点滴静注<br>(60分で忍容性が良好であれば30分に変更可)<br>0.2 μ m or 0.22 μ mのフィルター型輸液セットを使用する |         |
| 0時35分        | 内服      | アプレピタントカプセル 125mg 1 × (1) カルボプラチン開始 1 時間前頃                                                                      |         |
| 1時05分        | ③       | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                                             |         |
| 1時10分        | ④       | 生理食塩液 50mL + パロノセトロン 1V + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注                                                              |         |
| 1時25分        | ⑤       | 生理食塩液 100mL + ペメトレキセド 0mg 0.00mL<br>10 分で点滴静注                                                                   |         |
| 1時35分        | ⑥       | 5 %ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン 0mg 0.00mL<br>60 分で点滴静注                                                                |         |
| 2時35分        | ⑦       | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                                             |         |
| <hr/>        |         |                                                                                                                 |         |
| Day2～3 ；     | 1月2日(日) | ～                                                                                                               | 1月3日(月) |
| 起床後          | 内服      | アプレピタントカプセル 80mg 1 × (2) 起床後                                                                                    |         |

#### REFERENCE

Makoto Nishio,MD,PhD, Fabrice Barlesi,MD,PhD, Howard West,MD, et al :J Thorac Oncol.16(4):653-64.2021.

Atezolizumab Plus Chemotherapy for First-Line Treatment of Nonsquamous NSCLC:Results From the Randomized Phase 3 IMpower132 Trial

2021年11月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2021年11月8日

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間                                |
| 目標コース：    | <b>4又は6コース施行後、Atezolizumab+Pemetrexed投与</b> |
| 使用基準：     | class A （扁平上皮癌への使用は避けること。）                  |

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アライアキ-様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意

指示1： 体重測定 毎日起床時

注意： Day4以降も水分摂取が少ない場合や尿量が少ない場合には、輸液を考慮すること

《 使 用 薬 剤 》

アテゾリズマブ：（テセントリク） 1200mg/V

ペメトレキセド：（ペメトレキセド） 100mg・500mg・800mg/V

シスプラチン；（C D D P）：シスプラチン注（50mg/100mL/V、10mg/20mL/V）

| 薬 剤 名   | 標準投与量        | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|---------|--------------|-------|---------|-----|
| テセントリク  | 1200 mg/body | 1200  |         | 1   |
| ペメトレキセド | 500 mg/m2    | #REF! |         | 1   |
| シスプラチン  | 75 mg/m2     | #REF! |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

初回投与 7 日以上前に

|       |         |                                                    |                                           |        |
|-------|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
|       | 筋注      | メチコバル注500μ g 2 A 筋注。以後、3 クール（9 週間）毎に 1 回投与。        |                                           |        |
|       | 内服      | バンビタン末1 g /日（葉酸 0.5mg/日）毎日内服。                      |                                           |        |
| Day1； | 1月1日(土) |                                                    |                                           |        |
| 0時00分 | ①       | 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                      |                                           |        |
| 0時05分 | ②       | 生理食塩液 250mL +                                      | テセントリク 0mg                                | 0.00mL |
|       |         | 60 分で点滴静注                                          | (60分で忍容性が良好であれば30分に変更可)                   |        |
|       |         | 0.2μ m or 0.22μ mのフィルトレーション型輸液セットを使用する             |                                           |        |
| 1時05分 | ③       | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                |                                           |        |
| 1時10分 | ④       | 生理食塩液 500mL + 硫酸Mg補正液 8mL<br>1 時間で点滴静注             |                                           |        |
| 2時10分 | ⑤       | ソリタ T 3 号 500mL<br>1 時間で点滴静注                       |                                           |        |
| 3時05分 |         | 内服                                                 | アプレビタントカプセル 125mg 1 × (1) シスプラチン開始 1 時間前頃 |        |
| 3時10分 | ⑥       | 生理食塩液 50mL + パロノセトロン 1V + デキサート 9.9mg<br>15 分で点滴静注 |                                           |        |
| 3時25分 | ⑦       | 生理食塩液 100mL +                                      | ペメトレキセド 0mg                               | 0.00mL |
|       |         | 10 分で点滴静注                                          |                                           |        |
| 3時35分 | ⑧       | マンニトール 300mL<br>30 分で点滴静注                          |                                           |        |
| 4時05分 | ⑨       | 生理食塩液 700 mL +                                     | シスプラチン 0mg                                | 0.00mL |
|       |         | 90 分で点滴静注                                          |                                           |        |
| 5時35分 | ⑩       | 生理食塩液 500mL<br>1 時間で点滴静注                           |                                           |        |
| 6時35分 | ⑪       | ソリタ T 3 号 500mL<br>1 時間で点滴静注                       |                                           |        |

|         |         |                                                 |         |
|---------|---------|-------------------------------------------------|---------|
| Day2～3； | 1月2日(日) | ～                                               | 1月3日(月) |
| 起床後     | 内服      | アプレビタントカプセル 80mg 1 × (2) 起床後                    |         |
| 3時05分   | ①       | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注           |         |
| 3時20分   | ③       | ソリタ T 3 号 500mL × 3<br>4.5 時間 (1.5時間 × 3) で点滴静注 |         |

対象： 非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）（進行・再発） 1st Line  
レジメン名： **Atezolizumab+PEM療法(メンテナンス)**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間               |
| 使用基準：     | class B （扁平上皮癌への使用は避けること。） |

#### 《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

**Atezolizumab／CDDP／PEM療法又は、Atezolizumab／CBDCA／PEM療法後のメンテナンスとして使用すること。**

※ **Infusion reaction** に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アフィキーン様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意

#### 《 使用薬剤 》

アテゾリズマブ：（テセントリク）1200mg／V

ペメトレキセド：（ペメトレキセド）100mg・500mg・800mg／V

#### 《 投 与 量 》

| 薬 剤 名   | 標準投与量        | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|---------|--------------|-------|---------|-----|
| テセントリク  | 1200 mg/body | 1200  |         | 1   |
| ペメトレキセド | 500 mg/m2    | #REF! |         | 1   |

#### 《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |   |                                       |                                                                            |  |
|-------|---|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
|       |   | 初回投与 7 日以上前に                          |                                                                            |  |
|       |   | 筋注                                    | メチコパール注500μg 2 A 筋注。以後、3クール（9週間）毎に1回投与。                                    |  |
|       |   | 内服                                    | バンピタン末1g / 日（葉酸 0.5mg / 日）毎日内服。                                            |  |
| Day1； |   | 1月1日(土)                               |                                                                            |  |
| 0時00分 | ① | 生理食塩液 50mL                            | 血管確保用で速度適宜に点滴静注                                                            |  |
| 0時05分 | ② | 生理食塩液 250mL + テセントリク 0mg 0.00mL       | 60 分で点滴静注<br>(60分で忍容性が良好であれば30分に変更可)<br>0.2μm or 0.22μmのフィルター一体型輸液セットを使用する |  |
| 1時05分 | ③ | 生理食塩液 50mL                            | フラッシュ                                                                      |  |
| 1時10分 | ④ | 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1A + デキサート 6.6mg | 15 分で点滴静注                                                                  |  |
| 1時25分 | ⑤ | 生理食塩液 100mL + ペメトレキセド 0mg 0.00mL      | 10 分で点滴静注                                                                  |  |
| 1時35分 | ⑥ | 生理食塩液 50mL                            | フラッシュ                                                                      |  |

#### REFERENCE

Makoto Nishio,MD,PhD, Fabrice Barlesi,MD,PhD, Howard West,MD, et al :J Thorac Oncol.16(4):653-64.2021.

Atezolizumab Plus Chemotherapy for First-Line Treatment of Nonsquamous NSCLC:Results From the Randomized Phase 3 IMpower132 Trial

2021年11月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2021年11月8日

対象： 非小細胞肺癌（進行・再発）2nd Line以降

レジメン名： **Atezolizumab療法**

コース目

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース    2 1 日間 |
|-----------|-----------------|

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

- ※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)
- 重度のInfusion reaction（アフィクション様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。
- ※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意

《 使 用 薬 剤 》

アテゾリズマブ：（テセントリク）1200mg／V

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名  | 標準投与量        | 計算値  | 投与量(mg) | 投与日 |
|--------|--------------|------|---------|-----|
| テセントリク | 1200 mg/body | 1200 |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Day1； | 1月1日(土)                                                                                                        |
| 0時00分 | ① 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                                                                |
| 0時05分 | ② 生理食塩液 250mL + テセントリク 0mg 0.00mL<br>60分で点滴静注<br>(60分で忍容性が良好であれば30分に変更可)<br>0.2μm or 0.22μmのフィルター一体型輸液セットを使用する |
| 1時05分 | ③ 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                                          |

REFERENCE

Achim Rittmeyer,Fabrice Barlesi,Daniel Waterkamp, et al; Lancet 2017;389:255-65  
Atezolizumab versus docetaxel in patients with previously treated non-small-cell lung cancer(OAK):  
a phase 3,open-label,multicentre randomised controlled trialPhase 3 IMpower132 Trial  
2018年5月度化学療法プロトコール審査委員会承認：2018年5月14日

対象： 非小細胞肺癌

レジメン名： **BLM心嚢内注入療法（導入）**

コース目

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |            |
|-----------|------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 日間 |
| 使用基準：     | class B    |

《 使用 薬 剤 》

ブレオ（BLM）：ブレオマイシン塩酸塩 15mg/V、5mg/V

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名 | 標準投与量      | 計算値 | 投与量(mg) | 投与日 |
|-------|------------|-----|---------|-----|
| ブレオ   | 15 mg/body | 15  |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

Day1； 1月1日(土)

0時00分

①

生理食塩液 20mL + **ブレオ 0mg**

5分間かけて心嚢内へ注入する。

## REFERENCE

H Kunitou,T Tamura,T Shibata,M Imai, et al:British Journal (2009) 100,464-469

A randomised trial of intrapericardial bleomycin for malignant pericardial effusion with lung cancer(JCOG9811)

2014年4月度プロトコール審査委員会承認:2014年4月14日 迅速審査承認(2014年3月7日)

対象： 非小細胞肺癌

レジメン名： **BLM心嚢内注入療法（維持）**

コース目

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |            |
|-----------|------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 日間 |
| 使用基準：     | class B    |

《 使用 薬 剤 》

ブレオ（BLM）：ブレオマイシン塩酸塩 15mg／V、5mg／V

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名 | 標準投与量      | 計算値 | 投与量(mg) | 投与日 |
|-------|------------|-----|---------|-----|
| ブレオ   | 10 mg/body | 10  |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

Day1； 1月1日(土)

0時00分

①

生理食塩液 20mL + **ブレオ 0mg**

5分間かけて心嚢内へ注入する。

## REFERENCE

H Kunitou,T Tamura,T Shibata,M Imai, et al:British Journal (2009) 100,464-469

A randomised trial of intrapericardial bleomycin for malignant pericardial effusion with lung cancer(JCOG9811)

2014年4月度プロトコール審査委員会承認:2014年4月14日 迅速審査承認(2014年3月7日)

対象： 非小細胞肺癌（進行・再発） 1st Line  
レジメン名： **CBDCA+nab-PTX療法**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間              |
| 目標コース：    | 6コース                      |
| 使用基準：     | class A (day8.15はclass C) |

《 使用 薬 剤 》  
カルボプラチン（CBDCA）：（カルボプラチン） 150mg／V、450mg／V  
パクリタキセル（nab-PTX）：（アブラキサン） 100mg ／V

|             |                       |                                          |         |        |
|-------------|-----------------------|------------------------------------------|---------|--------|
| 《 投 与 量 》   |                       |                                          |         |        |
| Cre値（mg/dl） |                       | Calvertの計算式：投与量(mg/body)＝目標AUC値×(GFR+25) |         |        |
| 目標AUC       | 6                     | GFRはCcrを代用して計算。                          |         |        |
| 薬 剤 名       | 標準投与量                 | 計算値                                      | 投与量(mg) | 投与日    |
| カルボプラチン     | 6 AUC                 | #REF!                                    |         | 1      |
| アブラキサン      | 100 mg/m <sup>2</sup> | #REF!                                    |         | 1,8,15 |

|                                          |         |                                                                               |  |  |
|------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 《 タイムスケジュール：開始時刻 》                       |         |                                                                               |  |  |
| ※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。 |         |                                                                               |  |  |
| Day1；                                    | 1月1日(土) |                                                                               |  |  |
| 0時00分                                    | 内服      | アプレピタントカプセル 125mg 1 × ( 1 ) カルボプラチン開始 1 時間前頃                                  |  |  |
| 0時00分                                    | ①       | 生理食塩液 50mL + パロノセトロン 1V + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注                            |  |  |
| 0時15分                                    | ②       | 生理食塩液 100mL + <b>アブラキサン 0mg</b><br>30 分で点滴静注 調整法に従い溶解。 0.0mL の懸濁液を生理食塩液容器に戻す。 |  |  |
|                                          |         | ※フィルターなしルートで投与                                                                |  |  |
| 0時45分                                    | ③       | 生理食塩液 50mL<br>15 分で点滴静注                                                       |  |  |
| 1時00分                                    | ④       | 5 %ブドウ糖液 250mL + <b>カルボプラチン 0mg</b><br>60 分で点滴静注 0.00mL                       |  |  |
| 2時00分                                    | ⑤       | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                           |  |  |

|         |         |                                |         |
|---------|---------|--------------------------------|---------|
| Day2～3； | 1月2日(日) | ～                              | 1月3日(月) |
| 起床後     | 内服      | アプレピタントカプセル 80mg 1 × ( 2 ) 起床後 |         |

| Day8,15； | 1月8日(土) | 1月15日(土)                                                                                           |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0時00分    | ①       | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注                                                              |
| 0時15分    | ②       | 生理食塩液 100mL + アブラキサン 0mg<br>30 分で点滴静注<br>調整法に従い溶解。 0.0mL の懸濁液を生理食塩液容器に戻す。<br><u>※フィルターなしルートで投与</u> |
| 0時45分    | ③       | 生理食塩液 50mL<br>15 分で点滴静注                                                                            |

REFERENCE

Mark A. Socinski,Igor Bondarenko,Nina A. Karaseva , et al：J Clin Oncol 30：2055-2062, 2012  
Weekly nab-paclitaxel in combination with carboplatin versus solvent-based paclitaxel plus carboplatin as first-line therapy in patients with advanced non-small-cell lung cancer：final results of a phase III trial  
2013年4月度化学療法プロトコール審査委員会承認：2013年4月8日 更新:2019年2月27日

対象： E G F R変異陽性非小細胞肺癌（進行・再発） 1st Line  
レジメン名： **CBDCA+PEM+Gefitinib療法**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間                               |
| 目標コース：    | <b>6コース施行後、Pemetrexed+Gefitinib維持療法を継続</b> |
| 使用基準：     | class A （扁平上皮癌への使用は避けること。）                 |

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

※EGFR変異陽性非小細胞肺癌を対象とすること

《 使 用 薬 剤 》

カルボプラチン（CBDCA）：（カルボプラチン） 150mg/V、450mg/V

ペメトレキセド（PEM）：（ペメトレキセド） 100mg・500mg・800mg/V

ゲフィチニブ（Gefitinib）：（ゲフィチニブ） 250mg錠

《 投 与 量 》

|              |       |                                              |       |         |     |
|--------------|-------|----------------------------------------------|-------|---------|-----|
| Cre値 (mg/dl) |       | Calvertの計算式：投与量(mg/body) = 目標AUC値 × (GFR+25) |       |         |     |
| 目標AUC        | 5     | GFRはCcrを代用して計算。                              |       |         |     |
| 薬 剤 名        | 標準投与量 |                                              | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
| ゲフィチニブ       | 250   | mg/day                                       | 250   |         | 1   |
| カルボプラチン      | 5     | AUC                                          | #REF! |         | 1   |
| ペメトレキセド      | 500   | mg/m <sup>2</sup>                            | #REF! |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|              |   |                                       |                                               |          |                    |
|--------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------------|
| 初回投与 7 日以上前に |   |                                       |                                               |          |                    |
|              |   | 筋注                                    | メチコパール注500 μ g 2 A 筋注。以後、3 クール（9 週間）毎に 1 回投与。 |          |                    |
|              |   | 内服                                    | バンピタン末1 g /日（葉酸 0.5mg/日）毎日内服。                 |          |                    |
| Day1 ；       |   | 1月1日(土)                               |                                               |          |                    |
| 0時00分        |   | 内服                                    | アプレピタントカプセル 125mg 1 × (1) カルボプラチン開始 1 時間前頃    |          |                    |
| 0時35分        | ① | 生理食塩液 50mL + パロノセトロン 1V + デキサート 6.6mg |                                               |          |                    |
|              |   | 15 分で点滴静注                             |                                               |          |                    |
| 0時50分        | ② | 生理食塩液 100mL + ペメトレキシド                 |                                               | 0mg      | 0.00mL             |
|              |   | 10 分で点滴静注                             |                                               |          |                    |
| 1時00分        | ③ | 5 %ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン              |                                               | 0mg      | 0.00mL             |
|              |   | 60 分で点滴静注                             |                                               |          |                    |
| 2時00分        | ④ | 生理食塩液 50mL                            |                                               |          |                    |
|              |   | フラッシュ                                 |                                               |          |                    |
|              |   |                                       |                                               |          |                    |
| Day2～3 ；     |   | 1月2日(日)                               | ～                                             | 1月3日(月)  |                    |
| 起床後          |   | 内服                                    | アプレピタントカプセル 80mg 1 × (2) 起床後                  |          |                    |
|              |   |                                       |                                               |          |                    |
| Day1～21 ；    |   | 1月1日(土)                               | ～                                             | 1月21日(金) |                    |
| 起床後          |   | 内服                                    | ゲフィチニブ錠                                       | 0mg/日    | 1 日 1 回（食後） 連日経口投与 |

REFERENCE

Yukio Hosomi,MD,PhD;Satoshi Morita,PhD,Shunichi Sugawara,Md,PhD et al :J Clin Oncol 38:115-123, 2019  
Gefitinib Alone Versus Gefitinib Plus Chemotherapy for Non-Small-Cell Lung Cancer With Mutated Epidermal Growth Factor Receptor:Nej009 study  
2020年9月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2020年9月14日 更新2021年11月8日

対象： 非小細胞肺癌（進行・再発） 1st Line

レジメン名： **CBDCA+PEM療法**

コース目

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間               |
| 目標コース：    | 6コース                       |
| 使用基準：     | class A （扁平上皮癌への使用は避けること。） |

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

《 使用 薬 剤 》

カルボプラチン（CBDCA）：（カルボプラチン） 150mg/V、450mg/V

ペメトレキシド（PEM）：（ペメトレキシド） 100mg・500mg・800mg/V

《 投 与 量 》

|              |                       |                                              |         |     |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------|-----|
| Cre値 (mg/dl) |                       | Calvertの計算式：投与量(mg/body) = 目標AUC値 × (GFR+25) |         |     |
| 目標AUC        | 5                     | GFRはCcrを代用して計算。                              |         |     |
| 薬 剤 名        | 標準投与量                 | 計算値                                          | 投与量(mg) | 投与日 |
| カルボプラチン      | 5 AUC                 | #REF!                                        |         | 1   |
| ペメトレキシド      | 500 mg/m <sup>2</sup> | #REF!                                        |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

初回投与 7 日以上前に

**筋注** メチコパール注500μg 2 A 筋注。以後、3クール（9週間）毎に1回投与。

**内服** パンビタン末1g/日（葉酸 0.5mg/日）毎日内服。

Day1； 1月1日(土)

|       |           |                                            |  |  |
|-------|-----------|--------------------------------------------|--|--|
| 0時00分 | <b>内服</b> | アプレピタントカプセル 125mg 1 × (1) カルボプラチン開始 1 時間前頃 |  |  |
| 0時35分 | ①         | 生理食塩液 50mL + パロノセトロン 1V + デキサート 6.6mg      |  |  |
|       |           | 15 分で点滴静注                                  |  |  |
| 0時50分 | ②         | 生理食塩液 100mL + ペメトレキシド 0mg 0.00mL           |  |  |
|       |           | 10 分で点滴静注                                  |  |  |
| 1時00分 | ③         | 5 %ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン 0mg 0.00mL        |  |  |
|       |           | 60 分で点滴静注                                  |  |  |
| 2時00分 | ④         | 生理食塩液 50mL                                 |  |  |
|       |           | フラッシュ                                      |  |  |

|         |           |                              |         |
|---------|-----------|------------------------------|---------|
| Day2～3； | 1月2日(日)   | ～                            | 1月3日(月) |
| 起床後     | <b>内服</b> | アプレピタントカプセル 80mg 1 × (2) 起床後 |         |

REFERENCE

Bjorn H.Gronberg,Roy M.Bremnes, Oystein Flotten, et al：J Clin Oncol 27：3217-3224, 2009

Phase III study by the Norwegian lung cancer study group:pemetrexed plus carboplatin compared with gefitinib plus

2011年11月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2011年11月14日 更新:2019年2月18日、2021年11月8日

対象： 非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）（進行・再発） 1st Line

レジメン名： **CBDCA+PTX+Bevacizumab療法**

|         |        |                       |       |       |            |
|---------|--------|-----------------------|-------|-------|------------|
|         | コース目   |                       |       |       |            |
| 患者 I D： | #REF!  |                       |       |       |            |
| 患者氏名：   | #REF!  |                       |       |       |            |
| 身長(cm)  | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    | アルコールアレルギー |
| #REF!   | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |            |

※必ず無しを確認

|           |              |
|-----------|--------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間 |
| 使用基準：     | class A      |

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アライキシー様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ **喀血**（2.5mL以上の鮮血の喀血）の既往のある患者には禁忌。

※ 投与前に凝固系(PT-INR,D-ダイマー、等)の検査を実施し、投与中にも必要に応じ検査を行うこと。

※ 原則、埋め込み式ポート挿入後 1 週間以上、腹部手術前後は 6 週間以上空けて投与。

《 使用 薬 剤 》

カルボプラチン（CBDCA）：（カルボプラチン） 150mg/15mL/V、450mg/45mL/V

パクリタキセル（PTX）：（パクリタキセル） 30mg/5mL/V、100mg/16.7mL/V

ベバシズマブ（BEV）：（ベバシズマブBS） 100mg/4mL/V、400mg/16mL/V

《 投 与 量 》

|              |                       |                                              |         |     |  |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------|-----|--|
| Cre値 (mg/dl) |                       | Calvertの計算式：投与量(mg/body) = 目標AUC値 × (GFR+25) |         |     |  |
| 目標AUC        | 6                     | GFRはCcrを代用して計算。                              |         |     |  |
| 薬 剤 名        | 標準投与量                 | 計算値                                          | 投与量(mg) | 投与日 |  |
| ベバシズマブBS     | 15 mg/kg              | #REF!                                        |         | 1   |  |
| パクリタキセル      | 200 mg/m <sup>2</sup> | #REF!                                        |         | 1   |  |
| カルボプラチン      | 6 AUC                 | #REF!                                        |         | 1   |  |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |         |                                                                                          |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Day1； | 1月1日(土) |                                                                                          |
| 0時00分 | 内服      | レスタミンコーワ錠(10mg) 5錠 ①の点滴直前に内服                                                             |
| 0時00分 | ①       | 生理食塩液 50mL + ファモチジン 1A + デキサート 16.5mg<br>15 分で点滴静注                                       |
| 0時15分 | ②       | 生理食塩液 100mL + パロノセトロン 1V<br>30 分で点滴静注                                                    |
| 0時45分 | ③       | 生理食塩液 500mL + <b>パクリタキセル 0mg</b><br>3 時間で点滴静注<br><u>0.2μm or 0.22μmのフィルター型輸液セットを使用する</u> |
| 3時45分 | ④       | 5 %ブドウ糖液 250mL + <b>カルボプラチン 0mg</b> 0<br>60 分で点滴静注                                       |
| 6時45分 | ⑤       | 生理食塩液 100mL + <b>ベバシズマブBS 0mg</b> 0<br>90 分で点滴静注<br>(初回は90分、2 回目以降は60分・30分に変更可)          |
| 8時15分 | ⑥       | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                      |

REFERENCE

1. Alan Sandler, M.D., Robert Gray, Ph.D., Michael C. Perry, M.D., et al : N Engl J Med 2006;355:2542-2550  
Paclitaxel-carboplatin alone or with bevacizumab for non-small-cell-lung cancer.

2. M. Nishio, T. Horai, H. Kunitoh, et al:J Clin Oncol 27:15s, 2009  
Randomized, open-label, multicenter phase II study of bevacizumab in combination with carboplatin and paclitaxel in chemotherapy-naïve Japanese patients with advanced or recurrent nonsquamous non-small cell lung cancer (NSCLC):JO19907.

2010年11月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2010年11月8日 更新:2019年2月18日

対象： 非小細胞肺癌（進行・再発） 1st Line

## レジメン名： CBDCA+PTX療法

コース目

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |            |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|------------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    | アルコールアレルギー |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |            |

※必ず無しを確認

|           |              |
|-----------|--------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間 |
| 使用基準：     | class A      |

### 《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

### 《 使用 薬 剤 》

カルボプラチン（CBDCA）：（カルボプラチン） 150mg/15mL/V、450mg/45mL/V

パクリタキセル（PTX）：（パクリタキセル） 30mg/5mL/V、100mg/16.7mL/V

### 《 投 与 量 》

|              |                       |                                              |         |     |  |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------|-----|--|
| Cre値 (mg/dl) |                       | Calvertの計算式：投与量(mg/body) = 目標AUC値 × (GFR+25) |         |     |  |
| 目標AUC        | 6                     | GFRはCcrを代用して計算。                              |         |     |  |
| 薬 剤 名        | 標準投与量                 | 計算値                                          | 投与量(mg) | 投与日 |  |
| パクリタキセル      | 200 mg/m <sup>2</sup> | #REF!                                        |         | 1   |  |
| カルボプラチン      | 6 AUC                 | #REF!                                        |         | 1   |  |

### 《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |         |                                       |   |             |        |
|-------|---------|---------------------------------------|---|-------------|--------|
| Day1； | 1月1日(土) |                                       |   |             |        |
| 0時00分 | 内服      | レスタミンコーワ錠(10mg) 5 錠 ①の点滴直前に内服         |   |             |        |
| 0時00分 | ①       | 生理食塩液 50mL + ファモチジン 1A + デキサート 16.5mg |   |             |        |
|       |         | 15 分で点滴静注                             |   |             |        |
| 0時15分 | ②       | 生理食塩液 100mL + パロノセトロン 1V              |   |             |        |
|       |         | 30 分で点滴静注                             |   |             |        |
| 0時45分 | ③       | 生理食塩液 500mL                           | + | パクリタキセル 0mg | 0.00mL |
|       |         | 3 時間で点滴静注                             |   |             |        |
|       |         | 0.2 μm or 0.22 μmのフィルター体型輸液セットを使用する   |   |             |        |
| 3時45分 | ④       | 5 %ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン 0mg          |   |             | 0.00mL |
|       |         | 60 分で点滴静注                             |   |             |        |
| 4時45分 | ⑤       | 生理食塩液 50mL                            |   |             |        |
|       |         | フラッシュ                                 |   |             |        |

### REFERENCE

Y. Ohe, Y. Ohayashi, K. Kubota, et al : Annals of Oncology 18 : 317-323, 2007

Randomized phase III study of cisplatin plus irinotecan versus carboplatin plus paclitaxel, cisplatin plus gemcitabine, and cisplatin vinorelbine for advanced non-small-cell lung cancer: four-arm cooperative study in Japan

第9回化学療法プロトコル審査委員会承認：2009年8月6日 更新:2019年2月18日

対象： 非小細胞肺癌（進行・再発） 1st Line

レジメン名： **CBDCA+S-1療法**

コース目

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 投与スケジュール： | 1コース 21日間 |
| 目標コース：    | 6コース      |
| 使用基準：     | class A   |

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

《 使用薬剤 》

カルボプラチン（CBDCA）：（カルボプラチン） 150mg／15mL／V、450mg／45mL／V

テガフル・ギメシル・オテラシルK（S-1）： 20mg ・ 25mg／T

《 投 与 量 》

|             |                      |                                              |         |            |
|-------------|----------------------|----------------------------------------------|---------|------------|
| Cre値（mg/dl） |                      | Calvertの計算式：投与量(mg/body) = 目標AUC値 × (GFR+25) |         |            |
| 目標AUC       | 5                    | GFRはCcrを代用して計算。                              |         |            |
| 薬 剤 名       | 標準投与量                | 計算値                                          | 投与量(mg) | 投与日        |
| S-1         | 80 mg/m <sup>2</sup> | 下記に従う                                        |         | 1(夕)～15(朝) |
| カルボプラチン     | 5 AUC                | #REF!                                        |         | 1          |

S-1：1.25m<sup>2</sup>未満;80mg/日 1.25～1.5m<sup>2</sup>未満;100mg/日 1.5m<sup>2</sup>以上;120mg/日

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

※ 内服薬は1日目夕食後より内服開始

内服

エスワンタイホウ配合OD錠 0mg

朝・夕食後 Day 1(夕)～15(朝)

Day1； 1月1日(土)

|       |   |                                                    |
|-------|---|----------------------------------------------------|
| 0時00分 | ① | 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1A + デキサート 13.2mg<br>15分で点滴静注 |
| 0時15分 | ② | 5%ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン 0mg 0.00mL<br>60分で点滴静注     |
| 1時15分 | ③ | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                |

## REFERENCE

Isamu Okamoto,Hiroshige Yoshioka,Satosi Morita, et al：J Clin Oncol 28：5240-5246, 2010

Phase III trial comparing oral S-1 plus Carboplatin with Paclitaxel plus Carboplatin in chemotherapy-naïve patients with advanced non-small-cell lung cancer:results of a west japan oncology group study

2011年12月度化学療法プロトコール審査委員会承認：2011年12月19日

対象： 非小細胞肺癌 （進行・再発） 1st Line  
レジメン名： **CDDP+CPT-11療法**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 28日間              |
| 使用基準：     | class A Day8、15：class C |

《 注 意 》

※**下痢・腸閉塞の患者には禁忌！！**

※ U G T 1 A 1 遺伝子多型検査を考慮

指示： 体重測定 毎日起床時

注意： Day4以降も水分摂取が少ない場合や尿量が少ない場合には、輸液を考慮すること

《 使用薬剤 》

シスプラチン；（C D D P）：シスプラチン注（50mg/100mL/V、10mg/20mL/V）

イリノテカン（CPT-11）：（イリノテカン塩酸塩点滴静注液） 40mg／2mL／V、100mg／5mL／V

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名  | 標準投与量                | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日    |
|--------|----------------------|-------|---------|--------|
| シスプラチン | 80 mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1      |
| イリノテカン | 60 mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1,8,15 |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※**記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。**

|       |         |                                                                    |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| Day1； | 1月1日(土) |                                                                    |
| 0時00分 | ①       | 生理食塩液 500mL<br>2 時間で点滴静注                                           |
| 2時00分 | ②       | 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1 A + デキサート 9.9mg<br>15 分で点滴静注                |
| 2時15分 | ③       | 生理食塩液 250mL + <b>イリノテカン 0mg</b> <b>0.00mL</b><br>90 分で点滴静注         |
| 2時45分 |         | <b>内服</b> アブレピタントカプセル 125mg 1 × (1) シスプラチン開始 1 時間前頃                |
| 3時45分 | ④       | 生理食塩液 <b>700 mL</b> + <b>シスプラチン 0mg</b> <b>0.00mL</b><br>2 時間で点滴静注 |
| 5時45分 | ⑤       | 生理食塩液 500mL<br>2 時間で点滴静注                                           |
| 7時45分 | ⑥       | ソリタ T 3 号 500mL × 3<br>6 時間 (2時間 × 3) で点滴静注                        |

|       |           |   |                                           |
|-------|-----------|---|-------------------------------------------|
| Day2； | 1月2日(日)   | ～ | 1月3日(月)                                   |
| 起床後   | <b>内服</b> |   | アブレピタントカプセル 80mg 1 × (2) 起床後              |
| 2時00分 | ①         |   | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注     |
| 2時15分 | ②         |   | ソリタ T 3 500mL × 3<br>6 時間 (2時間 × 3) で点滴静注 |

|          |         |                                                            |
|----------|---------|------------------------------------------------------------|
| Day8,15； | 1月8日(土) | 1月15日(土)                                                   |
| 2時00分    | ①       | 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1 A + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注        |
| 2時15分    | ②       | 生理食塩液 250mL + <b>イリノテカン 0mg</b> <b>0.00mL</b><br>90 分で点滴静注 |
| 3時45分    | ③       | 生理食塩液 500mL<br>フラッシュ                                       |

REFERENCE

Y. Ohe, Y. Ohashi, K. Kubota, et al: Annal of Oncology 18:317-323, 2007

Randomized phase III study of cisplatin plus irinotecan versus carboplatin plus paclitaxel, cisplatin plus gemcitabine, and cisplatin plus vinorelbine for advanced non-small-cell lung cancer: Four-Arm Cooperative Study in Japan.

第11回化学療法プロトコール審査委員会承認:2009年11月19日 更新:2016年7月14日

対象： 非小細胞肺癌 （進行・再発） 1st Line  
レジメン名： **CDDP+DTX療法(short hydration)**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |               |
|-----------|---------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 21～28日間 |
| 目標コース：    | 6コース          |
| 使用基準：     | class A       |

《 注 意 》

指示 1： 体重測定                  毎日起床時

注意： Day4以降も水分摂取が少ない場合や尿量が少ない場合には、輸液を考慮すること

《 使 用 薬 剤 》

シスプラチン；（C D D P）：シスプラチン注（50mg/100mL/V、10mg/20mL/V）

ドセタキセル（DTX）：ドセタキセル点滴静注（1 V：20mg、80mg）

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名  | 標準投与量                         | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|--------|-------------------------------|-------|---------|-----|
| シスプラチン | 80          mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1   |
| ドセタキセル | 60          mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |         |                                                                                                           |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Day1； | 1月1日(土) |                                                                                                           |
| 0時00分 | ①       | 生理食塩液 500mL + 硫酸Mg補正液 8mL<br>1 時間で点滴静注                                                                    |
| 1時00分 | ②       | ソリタ T 3 号 500mL<br>1 時間で点滴静注                                                                              |
| 2時00分 | ③       | 生理食塩液 50mL + パロノセトロン 1 V + デキサート 9.9mg<br>15 分で点滴静注                                                       |
| 2時15分 | ④       | 生理食塩液 250mL + <b>ドセタキセル 0mg</b> <b>0.00mL</b><br>60 分かけて点滴静注<br><u>点滴開始から10分間は点滴速度を遅めに設定して、全身状態を観察する。</u> |
| 2時45分 |         | <b>内服</b> アブレピタントカプセル 125mg 1 × (1) シスプラチン開始 1 時間前頃                                                       |
| 3時15分 | ⑤       | マンニトール 300mL<br>30 分以内で点滴静注                                                                               |
| 3時45分 | ⑥       | 生理食塩液 <b>700 mL</b> + <b>シスプラチン 0mg</b> <b>0.00mL</b><br>90 分で点滴静注                                        |
| 5時15分 | ⑦       | 生理食塩液 500mL<br>1 時間で点滴静注                                                                                  |
| 6時15分 | ⑧       | ソリタ T 3 号 500mL<br>1 時間で点滴静注                                                                              |

|       |         |   |                                             |
|-------|---------|---|---------------------------------------------|
| Day2； | 1月2日(日) | ～ | 1月3日(月)                                     |
| 起床後   |         |   | <b>内服</b> アブレピタントカプセル 80mg 1 × (2) 起床後      |
| 2時00分 | ①       |   | 生理食塩液 50mL + デキサート6.6mg<br>15 分で点滴静注        |
| 2時15分 | ②       |   | ソリタ T 3 500mL × 3<br>4.5 時間 (1.5時間×3) で点滴静注 |

REFERENCE

Kaoru Kubota, Koshiro Watanabe, Hideo Kunitoh, et al: J Clin Oncol 22:254-261, 2004

Phase III Randomized Trial of Docetaxel Plus Cisplatin Versus Vindesine Plus Cisplatin in Patients With Stage IV Non-Small-Cell-Lung Cancer: The Japanese Taxotere Lung Cancer Study Group.

第11回化学療法プロトコル審査委員会承認:2009年11月19日 更新:2016年11月17日

対象： 非小細胞肺癌 （進行・再発） 1st Line  
レジメン名： **CDDP+DTX療法+RT**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 5 6 日（続いてDurvalumab維持療法を行う場合は3 6 日間） |
| 使用基準：     | class A                                    |

《 注 意 》

指示1： 体重測定 毎日起床時

注意： Day4以降も水分摂取が少ない場合や尿量が少ない場合には、輸液を考慮すること

《 使用 薬 剤 》

シスプラチン；（C D D P）：シスプラチン注（50mg/100mL/V、10mg/20mL/V）

ドセタキセル（DTX）：ドセタキセル点滴静注（1V：20mg、80mg）

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名  | 標準投与量 |                   | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日       |
|--------|-------|-------------------|-------|---------|-----------|
| シスプラチン | 40    | mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1,8,29,36 |
| ドセタキセル | 40    | mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1,8,29,36 |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

| Day1,8,29,36 ; | 1月1日(土)   | 1月8日(土)                                                                                                   | 1月29日(土)                                  | 2月5日(土) |  |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|--|
| 0時00分          | ①         | ソリタ T 3 号 500mL + 硫酸Mg補正液 8mL<br>1 時間で点滴静注                                                                |                                           |         |  |
| 1時00分          | ②         | ヴィーン D 500m L<br>1 時間で点滴静注                                                                                |                                           |         |  |
| 2時00分          | ③         | 生理食塩液 50mL + パロノセトロン 1V + デキサート 9.9mg<br>15 分で点滴静注                                                        |                                           |         |  |
| 2時15分          | ④         | 生理食塩液 250mL + <b>ドセタキセル 0mg</b> <b>0.00mL</b><br>60 分かけて点滴静注<br><u>点滴開始から10分間は点滴速度を遅めに設定して、全身状態を観察する。</u> |                                           |         |  |
| 2時45分          | <b>内服</b> |                                                                                                           | アプレピタントカプセル 125mg 1 × (1) シスプラチン開始 1 時間前頃 |         |  |
| 3時15分          | ⑤         | マンニトール 300mL<br>30 分以内に点滴静注                                                                               |                                           |         |  |
| 3時45分          | ⑥         | 生理食塩液 <b>700 mL</b> + <b>シスプラチン 0mg</b> <b>0.00mL</b><br>90 分で点滴静注                                        |                                           |         |  |
| 5時15分          | ⑦         | ソリタ T 3 号 500m L<br>1 時間で点滴静注                                                                             |                                           |         |  |
| 6時15分          | ⑧         | ヴィーン D 500m L<br>1 時間で点滴静注                                                                                |                                           |         |  |

|       |           |                              |         |
|-------|-----------|------------------------------|---------|
| Day2； | 1月2日(日)   | ～                            | 1月3日(月) |
| 起床後   | <b>内服</b> | アプレピタントカプセル 80mg 1 × (2) 起床後 |         |

REFERENCE

Yoshihiko Segawa,Katsuyuki Kiura,Nagio Takigawa: J Clin Oncol 2010;28(10):3299-306

Phase III trial comparing docetaxel and cisplatin combination chemotherapy with mitomycin,vindesine,and cisplatin combination chemotherapy with concurrent thoracic radiotherapy in locally advanced non-small-cell lung cancer:OLCSG0007

2011年10月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2011年10月17日 更新:2016年11月17日

対象： 非小細胞肺癌 （進行・再発）1st Line  
レジメン名： **CDDP+GEM療法(short hydration)**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 21～28日間         |
| 目標コース：    | 6コース                  |
| 使用基準：     | class A, Day8：class C |

《 注 意 》

指示 1： 体重測定                      毎日起床時  
注意： Day4以降も水分摂取が少ない場合や尿量が少ない場合には、輸液を考慮すること

《 使用 薬 剤 》

シスプラチン；（CDDP）：シスプラチン注（50mg/100mL/V、10mg/20mL/V）  
ゲムシタビン（GEM）：ゲムシタビン点滴静注用 200、1000 mg/V

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名  | 標準投与量                            | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|--------|----------------------------------|-------|---------|-----|
| シスプラチン | 80            mg/m <sup>2</sup>  | #REF! |         | 1   |
| ゲムシタビン | 1000           mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1,8 |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |         |                                                    |        |  |
|-------|---------|----------------------------------------------------|--------|--|
| Day1； | 1月1日(土) |                                                    |        |  |
| 0時00分 | ①       | 生理食塩液 500mL + 硫酸Mg補正液 8mL<br>1 時間で点滴静注             |        |  |
| 1時00分 | ②       | ソリタ T 3 号 500mL<br>1 時間で点滴静注                       |        |  |
| 2時00分 | ③       | 生理食塩液 50mL + パロノセトロン 1V + デキサート 9.9mg<br>15 分で点滴静注 |        |  |
| 2時15分 | 内服      | アブレビタントカプセル 125mg 1 × (1) シスプラチン開始 1 時間前頃          |        |  |
| 2時15分 | ④       | 生理食塩液 100mL + ゲムシタビン 0mg<br>30 分で点滴静注              |        |  |
| 2時45分 | ⑤       | マンニトール 300mL<br>30 分以内で点滴静注                        |        |  |
| 3時15分 | ⑥       | 生理食塩液 700 mL + シスプラチン 0mg<br>90 分で点滴静注             | 0.00mL |  |
| 4時45分 | ⑦       | 生理食塩液 500mL<br>1 時間で点滴静注                           |        |  |
| 5時45分 | ⑧       | ソリタ T 3 号 500mL<br>1 時間で点滴静注                       |        |  |

|         |         |                                               |         |  |
|---------|---------|-----------------------------------------------|---------|--|
| Day2～3； | 1月2日(日) | ～                                             | 1月3日(月) |  |
| 起床後     | 内服      | アブレビタントカプセル 80mg 1 × (2) 起床後                  |         |  |
| 2時00分   | ①       | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注         |         |  |
| 2時15分   | ②       | ソリタ T 3 500mL × 3<br>4.5 時間 (1.5時間 × 3) で点滴静注 |         |  |

|       |         |                                       |  |  |
|-------|---------|---------------------------------------|--|--|
| Day8； | 1月8日(土) |                                       |  |  |
| 2時15分 | ①       | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注 |  |  |
| 2時30分 | ②       | 生理食塩液 100mL + ゲムシタビン 0mg<br>30 分で点滴静注 |  |  |
| 3時00分 | ③       | 生理食塩液 500mL<br>フラッシュ                  |  |  |

REFERENCE  
Kaoru Kubota, Koshiro Watanabe, Hideo Kunitoh, et al: J Clin Oncol 22:254-261, 2004  
Phase III Randomized Trial of Docetaxel Plus Cisplatin Versus Vindesine Plus Cisplatin in Patients With Stage IV Non-Small-Cell-Lung Cancer: The Japanese Taxotere Lung Cancer Study Group.  
第11回化学療法プロトコル審査委員会承認:2009年11月19日 更新:2016年11月17日

対象： 非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）（進行・再発） 1st Line  
レジメン名： **CDDP+PEM療法(short hydration)**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間               |
| 目標コース：    | 6コース                       |
| 使用基準：     | class A （扁平上皮癌への使用は避けること。） |

《 注 意 》  
適正使用ガイドに準じる。  
指示 1： 体重測定 毎日起床時  
注意： Day4以降も水分摂取が少ない場合や尿量が少ない場合には、輸液を考慮すること

《 使 用 薬 剤 》  
ペメトレキシド：（ペメトレキシド） 100mg・500mg・800mg/V  
シスプラチン；（C D D P）：シスプラチン注（50mg/100mL/V、10mg/20mL/V）

| 薬 剤 名   | 標準投与量     | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|---------|-----------|-------|---------|-----|
| ペメトレキシド | 500 mg/m2 | #REF! |         | 1   |
| シスプラチン  | 75 mg/m2  | #REF! |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》  
※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|              |         |                                                    |   |         |  |
|--------------|---------|----------------------------------------------------|---|---------|--|
| 初回投与 7 日以上前に |         |                                                    |   |         |  |
|              | 筋注      | メチコパール注500μ g 2 A 筋注。以後、3クール（9週間）毎に1回投与。           |   |         |  |
|              | 内服      | パンビタン末1 g / 日（葉酸 0.5mg/日）毎日内服。                     |   |         |  |
| Day1；        | 1月1日(土) |                                                    |   |         |  |
| 0時00分        | ①       | 生理食塩液 500mL + 硫酸Mg補正液 8mL<br>1 時間で点滴静注             |   |         |  |
| 1時00分        | ②       | ソリタ T 3 号 500mL<br>1 時間で点滴静注                       |   |         |  |
| 1時55分        | 内服      | アプレビタントカプセル 125mg 1 × (1) シスプラチン開始 1 時間前頃          |   |         |  |
| 2時00分        | ③       | 生理食塩液 50mL + パロノセトロン 1V + デキサート 9.9mg<br>15 分で点滴静注 |   |         |  |
| 2時15分        | ④       | 生理食塩液 100mL + ペメトレキシド 0mg 0.00mL<br>10 分で点滴静注      |   |         |  |
| 2時25分        | ⑤       | マンニトール 300mL<br>30 分で点滴静注                          |   |         |  |
| 2時55分        | ⑥       | 生理食塩液 700 mL + シスプラチン 0mg 0.00mL<br>90 分で点滴静注      |   |         |  |
| 4時25分        | ⑦       | 生理食塩液 500mL<br>1 時間で点滴静注                           |   |         |  |
| 5時25分        | ⑧       | ソリタ T 3 号 500mL<br>1 時間で点滴静注                       |   |         |  |
|              |         |                                                    |   |         |  |
| Day2～3；      | 1月2日(日) |                                                    | ～ | 1月3日(月) |  |
| 起床後          | 内服      | アプレビタントカプセル 80mg 1 × (2) 起床後                       |   |         |  |
| 2時00分        | ①       | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注              |   |         |  |
| 2時15分        | ③       | ソリタ T 3 号 500mL × 3<br>4.5 時間 (1.5時間 × 3) で点滴静注    |   |         |  |

REFERENCE  
Giorgio Vittorio Scagliotti, Purvish Parikh, Joachim von Pawel, et al: J Clin Oncol 26 : 3543-3551, 2008  
Phase III study comparing cisplatin plus gemcitabine with cisplatin plus pemetrexed in chemotherapy-naive patients with advanced-stage non-small-cell-lung cancer.  
第9回化学療法プロトコル審査委員会承認：2009年8月6日 更新:2011年11月14日(SH), 2016年7月14日、2021年11月8日

対象： 非小細胞肺癌（切除不能局所進行Ⅲ期） 臨床試験 Samurai 1901

レジメン名： CDDP+S-1療法(short hydration)+RT

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 28日間                                          |
| 目標コース：    | 2コース （維持療法としてDurvalumab(10mg/kg) , 2週毎, 最大12カ月まで継続) |
| 使用基準：     | Samurai 1901試験 研究計画書内容に遵守する事                        |

《 注 意 》

指示 1： 体重測定 毎日起床時  
注意： Day4以降も水分摂取が少ない場合や尿量が少ない場合には、輸液を考慮すること

適格基準

| 項目     | 程度                         | 項目               | 程度            |
|--------|----------------------------|------------------|---------------|
| 好中球数   | 1,500/mm <sup>3</sup> 以上   | 血清クレアチニン         | ≦1.5 mg/dL    |
| 血小板数   | 100,000/mm <sup>3</sup> 以上 | 又は               |               |
| ヘモグロビン | 9.0 g/dL 以上                | クレアチンクリアランス      | >50 mL/min    |
|        |                            | ビリルビン            | ≦1.5 x ULN    |
|        |                            | AST及びALT         | ≦2.5 x ULN    |
|        |                            | SpO <sub>2</sub> | ≧92 %         |
|        |                            | 又は               |               |
|        |                            | PaO <sub>2</sub> | ≧70 Torr(室内気) |

次コース開始基準

| 項目       | 程度                         |
|----------|----------------------------|
| 白血球数     | 3,000/mm <sup>3</sup> 以上   |
| 好中球数     | 1,500/mm <sup>3</sup> 以上   |
| 血小板数     | 100,000/mm <sup>3</sup> 以上 |
| 発熱       | 38℃以上の発熱がない                |
| 総ビリルビン   | 1.5 mg/dL 以下               |
| AST及びALT | 100 IU/L 以下                |
| クレアチニン   | 1.2 mg/dL 以下               |

《 使用薬剤 》

シスプラチン；（CDDP）：シスプラチン注（50mg/100mL/V、10mg/20mL/V）  
カゲフル・キメタシル・オタシルK（S-1）：（エスワンタイホ） 20mg ・ 25mg/Ｔ

《 投与量 》

| 薬 剤 名  | 標準投与量                | 計算値                  | 投与量(mg)         | 投与日        |
|--------|----------------------|----------------------|-----------------|------------|
| シスプラチン | 60 mg/m <sup>2</sup> | #REF!                |                 | 1          |
| エスワン   | 下記に従う                |                      |                 | 1(夕)～15(朝) |
|        | 1.25m2未満;80mg/日      | 1.25～1.5m2未満;100mg/日 | 1.5m2以上;120mg/日 |            |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

※ 内服薬は1日目夕食後より内服開始

内服 エスワンタイホウ配合OD錠 0mg 朝・夕食後 Day 1 (夕)～15(朝)

|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| Day1；   | 1月1日(土)                                              |
| 0時00分   | ① 生理食塩液 500mL + 硫酸Mg補正液 8mL<br>1 時間で点滴静注             |
| 1時00分   | ② ソリタ T 3 号 500mL<br>1 時間で点滴静注                       |
| 1時45分   | 内服 アプレピタントカプセル 125mg 1 × (1) シスプラチン開始 1 時間前頃         |
| 2時00分   | ③ 生理食塩液 50mL + パロノセトロン 1V + デキサート 9.9mg<br>15 分で点滴静注 |
| 2時15分   | ④ マンニトール 300mL<br>30 分以内で点滴静注                        |
| 2時45分   | ⑤ 生理食塩液 700 mL + シスプラチン 0mg 0.00mL<br>90 分で点滴静注      |
| 4時15分   | ⑥ 生理食塩液 500mL<br>1 時間で点滴静注                           |
| 5時15分   | ⑦ ソリタ T 3 号 500mL<br>1 時間で点滴静注                       |
| Day2～3； | 1月2日(日) ～ 1月3日(月)                                    |
| 起床後     | 内服 アプレピタントカプセル 80mg 1 × (2) 起床後                      |
| 2時00分   | ① 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注              |
| 2時15分   | ② ソリタ T 3 500mL × 3<br>4.5 時間 (1.5時間 × 3) で点滴静注      |

REFERENCE

研究代表者 帝京大学医学部内科学講座 関順彦  
局所進行期非小細胞肺癌に対するCDDP+S-1併用化学放射線治療後のDurvalumab維持療法（第Ⅱ相試験）Samurai 1901  
化学療法プロトコール審査委員会 迅速審査承認：2019年12月27日

レジメン名： **CDDP+VNR療法**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|        |       |
|--------|-------|
| 患者ID : | #REF! |
| 患者氏名 : | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 21日間             |
| 使用基準：     | class A Day8 : Class C |

注意： Day4以降も水分摂取が少ない場合や尿量が少ない場合には、輸液を考慮すること

ビノレルビン (VNR) : (ロゼウス) 40mg/4mL/V、10mg/1mL/V

| 薬 剤 名  | 標準投与量                | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|--------|----------------------|-------|---------|-----|
| シスプラチン | 80 mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1   |
| ロゼウス   | 25 mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1,8 |

| 0時00分 | ①  | 生理食塩液 500mL                 |              |                   |
|-------|----|-----------------------------|--------------|-------------------|
|       |    | 2 時間で点滴静注                   |              |                   |
| 1時15分 | 内服 | アブレピタントカプセル 125mg           | 1 × (1)      | シスプラチン開始 1 時間前頃   |
| 2時00分 | ②  | 生理食塩液 50mL +                | グラニセトロン 1A + | デキササート 9.9mg      |
|       |    | 15 分で点滴静注                   |              |                   |
| 2時15分 | ③  | 生理食塩液 50mL +                | ロゼウス 0mg     | 0.00mL            |
|       |    | 全開 10分以内で点滴静注 (終了後、直ちに④を開始) |              |                   |
|       |    | ※血管痛、静脈炎に注意                 |              |                   |
| 2時25分 | ④  | 生理食塩液 250mL (ロゼウス終了後直ちに)    |              |                   |
|       |    | 全開 20分以内で点滴静注               |              |                   |
| 2時35分 | ⑤  | 生理食塩液                       | 700 mL +     | シスプラチン 0mg 0.00mL |
|       |    | 2 時間で点滴静注                   |              |                   |
| 4時35分 | ⑥  | 生理食塩液 500mL                 |              |                   |
|       |    | 2 時間で点滴静注                   |              |                   |
| 6時35分 | ⑦  | ソリタ T 3 号 500mL × 3         |              |                   |
|       |    | 6 時間 (2時間 × 3) で点滴静注        |              |                   |

2時15分                      ②                      ソリタ T 3 500mL × 3  
6 時間 (2時間×3) で点滴静注

全開 20分以内で点滴静注

第9回化学療法プロトコル審査委員会承認：2009年8月6日 更新:2016年7月14日

対象： 非小細胞肺癌（進行・再発）1st Line  
レジメン名： **CDDP+VNR療法 + RT**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 投与スケジュール： | 1コース 28日間            |
| 使用基準：     | class A Day8：Class C |

《 注 意 》

指示1： 体重測定                      毎日起床時  
注意： Day4以降も水分摂取が少ない場合や尿量が少ない場合には、輸液を考慮すること

《 使用薬剤 》

シスプラチン；（CDDP）：シスプラチン注（50mg/100mL/V、10mg/20mL/V）  
ビノレルビン（VNR）：（ロゼウス）40mg／4mL／V、10mg／1mL／V

《 投与量 》

| 薬 剤 名  | 標準投与量 |                   | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|--------|-------|-------------------|-------|---------|-----|
| シスプラチン | 80    | mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1   |
| ロゼウス   | 20    | mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1,8 |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |    |                                                                                  |
|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| Day1； |    | 1月1日(土)                                                                          |
| 0時00分 | ①  | 生理食塩液 500mL<br>2 時間で点滴静注                                                         |
| 1時15分 | 内服 | アブレビタントカプセル 125mg 1×(1) シスプラチン開始 1 時間前頃                                          |
| 2時00分 | ②  | 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1A + デキサート 9.9mg<br>15 分で点滴静注                               |
| 2時15分 | ③  | 生理食塩液 50mL + <b>ロゼウス 0mg 0.00mL</b><br>全開 10分以内で点滴静注（終了後、直ちに④を開始）<br>※血管痛、静脈炎に注意 |
| 2時35分 | ④  | 生理食塩液 250mL（ロゼウス終了後直ちに）<br>全開 20分以内で点滴静注                                         |
| 2時45分 | ⑤  | 生理食塩液 <b>700 mL</b> + <b>シスプラチン 0mg 0.00mL</b><br>2 時間で点滴静注                      |
| 4時45分 | ⑥  | 生理食塩液 500mL<br>2 時間で点滴静注                                                         |
| 6時45分 | ⑦  | ソリタ T 3 号 500mL× 3<br>6 時間（2時間×3）で点滴静注                                           |

|         |    |                                       |
|---------|----|---------------------------------------|
| Day2～3； |    | 1月2日(日) ～ 1月3日(月)                     |
| 起床後     | 内服 | アブレビタントカプセル 80mg 1×(2) 起床後            |
| 2時00分   | ①  | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注 |
| 2時15分   | ②  | ソリタ T 3 500mL× 3<br>6 時間（2時間×3）で点滴静注  |

|       |   |                                                                                  |
|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| Day8； |   | 1月8日(土)                                                                          |
| 2時00分 | ① | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注                                            |
| 2時15分 | ② | 生理食塩液 50mL + <b>ロゼウス 0mg 0.00mL</b><br>全開 10分以内で点滴静注（終了後、直ちに③を開始）<br>※血管痛、静脈炎に注意 |
| 2時25分 | ③ | 生理食塩液 250mL（ロゼウス終了後直ちに）<br>全開 20分以内で点滴静注                                         |

REFERENCE

Ikuko Sekine, Hiroshi Nokihara, Minako Sumi, et al：Journal of Thoracic Oncology 1：810-815, 2006  
Docetaxel consolidation therapy following cisplatin, vinorelbine, and concurrent thoracic radiotherapy in patients with unresectable stage III non-small cell lung cancer  
第9回化学療法プロトコール審査委員会承認：2009年8月6日 更新:2016年7月14日

対象： 非小細胞肺癌 （ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発例）

レジメン名： **Crizotinib療法**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1回 250mgを1日2回経口投与する。なお患者の状態により適宜増減する。 |
|-----------|---------------------------------------|

《 注 意 》

ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

適正使用ガイドに準じる

PS:0～2、好中球数>1,500/ $\mu$ L、Plt>30,000/ $\mu$ L、Hb>8.0g/dL、Scr $\leq$ ULN $\times$ 2

※本剤開始前3カ月以内に次のいずれかの疾患の既往がない、または合併していない患者

心筋梗塞、重度/不安定狭心症、冠動脈/末梢動脈のバイパス移植、うっ血性心不全又は一過性虚血発作を含む脳血管障害等

※間質性肺疾患を起こすことがあるので、観察を十分に行うこと。

※肝機能障害を起こすことがあるので、観察を十分に行うこと。

※視覚障害を起こすことがあるので、危険を伴う機械を操作する場合は十分注意すること。

《 使 用 薬 剤 》

クリゾチニブ：ザーコリカプセル200mg、250mg

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名 | 標準投与量       | 計算値 | 投与量(mg) | 投与日 |
|-------|-------------|-----|---------|-----|
| ザーコリ  | 500 mg/body | 500 |         | 連日  |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

|    |          |     |           |
|----|----------|-----|-----------|
| 内服 | ザーコリカプセル | 0mg | 1日2回 経口投与 |
|----|----------|-----|-----------|

---

REFERENCE

Eunice L. Kwak,M.D.,ph.D.,Yung-Jue Bang,M.D.,ph.D.,D.Ross Camidge,M.D.,ph.D., et al; N Engl J Med 2010;363:1693-703

Anaplastic Lymphoma Kinase Inhibition in Non-Small-Cell Lung Cancer

2013年1月度化学療法プロトコール審査委員会承認：2013年1月21日

対象： BRAF遺伝子変異を有する非小細胞肺癌（進行・再発） 1st Line

レジメン名： **Dabrafenib/Trametinib療法**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 通常、成人にはダブラフェニブとして1回150mgを1日2回、空腹時に経口投与する。<br>通常、成人にはトラメチニブとして2mgを1日1回、空腹時に経口投与する。<br>なお、両剤ともに患者の状態により適宜減量する。 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

《 注 意 》

BRAF遺伝子変異を有する非小細胞肺癌

適正使用ガイドに準じる

※ 下記の症状があらわれることがあるので、異常が認められた場合には、適切な処置を行うこと  
心障害、肝機能障害、間質性肺炎、横紋筋融解症、深部静脈血栓症、悪性腫瘍（二次発がん）等

休薬、減量及び中止基準

| タフィンラー・メキニスト共通          |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| NCI-CTCAE Grade判定       | 処置                                                           |
| 認容不能なGrade2<br>又はGrade3 | 休薬<br>Grade1以下まで軽快後、1段階減量して投与を再開                             |
| Grade4                  | 原則投与中止<br>治療継続が患者にとって望ましいと判断された場合には、Grade1まで軽快後、1段階減量して投与を再開 |

※副作用発現時には、原則として、両剤を同時に減量、休薬又は中止すること

用量調節段階の目安

| タフィンラー |                |
|--------|----------------|
| 用量調節段階 | 投与量            |
| 通常投与量  | 1回150mg (1日2回) |
| 1 段階減量 | 1回100mg (1日2回) |
| 2 段階減量 | 1回75mg (1日2回)  |
| 3 段階減量 | 1回50mg (1日2回)  |
| 4 段階減量 | 投与中止           |

| メキニスト  |              |
|--------|--------------|
| 用量調節段階 | 投与量          |
| 通常投与量  | 2mg (1日1回)   |
| 1 段階減量 | 1.5mg (1日1回) |
| 2 段階減量 | 1mg (1日1回)   |
| 3 段階減量 | 投与中止         |

※適切な処置により副作用が管理できた場合には、減量時と逆の段階を経て増量可

《 使 用 薬 剤 》

ダブラフェニブ：タフィンラーカプセル 50mg/75mg

トラメチニブ ：メキニスト錠 0.5mg/2mg

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名  | 標準投与量      | 計算値 | 投与量(mg) | 投与日 |
|--------|------------|-----|---------|-----|
| タフィンラー | 300 mg/day | 300 |         | 連日  |
| メキニスト  | 2 mg/day   | 2   |         | 連日  |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

|    |                  |      |         |
|----|------------------|------|---------|
| 内服 | タフィンラーカプセル 0mg/日 | 1日2回 | 空腹時経口投与 |
| 内服 | メキニスト錠 0mg/日     | 1日1回 | 空腹時経口投与 |

REFERENCE

David Planchard, Benjamin Besse, Harry J M Groen, et al: Lancet Oncol 2016 July ;17(7):984-993

An open-label phase 2 trial of dabrafenib plus trametinib in patients with previously treated BRAF V600E-mutant metastatic non-small cell lung cancer

2018年9月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2018年9月10日

対象： 非小細胞肺癌（進行・再発）2nd Line以降  
レジメン名： **DTX+Ramucirumab療法**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 投与スケジュール： | 1コース 21日間 |
| 使用基準：     | class A   |

《 注 意 》  
適正使用ガイドに準じる。  
※ 高血圧・血栓塞栓症の患者は慎重投与  
※ サイラムザ添付文書及び適性使用ガイドに準じて投与すること。  
※ ショック、アナフィラキシー様症状、Infusion reaction発現に要注意。  
※ 投与前に凝固系(PT-INR,D-ダイマー,等)の検査を実施し、投与中も必要に応じ検査を行うこと。  
※ 発熱性好中球減少出現ないし、一週間好中球<500/mm<sup>3</sup>のときはドセタキセル50mg/m<sup>2</sup>に減量

《 使用薬剤 》  
ラムシルマブ (RAM)：サイラムザ (100mg/10mL、500mg/50mL)  
ドセタキセル (DTX)：ドセタキセル点滴静注（1V：20mg、80mg）

| 薬 剤 名  | 標準投与量                | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|--------|----------------------|-------|---------|-----|
| サイラムザ  | 10 mg/kg             | #REF! |         | 1   |
| ドセタキセル | 60 mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》  
※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

Day1； 1月1日(土)

|       |    |                             |                                                                                    |
|-------|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 0時00分 | 内服 | レスタミンコーワ（10mg）5 T           | 点滴直前に内服                                                                            |
| 0時00分 | ①  | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg 1V | 15 分で点滴静注                                                                          |
| 0時15分 | ②  | 生理食塩液 100mL + グラニセトロン 1A    | 30 分で点滴静注                                                                          |
| 0時45分 | ③  | 生理食塩液 250mL + サイラムザ 0mg     | 0.00mL<br>60 分で点滴静注<br>(60分で忍容性が良好であれば30分に変更可)<br>蛋白質透過型のフィルター(0.2又は0.22ミクロン)を使用する |
| 1時45分 | ④  | 生理食塩液 100mL                 | 1 時間で点滴静注<br>(Infusion reactionの発現がなければ、3コース目以降は省略可)                               |
| 2時45分 | ⑤  | 生理食塩液 250mL + ドセタキセル 0mg    | 0.00mL<br>1 時間で点滴静注<br>注) 点滴開始から10分間は点滴速度を遅めに設定して、全身状態を観察する。                       |
| 3時45分 | ⑥  | 生理食塩液 50mL                  | フラッシュ                                                                              |

REFERENCE  
Edward B Garon,Tudor-Eliade,Ciuleanu,et al:Lancet 2014;384:665-73  
Ramucirumab plus docetaxel versus placebo plus docetaxel for second-line treatment of stage IV non-small-cell lung cancer after disease progression on platinum-based therapy(REVEL):a multicentre,double-blind, randomised phase 3 trial  
プラチナ製剤を含む一次治療後に進行したIV期非小細胞肺癌(non-small cell lung cancer;NSCLC)を対象とするドセタキセル+ラムシルマブ併用とドセタキセル+プラセボ併用の第II相ランダム化二重盲検試験  
2016年8月度化学療法プロトコル委員会承認：2016年8月1日 更新:2016年11月17日

対象： 非小細胞肺癌（進行・再発）2nd Line

## レジメン名： DTX単独療法

コース目

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |              |
|-----------|--------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 21～28日 |
| 使用基準：     | class A      |

### 《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

### 《 使用 薬 剤 》

ドセタキセル（DTX）：ドセタキセル点滴静注（1V：20mg、80mg）

### 《 投 与 量 》

| 薬 剤 名  | 標準投与量                | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|--------|----------------------|-------|---------|-----|
| ドセタキセル | 60 mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1   |

### 《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

Day1； 1月1日(土)

0時00分 ① 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1A + デキサート 13.2mg

15 分で点滴静注

0時15分 ⑤ 生理食塩液 250mL + ドセタキセル 0mg 0.00mL

1 時間で点滴静注

注）点滴開始から10分間は点滴速度を遅めに設定して、全身状態を観察する。

1時15分 ⑥ 生理食塩液 50mL

フラッシュ

### REFERENCE

Frances A. Shepherd, Janet Dancey, Rodryg Ramlau, et al：Prospective randomized trial of docetaxel versus best supportive care in patients with non-small-cell lung cancer previously treated with platinum-based chemotherapy.

J Clin Oncol 18：2095-2103, 2000

第3回化学療法プロトコル審査委員会承認：2008年12月5日 更新:2016年11月17日

対象： 非小細胞肺癌（切除不能な局所進行 III期）根治的化学放射線療法後における維持療法

## レジメン名： Durvalumab維持療法

コース目

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 28日 |
| 目標コース：    | 最長12ヶ月間   |

### 《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アナフィラキシー様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意

※ **体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kg（q4w）とする。**

### 《 使 用 薬 剤 》

デュルバルマブ（Durvalumab）：イミフィンジ 点滴静注 120mg/2.4mL/V、500mg/10mL/V

### 《 投 与 量 》

| 薬 剤 名  | 標準投与量         | 計算値  | 投与量(mg) | 投与日 |
|--------|---------------|------|---------|-----|
| イミフィンジ | 1500* mg/body | 1500 |         | 1   |

### 《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Day1； | 1月1日(土)                                                                              |
| 0時00分 | ① 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                                      |
| 0時05分 | ② 生理食塩液 100mL + イミフィンジ 0mg 0.00mL<br>60 分で点滴静注<br>0.2μm or 0.22μmのフィルター一体型輸液セットを使用する |
| 1時05分 | ③ 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                |

### REFERENCE

S.J.Antonia,A.Villegas,D.Daniel,D.Vicente, et al; N Engl J Med 2017;377:1919-29

Durvalmab after Chemoradiontherapy in StageIII Non-Small-Cell Lung Cancer

2018年8月度化学療法プロトコール審査委員会承認：2018年8月20日 修正：2023年12月11日

対象： ROS1融合遺伝子陽性非小細胞肺癌（切除不能な進行・再発） 1st line以降

レジメン名： Entrectinib療法

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 通常，成人にはエヌトレクチニブとして1日1回600mgを経口投与する。 |
|-----------|-------------------------------------|

《 注 意 》  
ROS1融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌  
※適正使用ガイドに準じる  
※心臓障害があらわれることがあるので，適宜心機能（心電図，心エコー等），CK等の検査を行うこと。  
※認知障害，運動失調があらわれることがあるので，異常が認められた場合には適切な処置を行う事  
※間質性肺疾患を起こすことがあるので，観察を十分に行い，適切な処置を行う事

休薬、減量及び中止の目安（成人患者の場合）

| 副作用             | Grade            | 処置（成人患者の場合）                                                                               |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 心臓障害（QT間隔延長を除く） | 全Grade           | Grade 1 以下又はベースラインに回復するまで休薬し，回復後，1用量レベル減量して投与再開する。                                        |
| QT間隔延長          | Grade 2 の場合      | Grade 1 以下又はベースラインに回復するまで休薬し，回復後，同一用量で投与再開する。                                             |
|                 | Grade 3 の場合      | Grade 1 以下又はベースラインに回復するまで休薬し，回復後，1用量レベル減量して投与再開する。                                        |
|                 | Grade 4 の場合      | 投与中止する。                                                                                   |
| 認知障害，運動失調       | Grade 2 以上の場合    | ・初発の場合，Grade 1 以下又はベースラインに回復するまで休薬し，回復後，1用量レベル減量して投与再開する。<br>・再発した場合，さらに1用量レベル減量又は投与中止する。 |
| 失神              | 全Grade           | ・初発の場合，ベースラインに回復するまで休薬し，回復後，1用量レベル減量して投与再開する。<br>・再発した場合，さらに1用量レベル減量又は投与中止する。             |
| 貧血又は好中球減少       | Grade 3 の場合      | Grade 2 以下又はベースラインに回復するまで休薬し，回復後，1用量レベル減量又は同一用量で投与再開する。                                   |
|                 | Grade 4 の場合      | Grade 2 以下又はベースラインに回復するまで休薬し，回復後，1用量レベル減量して投与再開する。                                        |
| 間質性肺疾患          | Grade 1 又は 2 の場合 | ・初発の場合，ベースラインに回復するまで休薬し，回復後，同一用量で投与再開する。<br>・再発した場合，投与中止する。                               |
|                 | Grade 3 又は 4 の場合 | 投与中止する。                                                                                   |
| その他の非血液学的毒性     | Grade 3 又は 4 の場合 | Grade 1 以下又はベースラインに回復するまで休薬し，回復後，1用量レベル減量して投与再開する。                                        |

※小児患者の場合，添付文書等を参照すること

《 使用薬剤 》  
エヌトレクチニブ：ロズリートレクカプセル 100mg，200mg

| 薬 剤 名   | 標準投与量       | 計算値 | 投与量(mg) | 投与日 |
|---------|-------------|-----|---------|-----|
| ロズリートレク | 600 mg/body | 600 |         | 連日  |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》  

|    |             |     |      |
|----|-------------|-----|------|
| 内服 | ロズリートレクカプセル | 0mg | 1日1回 |
|----|-------------|-----|------|

REFERENCE

Alexander Drilon, Salvatore Siena, Rafal Dziadziuszko, et al:Lancet Oncol 2020;21:261-70

Entrectinib in ROS1 fusion-positive non-small-cell lung cancer:integrated analysis of three phase 1-2 trials

2020年9月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2020年9月14日

対象：EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌（進行・再発）1st line

レジメン名：**Erlotinib+Bevacizumab療法**

コース目

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

投与スケジュール： 1 コース 2 1 日間

《 注 意 》

EGFR遺伝子変異陽性NSCLC（非扁平上皮癌）

適正使用ガイドに準じる。

※ **喀血**（2.5mL以上の鮮血の喀血）の既往のある患者には禁忌。

※ 投与前に凝固系(PT-INR,D-ダイマー,APTT等)の検査を実施し、投与中も必要に応じ検査を行うこと。

※ 原則、埋め込み式ポート挿入後1週間以上、腹部手術前後は6週間以上空けて投与。

※ ショック、アナフィラキシー様症状、Infusion reaction発現に要注意。

※ タルセバ錠は、食事の影響を避けるため食事の1時間前から食後2時間までの間の服用は避けること

※ 間質性肺疾患を起こすことがあるので、観察を十分に行うこと

※ 重度の皮膚障害を起こすことがあるので、観察を十分に行うこと

《 使用薬剤 》

ベバシズマブ（BEV）：ベバシズマブBS（100mg/4mL、400mg/16mL）

エルロチニブ：タルセバ錠25mg、100mg、150mg

《 投与量 》

| 薬 剤 名    | 標準投与量       | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|----------|-------------|-------|---------|-----|
| ベバシズマブBS | 15 mg/kg    | #REF! |         | 1   |
| タルセバ     | 150 mg/body | 150   |         | 連日  |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Day1； | 1月1日(土)                                                                       |
| 0時00分 | ① 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                               |
| 0時05分 | ② 生理食塩液 100mL + ベバシズマブBS 0mg 0.00mL<br>90分で点滴静注<br>(初回は90分、2回目以降は60分・30分に変更可) |
| 1時35分 | ③ 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                         |

連日； 1月1日(土) ～ 1月21日(金)

内服 タルセバ錠 0mg 空腹時（食前1時間、食後2時間は避ける）

REFERENCE

Haruhiro Saito, Tatsuro Fukuhara, Naoki Furuya., et al ;Lancet Oncl 2019;20:625-35

Erlotinib plus bevacizumab versus erlotinib alone in patients with EGFR-positive advanced non-squamous non-small-cell lung cancer(NEJ026):interim analysis of an open-label,randomised,multicentre,phase 3 trial

2020年9月度化学療法プロトコル委員会承認：2020年9月14日

対象： EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌（進行・再発）1st line  
レジメン名： **Erlotinib+Ramucirumab療法**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |             |
|-----------|-------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 1 4 日 |
|-----------|-------------|

《 注 意 》

EGFR遺伝子変異陽性NSCLC

適正使用ガイドに準じる。

- ※ 喀血がある場合は、肺出血が現れる恐れがあるので、投与の可否を十分検討する事
- ※ 投与前に凝固系(PT-INR,D-ダイマー,APTT等)の検査を実施し、投与中にも必要に応じ検査を行うこと。
- ※ 原則、埋め込み式ポート挿入後1週間以上、腹部手術前後は6週間以上空けて投与。
- ※ ショック、アナフィラキシー様症状、Infusion reaction発現に要注意。
- ※ タルセバ錠は、食事の影響を避けるため食事の1時間前から食後2時間までの間の服用は避けること
- ※ 間質性肺疾患を起こすことがあるので、観察を十分に行うこと
- ※ 重度の皮膚障害を起こすことがあるので、観察を十分に行うこと

《 使用 薬 剤 》

ラムシルマブ（RAM）：サイラムザ（100mg/10mL、500mg/50mL）

エルロチニブ：タルセバ錠25mg、100mg、150mg

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名 | 標準投与量       | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|-------|-------------|-------|---------|-----|
| サイラムザ | 10 mg/kg    | #REF! |         | 1   |
| タルセバ  | 150 mg/body | 150   |         | 連日  |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |         |                                                                                                           |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Day1； | 1月1日(土) |                                                                                                           |
| 0時00分 | 内服      | レスタミンコーワ（10mg）5 T 点滴直前に内服                                                                                 |
| 0時00分 | ①       | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg 1V<br>15 分で点滴静注                                                                  |
| 0時15分 | ②       | 生理食塩液 100mL<br>30 分で点滴静注                                                                                  |
| 0時45分 | ③       | 生理食塩液 250mL + サイラムザ 0mg 0.00mL<br>60 分で点滴静注<br>(初回は60分、2回目以降は30分に変更可)<br>蛋白質透過型のフィルター(0.2又は0.22ミクロン)を使用する |
| 1時45分 | ④       | 生理食塩液 100mL<br>1 時間で点滴静注<br>(Infusion reactionの発現がなければ、3コース目以降は省略可)                                       |

|     |         |           |                      |
|-----|---------|-----------|----------------------|
| 連日； | 1月1日(土) | ～         | 1月14日(金)             |
|     | 内服      | タルセバ錠 0mg | 空腹時（食前1時間、食後2時間は避ける） |

REFERENCE

Kazuhiko Nakagawa, Edward B Garon, Takashi Seto, et al:Lancet Oncol 2019;20:1655-69  
Ramucirumab plus erlotinib in patients with untreated, EGFR-mutated,advanced non-small-cell lung cancer(RELAY):a randomised,double-blind,placebo-controlled,phase 3 trial  
2020年12月度化学療法プロトコール委員会承認：2020年12月14日

対象： 非小細胞肺がん（進行・再発） 2nd Line

レジメン名： **Erlotinib療法**

コース目

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

投与スケジュール： 1日150mgを1回投与

#### 《 注 意 》

切除不能な再発・進行性で、がん化学療法施行後に増悪した非小細胞肺がん

適正使用ガイドに準じる。

※ タルセバ錠は、食事の影響を避けるため食事の1時間前から食後2時間までの間の服用は避けること

※ 間質性肺疾患を起こすことがあるので、観察を十分に行うこと

※ 重度の皮膚障害を起こすことがあるので、観察を十分に行うこと

#### 《 使 用 薬 剤 》

エルロチニブ：タルセバ錠25mg、100mg、150mg

#### 《 投 与 量 》

| 薬 剤 名 | 標準投与量       | 計算値 | 投与量(mg) | 投与日 |
|-------|-------------|-----|---------|-----|
| タルセバ  | 150 mg/body | 150 |         | 連日  |

#### 《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

内服

タルセバ錠

0mg

空腹時（食前 1 時間、食後 2 時間は避ける）

#### REFERENCE

Kaoru Kubota, M.D.,Ph.D., Yutaka Nishiwaki, M.D., Tomohide Tamura, M.D., et al: J Thorac Oncol. 2008;3: 1439-1445

Efficacy and Safety of Erlotinib Monotherapy for Japanese Patients with Advanced Non-small Cell Lung Cancer

Frances A. Shepherd,M.S.,Jose Rodrigues Pereira,M.D.,Tudor Ciuleanu,M.D., et al:N ENGL MED 2005;353:123-32

Erlotinib in previously treated Non-small-cell lung cancer

2013年6月度化学療法プロトコール審査委員会承認：2013年6月10日

対象： 非小細胞肺がん（進行・再発） 1st、2nd Line

レジメン名： **Gefitinib療法**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |               |
|-----------|---------------|
| 投与スケジュール： | 1日250mgを1回投与。 |
|-----------|---------------|

《 注 意 》  
EGFR遺伝子変異陽性の手術不能又は再発非小細胞肺がん  
適正使用ガイドに準じる。  
※ 日本人高齢者において無酸症が多いことが報告されているので、食後投与が望ましい  
※ 間質性肺疾患を起こすことがあるので、観察を十分に行うこと

《 使用 薬 剤 》  
ゲフィチニブ：イレッサ錠 2 5 0 m g

|       |             |     |         |     |
|-------|-------------|-----|---------|-----|
| 薬 剤 名 | 標準投与量       | 計算値 | 投与量(mg) | 投与日 |
| イレッサ  | 250 mg/body | 250 |         | 連日  |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》  
※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。  

内服

イレッサ錠 0mg 食後投与が望ましい。

REFERENCE

Makoto Maemondo, M.D.,Ph.D., Akira Inoue, M.D.,Ph.D., Kunihiro Kobayashi, M.D.,Ph.D., et al: N Engl J Med 2010;362:2380-8  
Gefitinib or Chemotherapy for Non-Small-Cell Lung Cancer with Mutated EGFR  
Tetsuya Mitsudomi,Satoshi Morita,Yasushi Yotube et al:Lancet Oncol 2010;11:121-28  
Gefinib versus cisplatin plus docetaxel in patients with non-small-cell lung cancer harbouring mutations of the epidermal growth factor receptor (WJTOG3405):an open label ,randomised phase 3 trial  
2013年6月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2013年6月10日

対象： 非小細胞肺癌（進行・再発）1st Line プラチナ製剤不耐または高齢者

レジメン名： **GEM単独療法**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 28日。 day 1,8,15に点滴。 |
| 使用基準：     | 開始時；class A。以降；class C。   |

《 注 意 》  
適正使用ガイドに準じる。

《 使 用 薬 剤 》  
ゲムシタビン（G E M）：ゲムシタビン点滴静注用（1 V:200mg,1g）

|        |            |       |         |        |
|--------|------------|-------|---------|--------|
| 薬 剤 名  | 標準投与量      | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日    |
| ゲムシタビン | 1000 mg/m2 | #REF! |         | 1,8,15 |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》  
※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|            |         |                                 |          |
|------------|---------|---------------------------------|----------|
| Day1,8,15； | 1月1日(土) | 1月8日(土)                         | 1月15日(土) |
| 0時00分      | ①       | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg        |          |
|            |         | 15 分で点滴静注                       |          |
| 0時15分      | ⑤       | 生理食塩液 100mL + <b>ゲムシタビン 0mg</b> |          |
|            |         | 30 分で点滴静注                       |          |
| 0時45分      | ⑥       | 生理食塩液 50mL                      |          |
|            |         | フラッシュ                           |          |

REFERENCE

H Anderson, P Hopwood, RJ Stephens, et al：British Journal of Cancer (2000) 83(4), 447-453  
Gemcitabine plus best supportive care (BSC) vs BSC in inoperable non-small cell lung cancer a randomized trial  
with quality of life as primary outcome  
第10回プロトコール審査委員会承認：2009年10月28日

対象： 非小細胞肺癌（切除不能な局所進行 IIIA,IIIB期）プラチナ併用化学療法に適応がない71-74歳、又は全ての75歳以上

レジメン名： **Low-dose CBDCA+RT療法**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 4 2 日間（続いてDurvalumab維持療法を行う場合は2 6 日間） |
| 使用基準：     | 開始時；class A、以降；class C                      |

《 注 意 》

- ※ Cre>ULNの場合、適切な処置を考慮すること
- ※ 1日1回2Gy（5回/週） 計60Gy(30回)
- ※ RT施行日のRT施行1時間前に投与する

《 使用 薬 剤 》

カルボプラチン（CBDCA）：（カルボプラチン） 150mg／15mL／V、450mg／45mL／V

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名   | 標準投与量                | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日                  |
|---------|----------------------|-------|---------|----------------------|
| カルボプラチン | 30 mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1-5,8-12,15-19,22-26 |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| Day1； | 1月1日(土)                                         |
| 0時00分 | ① 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注         |
| 0時15分 | ② 生理食塩液 100mL + カルボプラチン 0mg 0.00mL<br>30 分で点滴静注 |
| 0時45分 | ③ 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                           |

|           |          |                       |          |        |
|-----------|----------|-----------------------|----------|--------|
| Day2～5；   | 1月2日(日)  | ～                     | 1月5日(水)  |        |
| Day8～12；  | 1月8日(土)  | ～                     | 1月12日(水) |        |
| Day15～19； | 1月15日(土) | ～                     | 1月19日(水) |        |
| Day22～26； | 1月22日(土) | ～                     | 1月26日(水) |        |
| 0時00分     | ①        | 生理食塩液 50mL            |          |        |
|           |          | 血管確保用で速度適宜に点滴静注       |          |        |
| 0時05分     | ②        | 生理食塩液 100mL + カルボプラチン | 0mg      | 0.00mL |
|           |          | 30 分で点滴静注             |          |        |
| 0時35分     | ③        | 生理食塩液 50mL            |          |        |
|           |          | フラッシュ                 |          |        |

REFERENCE

Shinji Atagi, Masaaki Kawahara, Akira Yokoyama, Hiroaki Okamoto, et al:Lancet Oncol 2012 ;13:671-78  
Thoracic radiotherapy with or wihtout daily low-dose carboplatin in elderly patients with non-small-cell lung cancer:a randomised,controlled,phase3trial by the Japan Clinical Oncology Group(JCOG0301)  
2018年10月度化学療法プロトコール審査委員会承認：2018年10月9日、修正2023年9月11日

対象： 非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）（進行・再発） 1st Line

レジメン名： **Nivo+Ipi+CBDCA+PEM療法**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 4 2 日               |
| 目標コース：    | 1コース施行後、Nivo+Ipiにて維持療法を行う |
| 使用基準：     | class A                   |

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

- ※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)  
重度のInfusion reaction (7/4/1/2/3-様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等) が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。
- ※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意
- ※ 体重30kg未満の患者にはオブジーボの総液量100mLにすること
- ※ 体重38kg未満の患者にはヤーボイの希釈液を調節すること（最終濃度1-4mg/mL）

《 使用薬剤 》

ニボルマブ：オブジーボ（240mg/24mL・120mg/mL・100mg/10mL・20mg/2mL）

イピリムマブ：ヤーボイ（50mg/10mL）

カルボプラチン（CBDCA）：150mg/V、450mg/V

ペメトレキセド（PEM）：100mg/V、500mg/V、800mg/V

《 投 与 量 》

|             |                       |                                          |         |       |
|-------------|-----------------------|------------------------------------------|---------|-------|
| Cre値（mg/dl） |                       | Calvertの計算式：投与量(mg/body)＝目標AUC値×(GFR+25) |         |       |
| 目標AUC       | 5                     | GFRはCrを代用して計算。                           |         |       |
| 薬 剤 名       | 標準投与量                 | 計算値                                      | 投与量(mg) | 投与日   |
| オブジーボ       | 360 mg/body           | 360                                      |         | 1,2,2 |
| ヤーボイ        | 1 mg/kg               | #REF!                                    |         | 1     |
| カルボプラチン     | 5-6 AUC               | #REF!                                    |         | 1,2,2 |
| ペメトレキセド     | 500 mg/m <sup>2</sup> | #REF!                                    |         | 1,2,2 |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|                                    |          |                                                                                                                                   |          |  |
|------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| 初回投与 7 日以上前に（ペメトレキセド最終投与日から22日目まで） |          |                                                                                                                                   |          |  |
|                                    | 筋注       | メチコパール注500μg 2A筋注。以後、約9週毎に1回投与                                                                                                    |          |  |
|                                    | 内服       | バンピタン末1g /日（葉酸 0.5mg/日）毎日内服。                                                                                                      |          |  |
| Day1；                              | 1月1日(土)  |                                                                                                                                   |          |  |
| 0時00分                              | ①        | 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                                                                                     |          |  |
| 0時05分                              | ②        | 生理食塩液 100mL + オブジーボ注 0mg 0.00mL<br>30 分で点滴静注<br><u>0.2 μm or 0.22 μmの7/4/1-体型輸液セットを使用する</u><br><u>※体重30kg未満の患者には総液量100mLにすること</u> |          |  |
| 0時35分                              | ③        | 生理食塩液 100mL<br>30 分で点滴静注                                                                                                          |          |  |
| 1時05分                              | 内服       | アブレヒタントカプセル 125mg 1 × (1) カルボプラチン開始 1 時間前頃                                                                                        |          |  |
| 1時05分                              | ④        | 生理食塩液 30mL + ヤーボイ注 0mg 0.00mL<br>30 分で点滴静注<br><u>0.2 μm or 0.22 μmの7/4/1-体型輸液セットを使用する</u><br><u>※体重38kg未満の場合は適宜生食の量を調節すること</u>    |          |  |
| 1時35分                              | ⑤        | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                                                               |          |  |
| 1時40分                              | ⑥        | 生理食塩液 50mL + バロノセトロン 1V + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注                                                                                |          |  |
| 1時55分                              | ⑦        | 生理食塩液 100mL + ペメトレキセド 0mg 0.00mL<br>10 分で点滴静注                                                                                     |          |  |
| 2時05分                              | ⑧        | 5 %ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン 0mg 0.00mL<br>60 分で点滴静注                                                                                  |          |  |
| 3時05分                              | ⑨        | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                                                               |          |  |
|                                    |          |                                                                                                                                   |          |  |
| Day2～3；                            | 1月2日(日)  | ～                                                                                                                                 | 1月3日(月)  |  |
| 起床後                                | 内服       | アブレヒタントカプセル 80mg 1 × (2) 起床後                                                                                                      |          |  |
|                                    |          |                                                                                                                                   |          |  |
| Day22；                             | 1月22日(土) |                                                                                                                                   |          |  |
| 0時00分                              | ①        | 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                                                                                     |          |  |
| 0時05分                              | 内服       | アブレヒタントカプセル 125mg 1 × (1) カルボプラチン開始 1 時間前頃                                                                                        |          |  |
| 0時05分                              | ②        | 生理食塩液 100mL + オブジーボ注 0mg 0.00mL<br>30 分で点滴静注<br><u>0.2 μm or 0.22 μmの7/4/1-体型輸液セットを使用する</u><br><u>※体重30kg未満の患者には総液量100mLにすること</u> |          |  |
| 0時35分                              | ⑤        | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                                                               |          |  |
| 0時40分                              | ⑥        | 生理食塩液 50mL + バロノセトロン 1V + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注                                                                                |          |  |
| 0時55分                              | ⑦        | 生理食塩液 100mL + ペメトレキセド 0mg 0.00mL<br>10 分で点滴静注                                                                                     |          |  |
| 1時05分                              | ⑧        | 5 %ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン 0mg 0.00mL<br>60 分で点滴静注                                                                                  |          |  |
| 2時05分                              | ⑨        | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                                                               |          |  |
|                                    |          |                                                                                                                                   |          |  |
| Day23～24；                          | 1月23日(日) | ～                                                                                                                                 | 1月24日(月) |  |
| 起床後                                | 内服       | アブレヒタントカプセル 80mg 1 × (2) 起床後                                                                                                      |          |  |

REFERENCE

Nivolumab plus ipilimumab in Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer  
M.D.Hellmann, L.Paz-Ares, R.Bernabe Caro, et al: N Engl J Med 2019;381:2020-31  
2020年12月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2020年12月14日 更新2021年11月8日

対象： 非小細胞肺癌（扁平上皮癌）（進行・再発） 1st Line

レジメン名： **Nivo+Ipi+CBDCA+PTX療法**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |            |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|------------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    | アルコールアレルギー |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |            |

※必ず無しを確認

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 4 2 日                      |
| 目標コース：    | <b>1コース施行後、Nivo+Ipiにて維持療法を行う</b> |
| 使用基準：     | class A                          |

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

- ※ **Infusion reaction** に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)
- 重度のinfusion reaction (7/7/7/7/7-様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等) が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。
- ※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意
- ※ 体重30kg未満の患者にはオプジーボの総流量100mLにすること
- ※ 体重38kg未満の患者にはヤーボイの希釈液を調節すること（最終濃度1-4mg/mL）

《 使 用 薬 剤 》

ニボルマブ：オプジーボ（240mg/24mL・120mg/mL・100mg/10mL・20mg/2mL）  
イピリムマブ：ヤーボイ（50mg/10mL）  
カルボプラチン（CBDCA）：150mg/V、450mg/V  
パクリタキセル（PTX）：30mg/V、100mg/V

《 投 与 量 》

|             |                       |                                              |         |     |      |
|-------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------|-----|------|
| Cre値（mg/dl） |                       | Calvertの計算式：投与量(mg/body) = 目標AUC値 × (GFR+25) |         |     |      |
| 目標AUC       | 6                     | GFRはCcrを代用して計算。                              |         |     |      |
| 薬 剤 名       | 標準投与量                 | 計算値                                          | 投与量(mg) | 投与日 |      |
| オプジーボ       | 360 mg/body           | 360                                          |         |     | 1,22 |
| ヤーボイ        | 1 mg/kg               | #REF!                                        |         |     | 1    |
| カルボプラチン     | 6 AUC                 | #REF!                                        |         |     | 1,22 |
| パクリタキセル     | 200 mg/m <sup>2</sup> | #REF!                                        |         |     | 1,22 |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |         |                                           |                  |  |        |
|-------|---------|-------------------------------------------|------------------|--|--------|
| Day1； | 1月1日(土) |                                           |                  |  |        |
| 0時00分 | ①       | 生理食塩液 50mL                                |                  |  |        |
|       |         | 血管確保用で速度適宜に点滴静注                           |                  |  |        |
| 0時05分 | ②       | 生理食塩液 100mL + オプジーボ注 0mg                  | 0.00mL           |  |        |
|       |         | 30 分で点滴静注                                 |                  |  |        |
|       |         | <u>0.2μm or 0.22μmの7/7/7-体型輸液セットを使用する</u> |                  |  |        |
|       |         | ※体重30kg未満の患者には総流量100mLにすること               |                  |  |        |
| 0時35分 | ③       | 生理食塩液 100mL                               |                  |  |        |
|       |         | 30 分で点滴静注                                 |                  |  |        |
| 1時05分 | ④       | 生理食塩液 30mL + ヤーボイ注 0mg                    | 0.00mL           |  |        |
|       |         | 30 分で点滴静注                                 |                  |  |        |
|       |         | <u>0.2μm or 0.22μmの7/7/7-体型輸液セットを使用する</u> |                  |  |        |
|       |         | ※体重38kg未満の場合は適宜生食の量を調節すること                |                  |  |        |
| 1時35分 | ⑤       | 生理食塩液 50mL                                |                  |  |        |
|       |         | フラッシュ                                     |                  |  |        |
| 1時40分 | 内服      | レスタミンコーワ錠(10mg) 5錠                        | 点滴直前に内服          |  |        |
| 1時40分 | ⑥       | 生理食塩液 50mL + ファモチジン 1A + デキサート 16.5mg     |                  |  |        |
|       |         | 15 分で点滴静注                                 |                  |  |        |
| 1時55分 | ⑦       | 生理食塩液 100mL + グラニセトロン 1A                  |                  |  |        |
|       |         | 30 分で点滴静注                                 |                  |  |        |
| 2時25分 | ⑧       | 生理食塩液 500mL + パクリタキセル 0mg                 | 0.00mL           |  |        |
|       |         | 3 時間で点滴静注                                 |                  |  |        |
|       |         | <u>0.2μm or 0.22μmの7/7/7-体型輸液セットを使用する</u> |                  |  |        |
| 4時25分 | 内服      | アブレヒタントカプセル 125mg 1 × (1)                 | カルボプラチン開始 1 時間前頃 |  |        |
| 5時25分 | ⑨       | 5 %ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン 0mg              |                  |  | 0.00mL |
|       |         | 60 分で点滴静注                                 |                  |  |        |
| 6時25分 | ⑩       | 生理食塩液 50mL                                |                  |  |        |
|       |         | フラッシュ                                     |                  |  |        |

|         |         |                          |         |
|---------|---------|--------------------------|---------|
| Day2～3； | 1月2日(日) | ～                        | 1月3日(月) |
| 起床後     | 内服      | アブレヒタントカプセル 80mg 1 × (2) | 起床後     |

|        |          |                                           |                  |  |        |
|--------|----------|-------------------------------------------|------------------|--|--------|
| Day22； | 1月22日(土) |                                           |                  |  |        |
| 0時00分  | ①        | 生理食塩液 50mL                                |                  |  |        |
|        |          | 血管確保用で速度適宜に点滴静注                           |                  |  |        |
| 0時05分  | ②        | 生理食塩液 100mL + オプジーボ注 0mg                  | 0.00mL           |  |        |
|        |          | 30 分で点滴静注                                 |                  |  |        |
|        |          | <u>0.2μm or 0.22μmの7/7/7-体型輸液セットを使用する</u> |                  |  |        |
|        |          | ※体重30kg未満の患者には総流量100mLにすること               |                  |  |        |
| 0時35分  | ③        | 生理食塩液 50mL                                |                  |  |        |
|        |          | フラッシュ                                     |                  |  |        |
| 0時40分  | 内服       | レスタミンコーワ錠(10mg) 5錠                        | 点滴直前に内服          |  |        |
| 0時40分  | ④        | 生理食塩液 50mL + ファモチジン 1A + デキサート 16.5mg     |                  |  |        |
|        |          | 15 分で点滴静注                                 |                  |  |        |
| 0時55分  | ⑤        | 生理食塩液 100mL + グラニセトロン 1A                  |                  |  |        |
|        |          | 30 分で点滴静注                                 |                  |  |        |
| 1時25分  | ⑥        | 生理食塩液 500mL + パクリタキセル 0mg                 | 0.00mL           |  |        |
|        |          | 3 時間で点滴静注                                 |                  |  |        |
|        |          | <u>0.2μm or 0.22μmの7/7/7-体型輸液セットを使用する</u> |                  |  |        |
| 3時25分  | 内服       | アブレヒタントカプセル 125mg 1 × (1)                 | カルボプラチン開始 1 時間前頃 |  |        |
| 4時25分  | ⑦        | 5 %ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン 0mg              |                  |  | 0.00mL |
|        |          | 60 分で点滴静注                                 |                  |  |        |
| 5時25分  | ⑧        | 生理食塩液 50mL                                |                  |  |        |
|        |          | フラッシュ                                     |                  |  |        |

|           |          |                          |          |
|-----------|----------|--------------------------|----------|
| Day23～24； | 1月23日(日) | ～                        | 1月24日(月) |
| 起床後       | 内服       | アブレヒタントカプセル 80mg 1 × (2) | 起床後      |

REFERENCE

Nivolumab plus Ipilimumab in Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer  
M.D.Hellmann, L.Paz-Ares, R.Bernabe Caro, et al: N Engl J Med 2019;381:2020-31  
2020年12月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2020年12月14日



対象： 非小細胞肺癌（進行・再発） 1st Line  
レジメン名： **Nivo+Ipi維持療法**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |             |
|-----------|-------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 4 2 日 |
|-----------|-------------|

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

**Nivo+Ipi+Chemo療法 1コース施行後のメンテナンスとして使用すること。**

※ **Infusion reaction** に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction (アライキ様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等) が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用 (間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等) に注意

※ 体重30kg未満の患者にはオプジーボの総液量100mLにすること

※ 体重38kg未満の患者にはヤーボイの希釈液を調節すること (最終濃度1-4mg/mL)

《 使 用 薬 剤 》

ニボルマブ：オプジーボ (240mg/24mL・120mg/mL・100mg/10mL・20mg/2mL)

イピリムマブ：ヤーボイ (50mg/10mL)

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名 | 標準投与量       | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日  |
|-------|-------------|-------|---------|------|
| オプジーボ | 360 mg/body | 360   |         | 1,22 |
| ヤーボイ  | 1 mg/kg     | #REF! |         | 1    |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Day1； | 1月1日(土)                                                                                                              |
| 0時00分 | ① 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                                                                      |
| 0時05分 | ② 生理食塩液 100mL + オプジーボ注 0mg 0.00mL<br>30 分で点滴静注<br>0.2 μm or 0.22 μmのフィルター体型輸液セットを使用する<br>※体重30kg未満の患者には総液量100mLにすること |
| 0時35分 | ③ 生理食塩液 100mL<br>30 分で点滴静注                                                                                           |
| 1時05分 | ④ 生理食塩液 30mL + ヤーボイ注 0mg 0.00mL<br>30 分で点滴静注<br>0.2 μm or 0.22 μmのフィルター体型輸液セットを使用する<br>※体重38kg未満の場合は適宜生食の量を調節すること    |
| 1時35分 | ⑤ 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                                                |

|        |                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Day22； | 1月22日(土)                                                                                                             |
| 0時00分  | ① 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                                                                      |
| 0時05分  | ② 生理食塩液 100mL + オプジーボ注 0mg 0.00mL<br>30 分で点滴静注<br>0.2 μm or 0.22 μmのフィルター体型輸液セットを使用する<br>※体重30kg未満の患者には総液量100mLにすること |
| 0時35分  | ③ 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                                                |

REFERENCE

Nivolumab plus Ipilimumab in Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer  
M.D.Hellmann, L.Paz-Ares, R.Bernabe Caro, et al: N Engl J Med 2019;381:2020-31  
2020年12月度化学療法プロトコール審査委員会承認：2020年12月14日

対象： 非小細胞肺癌（進行・再発）1st Line  
レジメン名： **Nivolumab(2w)+Ipilimumab療法**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |             |
|-----------|-------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 4 2 日 |
|-----------|-------------|

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アライキ様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意

※ **体重30kg未満の患者にはオプジーボの総液量100mLにすること**

※ **体重38kg未満の患者にはヤーボイの希釈液を調節すること（最終濃度1-4mg/mL）**

《 使 用 薬 剤 》

ニボルマブ：オプジーボ（240mg/24mL・120mg/mL・100mg/10mL・20mg/2mL）

イピリムマブ：ヤーボイ（50mg/10mL）

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名 | 標準投与量       | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日     |
|-------|-------------|-------|---------|---------|
| オプジーボ | 240 mg/body | 240   |         | 1.15.29 |
| ヤーボイ  | 1 mg/kg     | #REF! |         | 1       |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Day1； | 1月1日(土)                                                                                                            |
| 0時00分 | ① 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                                                                    |
| 0時05分 | ② 生理食塩液 100mL + オプジーボ注 0mg 0.00mL<br>30 分で点滴静注<br>0.2μm or 0.22μmのフィルター体型輸液セットを使用する<br>※体重30kg未満の患者には総液量100mLにすること |
| 0時35分 | ③ 生理食塩液 100mL<br>30 分で点滴静注                                                                                         |
| 1時05分 | ④ 生理食塩液 30mL + ヤーボイ注 0mg 0.00mL<br>30 分で点滴静注<br>0.2μm or 0.22μmのフィルター体型輸液セットを使用する<br>※体重38kg未満の場合は適宜生食の量を調節すること    |
| 1時35分 | ⑤ 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                                              |

|           |                                                                                                                    |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Day15,29； | 1月15日(土)                                                                                                           | 1月29日(土) |
| 0時00分     | ① 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                                                                    |          |
| 0時05分     | ② 生理食塩液 100mL + オプジーボ注 0mg 0.00mL<br>30 分で点滴静注<br>0.2μm or 0.22μmのフィルター体型輸液セットを使用する<br>※体重30kg未満の患者には総液量100mLにすること |          |
| 0時35分     | ③ 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                                              |          |

REFERENCE

Nivolumab plus Ipilimumab in Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer  
M.D.Hellmann, L.Paz-Ares, R.Bernabe Caro, et al: N Engl J Med 2019;381:2020-31  
2020年12月度化学療法プロトコール審査委員会承認：2020年12月14日

対象： 非小細胞肺癌（進行・再発）1st Line

レジメン名： **Nivolumab(3w)+Ipilimumab療法**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |             |
|-----------|-------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 4 2 日 |
|-----------|-------------|

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

- ※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)  
重度のInfusion reaction（アフィネシ-様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。
- ※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意
- ※ **体重30kg未満の患者にはオプジーボの総液量100mLにすること**
- ※ **体重38kg未満の患者にはヤーボイの希釈液を調節すること（最終濃度1-4mg/mL）**

《 使 用 薬 剤 》

ニボルマブ：オプジーボ（240mg/24mL・120mg/mL・100mg/10mL・20mg/2mL）  
イピリムマブ：ヤーボイ（50mg/10mL）

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名 | 標準投与量       | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日  |
|-------|-------------|-------|---------|------|
| オプジーボ | 360 mg/body | 360   |         | 1.22 |
| ヤーボイ  | 1 mg/kg     | #REF! |         | 1    |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

Day1； 1月1日(土)

|       |   |                                                                                                                   |
|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0時00分 | ① | 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                                                                     |
| 0時05分 | ② | 生理食塩液 100mL + オプジーボ注 0mg 0.00mL<br>30 分で点滴静注<br>0.2μm or 0.22μmのフィルター-体型輸液セットを使用する<br>※体重30kg未満の患者には総液量100mLにすること |
| 0時35分 | ③ | 生理食塩液 100mL<br>30 分で点滴静注                                                                                          |
| 1時05分 | ④ | 生理食塩液 30mL + ヤーボイ注 0mg 0.00mL<br>30 分で点滴静注<br>0.2μm or 0.22μmのフィルター-体型輸液セットを使用する<br>※体重38kg未満の場合は適宜生食の量を調節すること    |
| 1時35分 | ⑤ | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                                               |

Day22； 1月22日(土)

|       |   |                                                                                                                   |
|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0時00分 | ① | 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                                                                     |
| 0時05分 | ② | 生理食塩液 100mL + オプジーボ注 0mg 0.00mL<br>30 分で点滴静注<br>0.2μm or 0.22μmのフィルター-体型輸液セットを使用する<br>※体重30kg未満の患者には総液量100mLにすること |
| 0時35分 | ③ | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                                               |

REFERENCE

Nivolumab plus Ipilimumab in Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer  
M.D.Hellmann, L.Paz-Ares, R.Bernabe Caro, et al: N Engl J Med 2019;381:2020-31  
2020年12月度化学療法プロトコール審査委員会承認：2020年12月14日

対象： 非小細胞肺癌（進行・再発）2nd Line以降

## レジメン名： Nivolumab療法

コース目

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

投与スケジュール： 1 コース 14日。

### 《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アフィキシン様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意

※ **体重30kg未満の患者にはオプジーボの総液量100mLにすること**

### 《 使用 薬 剤 》

ニボルマブ：オプジーボ（240mg/24mL・120mg/mL・100mg/10mL・20mg/2mL）

### 《 投 与 量 》

| 薬 剤 名 | 標準投与量       | 計算値 | 投与量(mg) | 投与日 |
|-------|-------------|-----|---------|-----|
| オプジーボ | 240 mg/body | 240 |         | 1   |

### 《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

Day1； 1月1日(土)

0時00分 ① 生理食塩液 50mL

血管確保用で速度適宜に点滴静注

0時05分 ② 生理食塩液 100mL + オプジーボ注 0mg 0.00mL

30 分で点滴静注

0.2 μm or 0.22 μmのフィルター一体型輸液セットを使用する

※体重30kg未満の患者には総液量100mLにすること

0時35分 ③ 生理食塩液 50mL

フラッシュ

### REFERENCE

H. Borghaei, L. Paz-Ares, L. Horn, et al; N Engl J Med 2015;373:1627-39

Nivolumab versus Docetaxel in Advanced Nonsquamous Non-Small-Cell Lung Cancer

Julie Brahmer, M.D., Karen L. Reckamp, M.D., Paul Baas, M.D., et al; N Engl J Med 2015;373:123-35

Nivolumab versus Docetaxel in Advanced Squamous-Cell Non-Small-Cell Lung Cancer

2015年12月度化学療法プロトコール審査委員会承認：2015年12月14日 更新:2018年9月10日

対象： 非小細胞肺癌 扁平上皮癌（進行・再発） 1st Line

レジメン名： **Pembrolizumab+CBDCA+nab-PTX療法**

|       |       |
|-------|-------|
|       | コース目  |
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1コース 2日間                           |
| 目標コース：    | <b>4コース施行後、Pembrolizumab単独にて投与</b> |
| 使用基準：     | class A (day8.15はclass C)          |

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

**開始時に血液製剤同意書を確認すること**

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction (アライアンス様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等) が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用 (間質性肺炎疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等) に注意

《 使用薬剤 》

ペムブロリズマブ：(キイトルーダ) 100mg/V

カルボプラチン：(カルボプラチン) 150mg/V、450mg/V

パクリタキセル：(アブラキサン) 100mg/V

《 投 与 量 》

|              |                       |                                          |         |        |  |
|--------------|-----------------------|------------------------------------------|---------|--------|--|
| Cre値 (mg/dl) |                       | Calvertの計算式：投与量(mg/body)=目標AUC値×(GFR+25) |         |        |  |
| 目標AUC        | 6                     | GFRはCcrを代用して計算。                          |         |        |  |
| 薬 剤 名        | 標準投与量                 | 計算値                                      | 投与量(mg) | 投与日    |  |
| キイトルーダ       | 200 mg/body           | 200                                      |         | 1      |  |
| カルボプラチン      | 6 AUC                 | #REF!                                    |         | 1      |  |
| アブラキサン       | 100 mg/m <sup>2</sup> | #REF!                                    |         | 1,8,15 |  |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|                                              |         |                                         |                 |           |  |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|--|
| Day1；                                        | 1月1日(土) | ※エクステンションチューブを付け、フィルター有ルートで投与すること       |                 |           |  |
| ※CVポートより投与の場合はコアレスニードルセットにセイフTポートを接続して投与開始   |         |                                         |                 |           |  |
| 0時00分                                        | ①       | 生理食塩液 50mL                              | 血管確保用で速度適宜に点滴静注 |           |  |
| 0時05分                                        | ②       | 生理食塩液 100mL + キイトルーダ 0mg                | 0.00mL          | 30 分で点滴静注 |  |
|                                              |         | 0.2μm or 0.22μmの7フレ―体型輸液セットを使用する        |                 |           |  |
| 0時35分                                        | ③       | 生理食塩液 50mL                              | フラッシュ           |           |  |
| ※④をフィルター無ルートでブライミングし、エクステンションチューブの側管から投与すること |         |                                         |                 |           |  |
| 0時40分                                        | 内服      | アプレビタントカプセル 125mg 1×(1) カルボプラチン開始 1時間前頃 |                 |           |  |
| 0時40分                                        | ④       | 生理食塩液 50mL + パロノセトロン 1V + デキサート 6.6mg   | 15 分で点滴静注       |           |  |
| 0時55分                                        | ⑤       | 生理食塩液 100mL + アブラキサン 0mg                | 0.0mL           | 30 分で点滴静注 |  |
|                                              |         | 調整法に従い溶解。 の懸濁液を生理食塩液容器に戻す。              |                 |           |  |
|                                              |         | ※フィルターなしルートで投与                          |                 |           |  |
| 1時25分                                        | ⑥       | 生理食塩液 50mL                              | 15 分で点滴静注       |           |  |
| 1時40分                                        | ⑦       | 5%ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン 0mg             | 0.00mL          | 60 分で点滴静注 |  |
| 2時40分                                        | ⑧       | 生理食塩液 50mL                              | フラッシュ           |           |  |
|                                              |         |                                         |                 |           |  |
| Day2～3；                                      | 1月2日(日) | ～                                       | 1月3日(月)         |           |  |
| 起床後                                          | 内服      | アプレビタントカプセル 80mg 1×(2) 起床後              |                 |           |  |
|                                              |         |                                         |                 |           |  |
| Day8,15；                                     | 1月8日(土) | 1月15日(土)                                |                 |           |  |
| 0時40分                                        | ①       | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg                | 15 分で点滴静注       |           |  |
| 0時55分                                        | ②       | 生理食塩液 100mL + アブラキサン 0mg                | 0.0mL           | 30 分で点滴静注 |  |
|                                              |         | 調整法に従い溶解。 の懸濁液を生理食塩液容器に戻す。              |                 |           |  |
|                                              |         | ※フィルターなしルートで投与                          |                 |           |  |
| 1時25分                                        | ③       | 生理食塩液 50mL                              | 15 分で点滴静注       |           |  |

REFERENCE

L. Paz-Ares, A. Luft, D. Vicente, A. Tafreshi, et al：N Engl J Med 2018;379:2040-51  
Pembrolizumab plus Chemotherapy for Squamous Non-Small-Cell Lung Cancer  
2019年1月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2019年1月21日

対象： 非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）（進行・再発） 1st Line  
レジメン名： **Pembrolizumab+CBDCA+PEM療法**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間                               |
| 目標コース：    | <b>4 コース施行後、Pembrolizumab+Pemetrexed投与</b> |
| 使用基準：     | class A （扁平上皮癌への使用は避けること。）                 |

#### 《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アフィネシ-様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意

#### 《 使用薬剤 》

ペムプロリズマブ：（キイトルーダ） 100mg/V

カルボプラチン（CBDCA）：（カルボプラチン） 150mg/V、450mg/V

ペメトレキセド（PEM）：（ペメトレキセド） 100mg・500mg・800mg/V

#### 《 投 与 量 》

|              |       |                                           |       |         |     |
|--------------|-------|-------------------------------------------|-------|---------|-----|
| Cre値 (mg/dl) |       | Calvertの計算式：投与量(mg/body)= 目標AUC値×(GFR+25) |       |         |     |
| 目標AUC        | 5     | GFRはCcrを代用して計算。                           |       |         |     |
| 薬 剤 名        | 標準投与量 |                                           | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
| キイトルーダ       | 200   | mg/body                                   | 200   |         | 1   |
| カルボプラチン      | 5     | AUC                                       | #REF! |         | 1   |
| ペメトレキセド      | 500   | mg/m <sup>2</sup>                         | #REF! |         | 1   |

#### 《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|              |         |                                                                                    |  |  |  |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 初回投与 7 日以上前に |         |                                                                                    |  |  |  |
| 筋注           |         | メチコパール注500μg 2 A 筋注。以後、3クール（9週間）毎に1回投与。                                            |  |  |  |
| 内服           |         | バンピタン末1g/日（葉酸 0.5mg/日）毎日内服。                                                        |  |  |  |
| Day1；        | 1月1日(土) |                                                                                    |  |  |  |
| 0時00分        | ①       | 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                                      |  |  |  |
| 0時05分        | 内服      | アプレビタントカプセル 125mg 1×(1) カルボプラチン開始 1 時間前頃                                           |  |  |  |
| 0時05分        | ②       | 生理食塩液 100mL + キイトルーダ 0mg 0.00mL<br>30 分で点滴静注<br>0.2μm or 0.22μmのフィルター一体型輸液セットを使用する |  |  |  |
| 0時35分        | ③       | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                |  |  |  |
| 0時40分        | ④       | 生理食塩液 50mL + パロノセトロン 1V + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注                                 |  |  |  |
| 0時55分        | ⑤       | 生理食塩液 100mL + ペメトレキセド 0mg 0.00mL<br>10 分で点滴静注                                      |  |  |  |
| 1時05分        | ⑥       | 5 %ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン 0mg 0.00mL<br>60 分で点滴静注                                   |  |  |  |
| 2時05分        | ⑦       | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                |  |  |  |

|         |         |                            |         |
|---------|---------|----------------------------|---------|
| Day2～3； | 1月2日(日) | ～                          | 1月3日(月) |
| 起床後     | 内服      | アプレビタントカプセル 80mg 1×(2) 起床後 |         |

#### REFERENCE

L.Gandhi,D.Rodriguez-Abreu,S.Gadgeel,E.et al：N Engl J Med 2018;378:2078-92  
Pembrolizumab plus Chemotherapy in Metastatic Non-Small-cell Lung Cancer  
2019年1月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2019年1月21日 更新2021年11月8日

対象： 非小細胞肺癌（扁平上皮癌）（進行・再発） 1st Line  
レジメン名： **Pembrolizumab+CBDCA+PTX療法**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |            |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|------------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    | アルコールアレルギー |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |            |

※必ず無しを確認

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間                 |
| 目標コース：    | 4 コース施行後、Pembrolizumab単独にて投与 |
| 使用基準：     | class A                      |

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アフィキシ様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用（間質性肺炎、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意

《 使 用 薬 剤 》

ペムブロリズマブ：（キイトルーダ） 100mg/V

カルボプラチン（CBDCA）：（カルボプラチン） 150mg/V、450mg/V

パクリタキセル：（パクリタキセル） 100mg /V

《 投 与 量 》

|              |       |                                              |       |         |     |
|--------------|-------|----------------------------------------------|-------|---------|-----|
| Cre値 (mg/dl) |       | Calvertの計算式：投与量(mg/body) = 目標AUC値 × (GFR+25) |       |         |     |
| 目標AUC        | 6     | GFRはCcrを代用して計算。                              |       |         |     |
| 薬 剤 名        | 標準投与量 |                                              | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
| キイトルーダ       | 200   | mg/body                                      | 200   |         | 1   |
| カルボプラチン      | 6     | AUC                                          | #REF! |         | 1   |
| パクリタキセル      | 200   | mg/m <sup>2</sup>                            | #REF! |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Day1； | 1月1日(土)                                                                             |
| 0時00分 | ① 生理食塩液 50mL<br>血管確保で速度適宜に点滴静注                                                      |
| 0時05分 | ② 生理食塩液 100mL + キイトルーダ 0mg 0.00mL<br>30 分で点滴静注<br>0.2μm or 0.22μmのフィルター型輸液セットを使用する  |
| 0時35分 | ③ 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                               |
| 0時40分 | 内服 レスタミンコーワ錠(10mg) 5錠 点滴直前に内服                                                       |
| 0時40分 | ④ 生理食塩液 50mL + ファモチジン 1A + デキサート 16.5mg<br>15 分で点滴静注                                |
| 0時55分 | ⑤ 生理食塩液 100mL + パロノセトロン 1A<br>30 分で点滴静注                                             |
| 1時25分 | ⑥ 生理食塩液 500mL + パクリタキセル 0mg 0.00mL<br>3 時間で点滴静注<br>0.2μm or 0.22μmのフィルター型輸液セットを使用する |
| 4時25分 | ⑦ 5 %ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン 0mg 0.00mL<br>60 分で点滴静注                                  |
| 5時25分 | ⑧ 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                               |

REFERENCE

L. Paz-Ares, A. Luft, D. Vicente, A. Tafreshi, et al：N Engl J Med 2018;379:2040-51  
Pembrolizumab plus Chemotherapy for Squamous Non-Small-Cell Lung Cancer  
2021年12月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2021年12月13日

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間                        |
| 目標コース：    | 4 コース施行後、Pembrolizumab+Pemetrexed投与 |
| 使用基準：     | class A （扁平上皮癌への使用は避けること。）          |

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アナフィラキシー様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意

指示 1： 体重測定 毎日起床時

注意： Day4以降も水分摂取が少ない場合や尿量が少ない場合には、輸液を考慮すること

《 使用 薬 剤 》

ペムプロリズマブ：（キイトルーダ） 100mg/ V

ペメトレキセド：（ペメトレキセド） 100mg・500mg・800mg/ V

シスプラチン：（C D D P）：シスプラチン注（50mg/100mL/V、10mg/20mL/V）

| 薬 剤 名   | 標準投与量                 | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|---------|-----------------------|-------|---------|-----|
| キイトルーダ  | 200 mg/body           | 200   |         | 1   |
| ペメトレキセド | 500 mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1   |
| シスプラチン  | 75 mg/m <sup>2</sup>  | #REF! |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

初回投与 7 日以上前に

筋注

メチコパール注500μg 2 A 筋注。以後、3クール（9週間）毎に1回投与。

内服

バンビタン末1g/日（葉酸 0.5mg/日）毎日内服。

Day1；

1月1日(土)

0時00分

①

生理食塩液 50mL

血管確保用で速度適宜に点滴静注

0時05分

②

生理食塩液 100mL + キイトルーダ 0mg 0.00mL

30 分で点滴静注

0.2μm or 0.22μmのフィルター型輸液セットを使用する

0時35分

③

生理食塩液 50mL

フラッシュ

0時40分

④

生理食塩液 500mL + 硫酸Mg補正液 8mL

1 時間で点滴静注

1時40分

⑤

ソリタ T 3 号 500mL

1 時間で点滴静注

2時35分

内服

アブレタントカプセル 125mg 1 × (1) シスプラチン開始 1 時間前頃

2時40分

⑥

生理食塩液 50mL + パロノセトロン 1V + デキサート 9.9mg

15 分で点滴静注

2時55分

⑦

生理食塩液 100mL + ペメトレキセド 0mg 0.00mL

10 分で点滴静注

3時05分

⑧

マンニトール 300mL

30 分で点滴静注

3時35分

⑨

生理食塩液 700 mL + シスプラチン 0mg 0.00mL

90 分で点滴静注

5時05分

⑩

生理食塩液 500mL

1 時間で点滴静注

6時05分

⑪

ソリタ T 3 号 500mL

1 時間で点滴静注

Day2～3；

1月2日(日)

～

1月3日(月)

起床後

内服

アブレタントカプセル 80mg 1 × (2) 起床後

2時35分

①

生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg

15 分で点滴静注

2時50分

③

ソリタ T 3 号 500mL × 3

4.5 時間 (1.5時間 × 3) で点滴静注

対象： 非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）（進行・再発） 1st Line  
レジメン名： **Pembrolizumab+PEM療法(メンテナンス)**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間               |
| 使用基準：     | class A （扁平上皮癌への使用は避けること。） |

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

**Pembrolizumab／CDDP／PEM療法又は、Pembrolizumab／CBDCA／PEM療法後のメンテナンスとして使用すること**

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アフィキシン様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意

《 使用 薬 剤 》

ペムプロリズマブ：（キイトルーダ） 100mg／V

ペメトレキシド（PEM）：（ペメトレキシド） 100mg・500mg・800mg／V

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名   | 標準投与量                 | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|---------|-----------------------|-------|---------|-----|
| キイトルーダ  | 200 mg/body           | 200   |         | 1   |
| ペメトレキシド | 500 mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|              |           |                                                                                                              |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 初回投与 7 日以上前に |           |                                                                                                              |
|              | <b>筋注</b> | メチコパール注500 μ g 2 A 筋注。以後、3 クール（9 週間）毎に 1 回投与。                                                                |
|              | <b>内服</b> | パンピタン末1 g / 日（葉酸 0.5mg/日）毎日内服。                                                                               |
| Day1；        | 1月1日(土)   |                                                                                                              |
| 0時00分        | ①         | 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                                                                |
| 0時05分        | ②         | 生理食塩液 100mL + キイトルーダ <b>0mg</b> <b>0.00mL</b><br>30 分で点滴静注<br><u>0.2 μ m or 0.22 μ m のフィルター一体型輸液セットを使用する</u> |
| 0時35分        | ③         | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                                          |
| 0時40分        | ④         | 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1A + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注                                                           |
| 0時55分        | ⑤         | 生理食塩液 100mL + ペメトレキシド <b>0mg</b> <b>0.00mL</b><br>10 分で点滴静注                                                  |
| 1時05分        | ⑦         | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                                          |

REFERENCE

L.Gandhi,D.Rodriguez-Abreu,S.Gadgeel,E.et al：N Engl J Med 2018;378:2078-92  
Pembrolizumab plus Chemotherapy in Metastatic Non-Small-cell Lung Cancer  
2019年1月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2019年1月21日 更新2021年11月8日

対象： 非小細胞肺癌（進行・再発） 1st Line以降

レジメン名： **Pembrolizumab療法**

コース目

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

投与スケジュール： 1 コース 2 1 日間

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

※ TPS≧1%の患者を対象とすること。

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アフィキシ-様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意

《 使 用 薬 剤 》

ペムブロリズマブ：（キイトルーダ） 100mg／V

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名  | 標準投与量       | 計算値 | 投与量(mg) | 投与日 |
|--------|-------------|-----|---------|-----|
| キイトルーダ | 200 mg/body | 200 |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Day1； | 1月1日(土)                                                                                     |
| 0時00分 | ① 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                                             |
| 0時05分 | ② 生理食塩液 100mL + キイトルーダ 0mg 0.00mL<br>30 分で点滴静注<br><u>0.2μm or 0.22μmのフィルター一体型輸液セットを使用する</u> |
| 0時35分 | ③ 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                       |

REFERENCE

Martin Reck, M.D., Ph.D., Delvys Rodriguez-Abreu, M.D.,Andrew G.Robinson, M.D., et al; N Engl J Med 2016;375:1823-33  
Pembrolizumab versus Chemotherapy for PD-L1-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer

Roy S Herbst,Paul Baas,Dong-Wan Kim, et al; Lancet 2016;387:1540-50

Pembrolizumab versus Docetaxel for Previously treated, PD-L1-positive, advanced non-small-cell lung cancer  
2017年3月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2017年3月13日

対象： 非小細胞肺癌（進行・再発） 1st Line以降

## レジメン名： Pembrolizumab療法(6w)

コース目

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

投与スケジュール： 1 コース 42日間

### 《 注 意 》

※ 通常、2～3ヵ月は3週間の投与間隔のレジメンにて治療開始し、その間、継続に問題となるような重大な副作用の発現がないこと、PDでないことを確認した後に、6週間の投与間隔のレジメンに切り替えることが望ましい適正使用ガイドに準じる。

※ TPS $\geq$ 1%の患者を対象とすること。

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アナフィラキシー様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意

### 《 使用 薬 剤 》

ペムブロリズマブ：（キイトルーダ）100mg/V

### 《 投 与 量 》

| 薬 剤 名  | 標準投与量       | 計算値 | 投与量(mg) | 投与日 |
|--------|-------------|-----|---------|-----|
| キイトルーダ | 400 mg/body | 400 |         | 1   |

### 《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Day1； | 1月1日(土)                                                                                                                   |
| 0時00分 | ① 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                                                                           |
| 0時05分 | ② 生理食塩液 100mL + キイトルーダ 0mg 0.00mL<br>30 分で点滴静注<br><u>0.2<math>\mu</math>m or 0.22<math>\mu</math>mのフィルター一体型輸液セットを使用する</u> |
| 0時35分 | ③ 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                                                     |

### REFERENCE

Martin Reck, M.D., Ph.D., Delvys Rodriguez-Abreu, M.D., Andrew G. Robinson, M.D., et al; N Engl J Med 2016;375:1823-33  
Pembrolizumab versus Chemotherapy for PD-L1-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer  
Roy S Herbst, Paul Baas, Dong-Wan Kim, et al; Lancet 2016;387:1540-50  
Pembrolizumab versus Docetaxel for Previously treated, PD-L1-positive, advanced non-small-cell lung cancer  
2017年3月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2017年3月13日、2020年12月14日更新。

対象： 非小細胞肺癌（進行・再発） 2nd Line

レジメン名： **PEM単独療法**

コース目

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間               |
| 使用基準：     | class A （扁平上皮癌への使用は避けること。） |

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

《 使用 薬 剤 》

ペメトレキシド（PEM）：（ペメトレキシド） 100mg・500mg・800mg／V

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名   | 標準投与量                 | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|---------|-----------------------|-------|---------|-----|
| ペメトレキシド | 500 mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

初回投与 **7 日以上前**に

**筋注** メチコパール注500μ g 2 A 筋注。以後、3クール（9週間）毎に1回投与。

**内服** パンビタン末1 g /日（葉酸 0.5mg/日）毎日内服。

Day1； 1月1日(土)

0時00分 ① 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1A + デキサート 6.6mg

15 分で点滴静注

0時15分 ② 生理食塩液 100mL + ペメトレキシド **0mg** **0.00mL**

10 分で点滴静注

0時25分 ③ 生理食塩液 50mL

フラッシュ

REFERENCE

Nasser Hanna, Frances A. Shepherd, Frank V. Fossella, et al: J Clin Oncol 22 : 1589-1597, 2004

Randomized phase III trial of pemetrexed versus docetaxel in patients non-small-cell-lung cancer previously treated with chemotherapy.

第9回化学療法プロトコル審査委員会承認:2009年8月6日 更新:2019年2月18日、2021年11月8日

対象： MET遺伝子エクソン14スキッピング変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

## レジメン名： Tepotinib療法

コース目

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

投与スケジュール： 1回 500mgを1日1回食後に経口投与する。

### 《 注 意 》

MET遺伝子エクソン14スキッピング変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

※適正使用ガイドに準じる

※間質性肺疾患を起こすことがあるので、観察を十分に行うこと。

※体液貯留を起こすことがあるので、適切な処置を行うこと。

※肝機能障害を起こすことがあるので、観察を十分に行うこと。

※腎機能障害を起こすことがあるので、観察を十分に行うこと。

休薬、減量及び中止の目安

| 副作用     | Grade     | 処置（成人患者の場合）                                                                 |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 間質性肺炎   | Grade 1以上 | 投与中止                                                                        |
| 間質性肺炎以外 | Grade 3   | 1段階減量（250mg/回 1日1回）して投与する、又は休薬し、Grade 2以下に回復した後再開する。但し、休薬が21日を超える場合は中止すること。 |
|         | Grade 4   | 休薬し、Grade 2以下に回復した後再開する。但し、休薬が21日を超える場合は中止すること。                             |

### 《 使用薬剤 》

テポチニブ：テプミトコ錠250mg

### 《 投与量 》

| 薬剤名   | 標準投与量       | 計算値 | 投与量(mg) | 投与日 |
|-------|-------------|-----|---------|-----|
| テプミトコ | 500 mg/body | 500 |         | 連日  |

### 《 タイムスケジュール：開始時刻 》

内服

テプミトコ錠 0mg

1日1回 食後

### REFERENCE

P.K.Paik, E.Felip, R.Veillon, et al; NEJM.2020 May 29.

Tepotinib in Non-Small-Cell Lung Cancer with MET Exon 14 Skipping Mutations

2020年8月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2020年8月17日

対象： 非小細胞肺癌（進行・再発）1st Line プラチナ製剤不耐または高齢者

レジメン名： **VNR単独療法**

コース目

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 21日。 day 1、8 に点滴。 |
| 使用基準：     | class C                 |

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

《 使 用 薬 剤 》

ビノレルビン（VNR）：（ロゼウス） 10mg/1mL/V、40mg/4mL/V

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名 | 標準投与量                | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|-------|----------------------|-------|---------|-----|
| ロゼウス  | 25 mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1,8 |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

Day1,8； 1月1日(土) 1月8日(土)

|       |   |                                                                                  |
|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| 0時00分 | ① | 生理食塩液 50mL<br>15 分で点滴静注                                                          |
| 0時15分 | ② | 生理食塩液 50mL + <b>ロゼウス 0mg 0.00mL</b><br>全開 10分以内で点滴静注（終了後、直ちに③を開始）<br>※血管痛、静脈炎に注意 |
| 0時25分 | ③ | 生理食塩液 250mL（ロゼウス終了後直ちに）<br>全開 20分以内で点滴静注                                         |

REFERENCE

Shinzoh Kudoh, Koji Takeda, Kazuhiro Nakagawa, et al：J Clin Oncol 24: 3657-3663 (2006)

Phase III study of docetaxel compared with vinorelbine in elderly patients with advanced non-small-cell lung cancer: Results of the West Japan Thoracic Oncology Group Trial (WJTOG 9904).

第10回プロトコル審査委員会承認：2009年10月28日 更新:2011年2月14日

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 28日間                |
| 使用基準：     | OLCSG1303試験 研究計画書内容に遵守する事 |

《 注 意 》

開始時に血液製剤同意書を確認すること

プラチナ製剤併用化学療法(PTXを除く)を含む化学療法1～2レジメン後の再発NSCLC症例  
(術後化学療法は抗癌剤最終投与日から1年以内の再発の場合は1レジメンとして扱う)

コース開始基準

| 項目     | 程度                  | 項目      | 程度          |
|--------|---------------------|---------|-------------|
| 好中球数   | 1,500/ $\mu$ L 以上   | 総ビリルビン  | 1.5mg/dL 以下 |
| 血小板数   | 100,000/ $\mu$ L 以上 | AST/ALT | 正常値の2.5倍以下  |
| ヘモグロビン | 8g/dL 以上            | Cre     | 1.5mg/dL 以下 |
|        |                     | 末梢神経障害  | Grade 1     |
|        |                     | 肺臓炎     | Grade 0     |
|        |                     | 感染      | Grade 1     |
|        |                     | PS      | 0～2         |

day8.15.22の投与基準

| 項目   | 程度                 | 項目                | 程度        |
|------|--------------------|-------------------|-----------|
| 好中球数 | 1,000/ $\mu$ L 以上  | 感染症               | ≦ Grade 1 |
| 血小板数 | 50,000/ $\mu$ L 以上 | 末梢神経障害            | ≦ Grade 1 |
|      |                    | AST/ALT/T-Bil/Cre | ≦ Grade 1 |
|      |                    | 粘膜炎or下痢           | ≦ Grade 1 |
|      |                    | 非血液学的毒性           | ≦ Grade 2 |

《 使用 薬 剤 》

パクリタキセル (nab-PTX)：(アブラキサン) 100mg /V

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名  | 標準投与量                 | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日       |
|--------|-----------------------|-------|---------|-----------|
| アブラキサン | 100 mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1,8,15,22 |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|               |         |                                                         |          |          |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------|----------|----------|
| Day1,8,15,22； | 1月1日(土) | 1月8日(土)                                                 | 1月15日(土) | 1月22日(土) |
| 0時00分         | ①       | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注                   |          |          |
| 0時15分         | ②       | 生理食塩液 100mL + アブラキサン 0mg<br>30 分で点滴静注<br>※フィルターなしルートで投与 |          |          |
| 0時45分         | ③       | 生理食塩液 50mL<br>15 分で点滴静注                                 |          |          |

REFERENCE

研究代表者 独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター呼吸器内科 野上 尚之：OLCSG1303  
進行・再発肺非小細胞癌(NSCLC)に対するweekly nab-PTX療法の第Ⅰ/Ⅱ相試験  
2014年10月度化学療法プロトコール審査委員会承認：2014年10月20日

対象：PD-L1陽性 非小細胞肺癌（術後補助）

レジメン名：＜術後＞Atezolizumab療法

コース目

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |              |
|-----------|--------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間 |
| 目標コース：    | 最大12カ月間      |

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

**PD-L1陽性、pStage2A-3A、CDDPベースの化学療法後の維持療法**

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アフィキシン様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意

《 使用 薬 剤 》

アテゾリズマブ：（テセントリク）1200mg/V

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名  | 標準投与量        | 計算値  | 投与量(mg) | 投与日 |
|--------|--------------|------|---------|-----|
| テセントリク | 1200 mg/body | 1200 |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Day1； | 1月1日(土)                                                                                                        |
| 0時00分 | ① 生理食塩液 50mL<br>血管確保用に速度適宜に点滴静注                                                                                |
| 0時05分 | ② 生理食塩液 250mL + テセントリク 0mg 0.00mL<br>60分で点滴静注<br>(60分で忍容性が良好であれば30分に変更可)<br>0.2μm or 0.22μmのフィルター一体型輸液セットを使用する |
| 1時05分 | ③ 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                                          |

REFERENCE

Enriqueta Felip, Nasser Altorki, Caicun Zhou, et al : Lancet 2021; 398: 1344–57

Adjuvant atezolizumab after adjuvant chemotherapy in resected stage IB–IIIA non-small-cell lung cancer(IMpower010)

: a randomised, multicentre, open-label, phase 3 trial

2022年10月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2022年10月17日

対象： EGFR変異陽性 非小細胞肺癌（術後補助）

レジメン名： <術後>Osimertinib療法

コース目

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

投与スケジュール： 通常， 8 0 m g を 1 日 1 回経口投与する。なお，患者の状態により適宜減量する。

《 注 意 》

EGFR変異陽性、pStage2A-3A、CDDPhaseの化学療法後の維持療法

適正使用ガイドに準じる

※ Grade2以上の副作用出現時には休薬、減量、中止を判断する

《 使 用 薬 剤 》

オシメルチニブ：タグリッソ錠40,80mg

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名 | 標準投与量      | 計算値 | 投与量(mg) | 投与日 |
|-------|------------|-----|---------|-----|
| タグリッソ | 80 mg/body | 80  |         | 連日  |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

内服

タグリッソ錠 0mg

1日1回 経口投与

#### REFERENCE

Yi-Long Wu, M.D., Masahiro Tsuboi, M.D., Jie He, M.D.,et al : N Engl J Med 2020;383:1711-23.

Osimertinib in Resected EGFR-Mutated Non-Small-Cell Lung Cancer

2022年10月度化学療法プロトコール審査委員会承認：2022年10月17日

対象： 非小細胞肺癌（扁平上皮癌）術前補助化学療法 シスプラチン不耐の患者

レジメン名： <術前>Nivolumab+CBDCA+GEM療法

|         |       |
|---------|-------|
|         | コース目  |
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間          |
| 目標コース：    | 最大 3 コース              |
| 使用基準：     | class A, Day8：class C |

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

**NSCLC Stage II (4cm以上)-III Aの術前患者を対象**

※ 術前補助療法終了後、6週間以内に根治手術を実施

※ 術後補助療法は最大 4 コース実施（任意）

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アフィキシー様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意

※ **体重30kg未満の患者にはオブジーボの総液量100mLにすること**

※ **患者によってCBDCAをAUC5、GEMを1000mg/m<sup>2</sup>への変更を考慮する。**

《 使用 薬 剤 》

ニボルマブ：オブジーボ（240mg/24mL・120mg/mL・100mg/10mL・20mg/2mL）

カルボプラチン（CBDCA）：（カルボプラチン） 150mg/V、450mg/V

ゲムシタビン（GEM）：ゲムシタビン点滴静注用 200、1000 mg/V

《 投 与 量 》

|             |                        |                                              |         |     |  |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------|---------|-----|--|
| Cre値（mg/dl） |                        | Calvertの計算式：投与量(mg/body) = 目標AUC値 × (GFR+25) |         |     |  |
| 目標AUC       | 6                      | GFRはCcrを代用して計算。                              |         |     |  |
| 薬 剤 名       | 標準投与量                  | 計算値                                          | 投与量(mg) | 投与日 |  |
| オブジーボ       | 360 mg/body            | 360                                          |         | 1   |  |
| カルボプラチン     | 5 or 6 AUC             | #REF!                                        |         | 1   |  |
| ゲムシタビン      | 1250 mg/m <sup>2</sup> | #REF!                                        |         | 1.8 |  |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |    |                                                                                                                   |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Day1； |    | 1月1日(土)                                                                                                           |
| 0時00分 | ①  | 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                                                                     |
| 0時05分 | ②  | 生理食塩液 100mL + オブジーボ注 0mg 0.00mL<br>30 分で点滴静注<br>0.2 μm or 0.22 μmのフィルター型輸液セットを使用する<br>※体重30kg未満の患者には総液量100mLにすること |
| 0時25分 | 内服 | アブレヒタントカプセル 125mg 1 × (1) カルボプラチン開始 1 時間前頃                                                                        |
| 0時35分 | ③  | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                                               |
| 0時40分 | ④  | 生理食塩液 50mL + バロノセトロン 1V + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注                                                                |
| 0時55分 | ⑤  | 生理食塩液 100mL + ゲムシタビン 0mg<br>30 分で点滴静注                                                                             |
| 1時25分 | ⑥  | 5 %ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン 0mg 0.00mL<br>60 分で点滴静注                                                                  |
| 2時25分 | ⑦  | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                                               |

|         |         |                              |         |
|---------|---------|------------------------------|---------|
| Day2～3； | 1月2日(日) | ～                            | 1月3日(月) |
| 起床後     | 内服      | アブレヒタントカプセル 80mg 1 × (2) 起床後 |         |

|       |   |                                       |
|-------|---|---------------------------------------|
| Day8； |   | 1月8日(土)                               |
| 0時00分 | ① | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注 |
| 0時15分 | ② | 生理食塩液 100mL + ゲムシタビン 0mg<br>30 分で点滴静注 |
| 0時45分 | ③ | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                   |

REFERENCE

P.M. Forde, J. Spicer, S. Lu, et al：N Engl J Med 2022;386:1973-85.

Neoadjuvant Nivolumab plus Chemotherapy in Resectable Lung Cancer

2023年7月度化学療法プロトコール審査委員会承認：2023年7月3日

対象： 非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）術前補助化学療法 シスプラチン不耐の患者  
レジメン名： <術前>Nivolumab+CBDCA+PEM療法

|            |                            |                       |       |       |
|------------|----------------------------|-----------------------|-------|-------|
|            | コース目                       |                       |       |       |
| 患者 I D :   | #REF!                      |                       |       |       |
| 患者氏名 :     | #REF!                      |                       |       |       |
| 身長(cm)     | 体重(kg)                     | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!      | #REF!                      | #REF!                 | #REF! | #REF! |
| 投与スケジュール : | 1 コース 2 1 日間               |                       |       |       |
| 目標コース :    | 最大3 コース                    |                       |       |       |
| 使用基準 :     | class A (扁平上皮癌への使用は避けること。) |                       |       |       |

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

NSCLC Stage II (4cm以上)-IIIAの術前患者を対象

- ※ 術前補助療法終了後、6週間以内に根治手術を実施
- ※ 術後補助療法は最大 4 コース実施（任意）
- ※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)  
重度のInfusion reaction（アフィキシー様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。
- ※ 免疫関連副作用（間質性肺炎患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意
- ※ 体重30kg未満の患者にはオプジーボの総液量100mLにすること

《 使用 薬 剤 》

ニボルマブ：オプジーボ（240mg/24mL・120mg/mL・100mg/10mL・20mg/2mL）

カルボプラチン（CBDCA）：（カルボプラチン）150mg／V、450mg／V

ペメトレキシド（PEM）：（ペメトレキシド）100mg・500mg・800mg／V

《 投 与 量 》

|              |       |                                          |       |         |     |
|--------------|-------|------------------------------------------|-------|---------|-----|
| Cre値 (mg/dl) |       | Calvertの計算式：投与量(mg/body)＝目標AUC値×(GFR+25) |       |         |     |
| 目標AUC        | 5     | GFRはCcrを代用して計算。                          |       |         |     |
| 薬 剤 名        | 標準投与量 |                                          | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
| オプジーボ        | 360   | mg/body                                  | 360   |         | 1   |
| カルボプラチン      | 5     | AUC                                      | #REF! |         | 1   |
| ペメトレキシド      | 500   | mg/m2                                    | #REF! |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|              |         |                                                                                                                                    |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 初回投与 7 日以上前に |         |                                                                                                                                    |
|              | 筋注      | メチコパール注500 μ g 2 A 筋注。以後、3 クール（9 週間）毎に 1 回投与。                                                                                      |
|              | 内服      | バンピタン末1 g / 日（葉酸 0.5mg/日）毎日内服。                                                                                                     |
| Day1；        | 1月1日(土) |                                                                                                                                    |
| 0時00分        | ①       | 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                                                                                      |
| 0時05分        | 内服      | アプレビタントカプセル 125mg 1 ×（1）カルボプラチン開始 1 時間前頃                                                                                           |
| 0時05分        | ②       | 生理食塩液 100mL + オプジーボ注 0mg 0.00mL<br>30 分で点滴静注<br><u>0.2 μ m or 0.22 μ mのフィルター体型輸液セットを使用する</u><br><u>※体重30kg未満の患者には総液量100mLにすること</u> |
| 0時35分        | ③       | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                                                                |
| 0時40分        | ④       | 生理食塩液 50mL + パロノセトロン 1V + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注                                                                                 |
| 0時55分        | ⑤       | 生理食塩液 100mL + ペメトレキシド 0mg 0.00mL<br>10 分で点滴静注                                                                                      |
| 1時05分        | ⑥       | 5 %ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン 0mg 0.00mL<br>60 分で点滴静注                                                                                   |
| 2時05分        | ⑦       | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                                                                |
|              |         |                                                                                                                                    |
| Day2～3；      | 1月2日(日) | ～ 1月3日(月)                                                                                                                          |
| 起床後          | 内服      | アプレビタントカプセル 80mg 1 ×（2）起床後                                                                                                         |

REFERENCE

P.M. Forde, J. Spicer, S. Lu, et al：N Engl J Med 2022;386:1973-85.  
Neoadjuvant Nivolumab plus Chemotherapy in Resectable Lung Cancer  
2023年7月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2023年7月3日

対象： 非小細胞肺癌 術前補助化学療法  
レジメン名： <術前>Nivolumab+CBDCA+PTX療法

|         |       |
|---------|-------|
|         | コース目  |
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |            |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|------------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    | アルコールアレルギー |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |            |

※必ず無しを確認

|           |              |
|-----------|--------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間 |
| 目標コース：    | 最大 3 コース     |
| 使用基準：     | class A      |

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

NSCLC Stage II (4cm以上)-III Aの術前患者を対象

- ※ 術前補助療法終了後、6週間以内に根治手術を実施
- ※ 術後補助療法は最大 4 コース実施（任意）
- ※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)  
重度のInfusion reaction（アライキシ-様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。
- ※ 免疫関連副作用（間質性肺炎疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意
- ※ **体重30kg未満の患者にはオプジーボの総液量100mLにすること**
- ※ **患者によってCBDCAをAUC5、PTXを175mg/m<sup>2</sup>への変更を考慮する。**

《 使用 薬 剤 》

ニボルマブ：オプジーボ（240mg/24mL・120mg/mL・100mg/10mL・20mg/2mL）

カルボプラチン（CBDCA）：（カルボプラチン） 150mg/V、450mg/V

パクリタキセル（PTX）：（パクリタキセル） 30mg/5mL/V、100mg/16.7mL/V

《 投 与 量 》

|             |                       |                                          |         |     |  |
|-------------|-----------------------|------------------------------------------|---------|-----|--|
| Cre値（mg/dl） |                       | Calvertの計算式：投与量(mg/body)＝目標AUC値×(GFR+25) |         |     |  |
| 目標AUC       | 6                     | GFRはCcrを代用して計算。                          |         |     |  |
| 薬 剤 名       | 標準投与量                 | 計算値                                      | 投与量(mg) | 投与日 |  |
| オプジーボ       | 360 mg/body           | 360                                      |         | 1   |  |
| カルボプラチン     | 5 or 6 AUC            | #REF!                                    |         | 1   |  |
| パクリタキセル     | 200 mg/m <sup>2</sup> | #REF!                                    |         | 1   |  |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Day1； | 1月1日(土)                                                                                                               |
| 0時00分 | ① 生理食塩液 50mL<br>血管確保で速度適宜に点滴静注                                                                                        |
| 0時05分 | ② 生理食塩液 100mL + オプジーボ注 0mg 0.00mL<br>30 分で点滴静注<br>0.2 μm or 0.22 μmのフィルター一体型輸液セットを使用する<br>※体重30kg未満の患者には総液量100mLにすること |
| 0時35分 | ③ 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                                                 |
| 0時40分 | 内服 レスタミンコーワ錠(10mg) 5錠 点滴直前に内服                                                                                         |
| 0時40分 | ④ 生理食塩液 50mL + ファモチジン 1A + デキサート 16.5mg<br>15 分で点滴静注                                                                  |
| 0時55分 | ⑤ 生理食塩液 100mL + パロノセトロン 1V<br>30 分で点滴静注                                                                               |
| 1時25分 | ⑥ 生理食塩液 500mL + パクリタキセル 0mg 0.00mL<br>3 時間で点滴静注<br>0.2 μm or 0.22 μmのフィルター一体型輸液セットを使用する                               |
| 3時25分 | 内服 アプレビタントカプセル 125mg 1 × (1) カルボプラチン開始 1 時間前頃                                                                         |
| 4時25分 | ⑦ 5 %ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン 0mg 0.00mL<br>60 分で点滴静注                                                                    |
| 5時25分 | ⑧ 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                                                 |

|         |         |                              |         |
|---------|---------|------------------------------|---------|
| Day2～3； | 1月2日(日) | ～                            | 1月3日(月) |
| 起床後     | 内服      | アプレビタントカプセル 80mg 1 × (2) 起床後 |         |

REFERENCE

P.M. Forde, J. Spicer, S. Lu, et al：N Engl J Med 2022;386:1973-85.  
Neoadjuvant Nivolumab plus Chemotherapy in Resectable Lung Cancer  
2023年7月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2023年7月3日

対象： 非小細胞肺癌（扁平上皮癌）術前補助化学療法  
レジメン名： <術前>Nivolumab+CDDP+GEM療法(short hydration)

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間          |
| 目標コース：    | 最大 3 コース              |
| 使用基準：     | class A, Day8：class C |

《 注 意 》  
適正使用ガイドに準じる。  
**NSCLC Stage II (4cm以上)-III Aの術前患者を対象**  
※ 術前補助療法終了後、6週間以内に根治手術を実施  
※ 術後補助療法は最大 4 コース実施（任意）  
※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)  
重度のInfusion reaction（アナフィラキシー様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。  
※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意  
※ **体重30kg未満の患者にはオプジーボの総液量100mLにすること**  
※ **患者によってGEMを1000mg/m<sup>2</sup>への変更を考慮する。**  
指示 1： 体重測定 毎日起床時  
注意： Day4以降も水分摂取が少ない場合や尿量が少ない場合には、輸液を考慮すること

《 使用 薬 剤 》  
ニボルマブ：オプジーボ（240mg/24mL・120mg/mL・100mg/10mL・20mg/2mL）  
シスプラチン；（C D D P）：シスプラチン注（50mg/100mL/V、10mg/20mL/V）  
ゲムシタビン（GEM）：ゲムシタビン点滴静注用 200、1000 mg/V

| 《 投 与 量 》 |       |         |       |         |     |
|-----------|-------|---------|-------|---------|-----|
| 薬 剤 名     | 標準投与量 |         | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
| オプジーボ     | 360   | mg/body | 360   |         | 1   |
| シスプラチン    | 75    | mg/m2   | #REF! |         | 1   |
| ゲムシタビン    | 1250  | mg/m2   | #REF! |         | 1.8 |

| 《 タイムスケジュール：開始時刻 》                       |   |                                           |  |  |
|------------------------------------------|---|-------------------------------------------|--|--|
| ※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。 |   |                                           |  |  |
| Day1； 1月1日(土)                            |   |                                           |  |  |
| 0時00分                                    | ① | 生理食塩液 50mL                                |  |  |
|                                          |   | 血管確保用で速度適宜に点滴静注                           |  |  |
| 0時05分                                    | ② | 生理食塩液 100mL + オプジーボ注 0mg 0.00mL           |  |  |
|                                          |   | 30 分で点滴静注                                 |  |  |
|                                          |   | 0.2 μm or 0.22 μm の74#ターボ型輸液セットを使用する      |  |  |
|                                          |   | ※体重30kg未満の患者には総液量100mLにすること               |  |  |
| 0時35分                                    | ③ | 生理食塩液 50mL                                |  |  |
|                                          |   | フラッシュ                                     |  |  |
| 0時40分                                    | ④ | 生理食塩液 500mL + 硫酸Mg補正液 8mL                 |  |  |
|                                          |   | 1 時間で点滴静注                                 |  |  |
| 1時40分                                    | ⑤ | ソリタ T 3 号 500mL                           |  |  |
|                                          |   | 1 時間で点滴静注                                 |  |  |
| 2時40分                                    | ⑥ | 生理食塩液 50mL + バロノセトロン 1V + デキサート 9.9mg     |  |  |
|                                          |   | 15 分で点滴静注                                 |  |  |
| 2時55分                                    | ⑦ | アブレビタントカプセル 125mg 1 × (1) シスプラチン開始 1 時間前頃 |  |  |
| 2時55分                                    |   | 生理食塩液 100mL + ゲムシタビン 0mg                  |  |  |
|                                          |   | 30 分で点滴静注                                 |  |  |
| 3時25分                                    | ⑧ | マンニトール 300mL                              |  |  |
|                                          |   | 30 分で点滴静注                                 |  |  |
| 3時55分                                    | ⑨ | 生理食塩液 700 mL + シスプラチン 0mg 0.00mL          |  |  |
|                                          |   | 90 分で点滴静注                                 |  |  |
| 5時25分                                    | ⑩ | 生理食塩液 500mL                               |  |  |
|                                          |   | 1 時間で点滴静注                                 |  |  |
| 6時25分                                    | ⑪ | ソリタ T 3 号 500mL                           |  |  |
|                                          |   | 1 時間で点滴静注                                 |  |  |
| Day2～3； 1月2日(日) ～ 1月3日(月)                |   |                                           |  |  |
| 起床後                                      | ① | アブレビタントカプセル 80mg 1 × (2) 起床後              |  |  |
| 2時40分                                    |   | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg                  |  |  |
|                                          |   | 15 分で点滴静注                                 |  |  |
| 2時55分                                    | ② | ソリタ T 3 号 500mL × 3                       |  |  |
|                                          |   | 4.5 時間 (1.5時間 × 3) で点滴静注                  |  |  |
| Day8； 1月8日(土)                            |   |                                           |  |  |
| 2時40分                                    | ① | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg                  |  |  |
|                                          |   | 15 分で点滴静注                                 |  |  |
| 2時55分                                    | ② | 生理食塩液 100mL + ゲムシタビン 0mg                  |  |  |
|                                          |   | 30 分で点滴静注                                 |  |  |
| 3時25分                                    | ③ | 生理食塩液 50mL                                |  |  |
|                                          |   | フラッシュ                                     |  |  |



対象： 非小細胞肺癌 非扁平上皮癌（進行・再発） 1st Line

レジメン名： **Atezolizumab+CBDCA+nab-PTX療法**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1コース 21日間                           |
| 目標コース：    | <b>4-6コース施行後、Atezolizumab単独にて投与</b> |
| 使用基準：     | class A (day8.15はclass C)           |

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

**開始時に血液製剤同意書を確認すること**

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アナフィラキシー様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意

《 使用薬剤 》

アテゾリズマブ：（テセントリク）1200mg/V

カルボプラチン：（カルボプラチン）150mg/V、450mg/V

パクリタキセル：（アブラキサン）100mg/V

《 投 与 量 》

|              |                       |                                              |         |        |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------|--------|
| Cre値 (mg/dl) |                       | Calvertの計算式：投与量(mg/body) = 目標AUC値 × (GFR+25) |         |        |
| 目標AUC        | 6                     | GFRはCcrを代用して計算。                              |         |        |
| 薬 剤 名        | 標準投与量                 | 計算値                                          | 投与量(mg) | 投与日    |
| テセントリク       | 1200 mg/body          | 1200                                         |         | 1      |
| カルボプラチン      | 6 AUC                 | #REF!                                        |         | 1      |
| アブラキサン       | 100 mg/m <sup>2</sup> | #REF!                                        |         | 1,8,15 |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|                                              |         |                                         |                                                                         |  |  |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Day1；                                        | 1月1日(土) | ※エクステンションチューブを付け、フィルター有ルートで投与すること       |                                                                         |  |  |
| ※CVポートより投与の場合はコアレスニードルセットにセーフTポートを接続して投与開始   |         |                                         |                                                                         |  |  |
| 0時00分                                        | ①       | 生理食塩液 50mL                              | 血管確保で速度適宜に点滴静注                                                          |  |  |
| 0時05分                                        | ②       | 生理食塩液 250mL + テセントリク 0mg 0.00mL         | 60分で点滴静注<br>(60分で忍容性が良好であれば30分に変更可)<br>0.2μm or 0.22μmのフィルター型輸液セットを使用する |  |  |
| 1時05分                                        | ③       | 生理食塩液 50mL                              | フラッシュ                                                                   |  |  |
| ※④をフィルター無ルートでプライミングし、エクステンションチューブの側管から投与すること |         |                                         |                                                                         |  |  |
| 1時10分                                        | 内服      | アプレビタントカプセル 125mg 1×(1) カルボプラチン開始 1時間前頃 |                                                                         |  |  |
| 1時10分                                        | ④       | 生理食塩液 50mL + パロノセトロン 1V + デキサート 6.6mg   | 15分で点滴静注                                                                |  |  |
| 1時25分                                        | ⑤       | 生理食塩液 100mL + アブラキサン 0mg                | 30分で点滴静注<br>調整法に従い溶解。 0.0mL の懸濁液を生理食塩液容器に戻す。                            |  |  |
| ※フィルターなしルートで投与                               |         |                                         |                                                                         |  |  |
| 1時55分                                        | ⑥       | 生理食塩液 50mL                              | 15分で点滴静注                                                                |  |  |
| 2時10分                                        | ⑦       | 5%ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン 0mg             | 60分で点滴静注 0.00mL                                                         |  |  |
| 3時10分                                        | ⑧       | 生理食塩液 50mL                              | フラッシュ                                                                   |  |  |
|                                              |         |                                         |                                                                         |  |  |
| Day2～3；                                      | 1月2日(日) | ～                                       | 1月3日(月)                                                                 |  |  |
| 起床後                                          | 内服      | アプレビタントカプセル 80mg 1×(2) 起床後              |                                                                         |  |  |
|                                              |         |                                         |                                                                         |  |  |
| Day8,15；                                     | 1月8日(土) | 1月15日(土)                                |                                                                         |  |  |
| 1時10分                                        | ①       | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg                | 15分で点滴静注                                                                |  |  |
| 1時25分                                        | ②       | 生理食塩液 100mL + アブラキサン 0mg                | 30分で点滴静注<br>調整法に従い溶解。 0.0mL の懸濁液を生理食塩液容器に戻す。                            |  |  |
| ※フィルターなしルートで投与                               |         |                                         |                                                                         |  |  |
| 1時55分                                        | ③       | 生理食塩液 50mL                              | 15分で点滴静注                                                                |  |  |

REFERENCE

L. Paz-Ares, A. Luft, D. Vicente, A. Tafreshi, et al：N Engl J Med 2018;379:2040-51  
Pembrolizumab plus Chemotherapy for Squamous Non-Small-Cell Lung Cancer  
2019年1月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2019年1月21日

対象： 非小細胞肺癌（進行・再発） 2nd line以降  
レジメン名： **nab-PTXweekly療法**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 21日間           |
| 使用基準：     | 開始時class B、以降class C |

《 注 意 》  
**開始時に血液製剤同意書を確認すること**  
適正使用ガイドに準じる

《 使 用 薬 剤 》  
パクリタキセル（nab-PTX）：（アブラキサン） 100mg /V

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名  | 標準投与量                 | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日    |
|--------|-----------------------|-------|---------|--------|
| アブラキサン | 100 mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1,8,15 |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》  
**※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。**

|            |         |                                                                                                                          |          |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Day1,8,15； | 1月1日(土) | 1月8日(土)                                                                                                                  | 1月15日(土) |
| 0時00分      | ①       | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注                                                                                    |          |
| 0時15分      | ②       | 生理食塩液 100mL + <b>アブラキサン 0mg</b><br>30 分で点滴静注<br><small>調整法に従い溶解。 0.0mL の懸濁液を生理食塩液容器に戻す。</small><br><u>※フィルターなしルートで投与</u> |          |
| 0時45分      | ③       | 生理食塩液 50mL<br>15 分で点滴静注                                                                                                  |          |

対象： HER2(ERBB2)遺伝子変異陽性 非小細胞肺癌（進行・再発）2nd Line以降  
レジメン名： **T-DXT療法**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日                |
| 使用基準：     | 開始時；class B、2 回目以降；class C |

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

※ 投与前～投与中の心機能異常に要注意

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アフィキシ様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

《 使 用 薬 剤 》

トラスツズマブ デルクステカン：エンハーツ（1V：100mg）

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名 | 標準投与量     | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|-------|-----------|-------|---------|-----|
| エンハーツ | 5.4 mg/kg | #REF! |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

**※ エンハーツは室温での調製及び投与は合わせて4時間以内に行うこと。**

|        |         |                                                                                                                                           |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Day1 ; | 1月1日(土) |                                                                                                                                           |
| 0時00分  | 内服      | アプレピタントカプセル 125mg 1 × ( 1 )    エンハーツ開始1時間前頃                                                                                               |
| 0時00分  | ①       | 生理食塩液 50mL + パロノセトロン 1V + デキサート 9.9mg<br>15 分で点滴静注                                                                                        |
| 0時15分  | ②       | 5%ブドウ糖注射液 100mL<br>45 分で点滴静注                                                                                                              |
| 1時00分  | ③       | 5%ブドウ糖注射液 100mL + エンハーツ    0mg    + 注射用水20mL<br>90 分で点滴静注    0.00mL<br>(初回投与時は90分。90分で問題なければ30分へ変更可)<br><u>0.22μ以下のフィルター一体型輸液セットを使用する</u> |
| 2時30分  | ④       | 5%ブドウ糖注射液 100mL<br>フラッシュ                                                                                                                  |

|         |         |                            |         |
|---------|---------|----------------------------|---------|
| Day2～5； | 1月2日(日) | ～                          | 1月5日(水) |
| 起床後     | 内服      | アブレピタントカプセル 80mg 1 × ( 2 ) | 起床後     |
| 起床後     | 内服      | デカドロン 4mg 1錠 1 × ( 4 )     | 朝食後     |

REFERENCE

Bob T Li, Egbert F.Smit, Yasushi Goto, et al. Trastuzumab Deruxtecan in HER2-Mutant Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2022; 386(3):241-51

化学療法プロトコール審査委員会 承認：2023年9月11日

対象： 非小細胞肺癌（進行・再発） Durva+Treme+Platinum+PEM療法後における維持療法

レジメン名： **Durva+PEM療法(メンテナンス)**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 8 日                                               |
| 目標コース：    | 維持療法を行う（Durva+PEM 1コース→Durva+Treme+PEM 1コース→Durva+PEMを継続） |
| 使用基準：     | class B                                                   |

《 注 意 》

※ **Durva+Treme+Platinum+PEM療法後の維持療法として投与。**

適正使用ガイドに準じる。

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アフィネシ-様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意

※ **体重30kg以下の場合、イミフィンジの投与量は20mg/kgとする。**

《 使用 薬 剤 》

デュルバルマブ（Durvalumab）：イミフィンジ 点滴静注 120mg/2.4mL/V、500mg/10mL/V

ペメトレキシド（PEM）：100mg/V、500mg/V、800mg/V

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名   | 標準投与量          | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|---------|----------------|-------|---------|-----|
| イミフィンジ  | 1500 * mg/body | #REF! |         | 1   |
| ペメトレキシド | 500 mg/m2      | #REF! |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|                                    |                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 初回投与 7 日以上前に（ペメトレキシド最終投与日から22日目まで） |                                                                                       |
|                                    | <b>筋注</b> メチコバル注500μg 2A筋注。以後、約9週毎に1回投与                                               |
|                                    | <b>内服</b> パンビタン末1 g / 日（葉酸 0.5mg/日）毎日内服。                                              |
| Day1；                              | 1月1日(土)                                                                               |
| 0時00分                              | ① 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                                       |
| 0時05分                              | ② 生理食塩液 100mL + イミフィンジ 0mg 0.00mL<br>60 分で点滴静注<br>0.2μm or 0.22μm のフィルター一体型輸液セットを使用する |
| 1時05分                              | ③ 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                 |
| 1時10分                              | ④ 生理食塩液 50mL + パロノセトロン 1V + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注                                  |
| 1時25分                              | ⑤ 生理食塩液 100mL + ペメトレキシド 0mg 0.00mL<br>10 分で点滴静注                                       |
| 1時35分                              | ⑥ 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                 |

REFERENCE

Melissa L. Johnson, Byoung Chul Cho, Alexander Luft, et al : Durvalumab With or Without Tremelimumab in combination With Chemotherapy as First-Line Therapy for Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer: The Phase III POSEIDON Study. J Clin Oncol 41:1213-1227

2023年12月度化学療法プロトコール審査委員会承認：2023年12月11日

対象： 非小細胞肺癌（扁平上皮癌・非扁平上皮癌）（進行・再発） 1st Line

レジメン名： **Durva+Treme+CBDCA+nab-PTX療法**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間                                             |
| 目標コース：    | 4 コース施行後、維持療法を行う（Durva 1 コース→Durva+Treme 1 コース→Durvaを継続） |
| 使用基準：     | class A (day8.15はclass C)                                |

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

**開始時に血液製剤同意書を確認すること**

※ **Infusion reaction** に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アレルギー様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意

※ **体重30kg以下の場合、イミフィンジの投与量は20mg/kgとする。**

《 使 用 薬 剤 》

デュルバルマブ（Durvalumab）：イミフィンジ 点滴静注 120mg/2.4mL/V、500mg/10mL/V

トレメリムマブ：イジュド（25mg/1.25mL）

カルボプラチン：（カルボプラチン）150mg/V、450mg/V

パクリタキセル：（アブラキサン）100mg/V

《 投 与 量 》

|              |                       |                                          |         |        |  |
|--------------|-----------------------|------------------------------------------|---------|--------|--|
| Cre値 (mg/dl) |                       | Calvertの計算式：投与量(mg/body)＝目標AUC値×(GFR+25) |         |        |  |
| 目標AUC        | 6                     | GFRはCcrを代用して計算。                          |         |        |  |
| 薬 剤 名        | 標準投与量                 | 計算値                                      | 投与量(mg) | 投与日    |  |
| イミフィンジ       | 1500 * mg/body        | #REF!                                    |         | 1      |  |
| イジュド         | 75 mg/body            | 75                                       |         | 1      |  |
| カルボプラチン      | 5 or 6 AUC            | #REF!                                    |         | 1      |  |
| アブラキサン       | 100 mg/m <sup>2</sup> | #REF!                                    |         | 1,8,15 |  |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|                                              |         |                                                                                  |
|----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Day1；                                        | 1月1日(土) |                                                                                  |
| ※エクステンションチューブを付け、フィルター有ルートで投与すること            |         |                                                                                  |
| ※CVポートより投与の場合はコアレスニードルセットにセフトポートを接続して投与開始    |         |                                                                                  |
| 0時00分                                        | ①       | 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                                    |
| 0時05分                                        | ②       | 生理食塩液 100mL + イジュド 0mg 0.00mL<br>60 分で点滴静注<br>0.2μm or 0.22μmのフィルター型輸液セットを使用する   |
| 1時05分                                        | ③       | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                              |
| 1時10分                                        | ④       | 生理食塩液 100mL + イミフィンジ 0mg 0.00mL<br>60 分で点滴静注<br>0.2μm or 0.22μmのフィルター型輸液セットを使用する |
| 2時10分                                        | ⑤       | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                              |
| ※⑥をフィルター無ルートでプライミングし、エクステンションチューブの側管から投与すること |         |                                                                                  |
| 2時15分                                        | 内服      | アブレビタントカプセル 125mg 1×(1) カルボプラチン開始1時間前頃                                           |
| 2時15分                                        | ⑥       | 生理食塩液 50mL + パロノセトロン 1V + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注                               |
| 2時30分                                        | ⑦       | 生理食塩液 100mL + アブラキサン 0mg 0.00mL<br>30 分で点滴静注<br>調整法に従い溶解。 0.0mL の懸濁液を生理食塩液容器に添す。 |
| 3時00分                                        | ⑧       | 生理食塩液 50mL<br>15 分で点滴静注                                                          |
| 3時15分                                        | ⑨       | 5 %ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン 0mg 0.00mL<br>60 分で点滴静注                                 |
| 4時15分                                        | ⑩       | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                              |
| Day2～3；                                      | 1月2日(日) | ～ 1月3日(月)                                                                        |
| 起床後                                          | 内服      | アブレビタントカプセル 80mg 1×(2) 起床後                                                       |
| Day8,15；                                     | 1月8日(土) | 1月15日(土)                                                                         |
| 2時15分                                        | ①       | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注                                            |
| 2時30分                                        | ②       | 生理食塩液 100mL + アブラキサン 0mg 0.00mL<br>30 分で点滴静注<br>調整法に従い溶解。 0.0mL の懸濁液を生理食塩液容器に添す。 |
| 3時00分                                        | ③       | 生理食塩液 50mL<br>15 分で点滴静注                                                          |

REFERENCE

Melissa L. Johnson, Byoung Chul Cho, Alexander Luft, et al：Durvalumab With or Without Tremelimumab in combination With Chemotherapy as First-Line Therapy for Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer: The Phase III POSEIDON Study. J Clin Oncol 41:1213-1227

2023年12月度化学療法プロトコール審査委員会承認：2023年12月11日

対象： 非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）（進行・再発） 1st Line

レジメン名： **Durva+Treme+CBDCA+PEM療法**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日                                                            |
| 目標コース：    | 4 コース施行後、維持療法を行う<br>(Durva+PEM 1コース→Durva+Treme+PEM 1コース→Durva+PEMを継続) |
| 使用基準：     | class B                                                                |

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

- ※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)
- 重度のInfusion reaction（アライキ-様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。
- ※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意
- ※ **体重30kg以下の場合、イミフィンジの投与量は20mg/kgとする。**

《 使 用 薬 剤 》

デュルバルマブ（Durvalumab）：イミフィンジ 点滴静注 120mg/2.4mL/V、500mg/10mL/V  
トレメリムマブ：イジュド（25mg/1.25mL）  
カルボプラチン（CBDCA）：150mg/V、450mg/V  
ペメトレキシド（PEM）：100mg/V、500mg/V、800mg/V

《 投 与 量 》

|             |                |                                          |         |     |   |
|-------------|----------------|------------------------------------------|---------|-----|---|
| Cre値（mg/dl） |                | Calvertの計算式：投与量(mg/body)＝目標AUC値×(GFR+25) |         |     |   |
| 目標AUC       | 6              | GFRはCcrを代用して計算。                          |         |     |   |
| 薬 剤 名       | 標準投与量          | 計算値                                      | 投与量(mg) | 投与日 |   |
| イミフィンジ      | 1500 * mg/body | #REF!                                    |         |     | 1 |
| イジュド        | 75 mg/body     | 75                                       |         |     | 1 |
| カルボプラチン     | 5 or 6 AUC     | #REF!                                    |         |     | 1 |
| ペメトレキシド     | 500 mg/m2      | #REF!                                    |         |     | 1 |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|                                    |         |                                          |  |  |  |
|------------------------------------|---------|------------------------------------------|--|--|--|
| 初回投与 7 日以上前に（ペメトレキシド最終投与日から22日目まで） |         |                                          |  |  |  |
|                                    | 筋注      | メチコパール注500μg 2A筋注。以後、約9週毎に1回投与           |  |  |  |
|                                    | 内服      | バンピタン末1 g /日（葉酸 0.5mg/日）毎日内服。            |  |  |  |
| Day1；                              | 1月1日(土) |                                          |  |  |  |
| 0時00分                              | ①       | 生理食塩液 50mL                               |  |  |  |
|                                    |         | 血管確保用で速度適宜に点滴静注                          |  |  |  |
| 0時05分                              | ②       | 生理食塩液 100mL + イジュド 0mg 0.00mL            |  |  |  |
|                                    |         | 60 分で点滴静注                                |  |  |  |
|                                    |         | 0.2μm or 0.22μmのフィルー体型輸液セットを使用する         |  |  |  |
| 1時05分                              | ③       | 生理食塩液 50mL                               |  |  |  |
|                                    |         | フラッシュ                                    |  |  |  |
| 1時10分                              | ④       | 生理食塩液 100mL + イミフィンジ 0mg 0.00mL          |  |  |  |
|                                    |         | 60 分で点滴静注                                |  |  |  |
|                                    |         | 0.2μm or 0.22μmのフィルー体型輸液セットを使用する         |  |  |  |
| 1時40分                              | 内服      | アプレビタントカプセル 125mg 1×(1) カルボプラチン開始 1 時間前頃 |  |  |  |
| 2時10分                              | ⑤       | 生理食塩液 50mL                               |  |  |  |
|                                    |         | フラッシュ                                    |  |  |  |
| 2時15分                              | ⑥       | 生理食塩液 50mL + パロノセトロン 1V + デキサート 6.6mg    |  |  |  |
|                                    |         | 15 分で点滴静注                                |  |  |  |
| 2時30分                              | ⑦       | 生理食塩液 100mL + ペメトレキシド 0mg 0.00mL         |  |  |  |
|                                    |         | 10 分で点滴静注                                |  |  |  |
| 2時40分                              | ⑧       | 5 %ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン 0mg 0.00mL      |  |  |  |
|                                    |         | 60 分で点滴静注                                |  |  |  |
| 3時40分                              | ⑨       | 生理食塩液 50mL                               |  |  |  |
|                                    |         | フラッシュ                                    |  |  |  |

|         |         |                            |         |
|---------|---------|----------------------------|---------|
| Day2～3； | 1月2日(日) | ～                          | 1月3日(月) |
| 起床後     | 内服      | アプレビタントカプセル 80mg 1×(2) 起床後 |         |

REFERENCE

Melissa L. Johnson, Byoung Chul Cho, Alexander Luft, et al：Durvalumab With or Without Tremelimumab in combination With Chemotherapy as First-Line Therapy for Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer: The Phase III POSEIDON Study. J Clin Oncol 41:1213-1227

2023年12月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2023年12月11日

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1コース 2日間                                                              |
| 目標コース：    | 4コース施行後、維持療法を行う<br>(Durva+PEM 1コース→Durva+Treme+PEM 1コース→Durva+PEMを継続) |
| 使用基準：     | class A (扁平上皮癌への使用は避けること。)                                            |

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（7分以内様-様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意

指示1： 体重測定 毎日起床時

注意： Day4以降も水分摂取が少ない場合や尿量が少ない場合には、輸液を考慮すること

※ **体重30kg以下の場合、イミフィンジの投与量は20mg/kgとする。**

《 使用薬剤 》

デュルバルマブ（Durvalumab）：イミフィンジ 点滴静注 120mg/2.4mL/V、500mg/10mL/V

トレメリムマブ：イジュド（25mg/1.25mL）

ペメトレキセド：（ペメトレキセド） 100mg・500mg・800mg/V

シスプラチン：（CDDP）：シスプラチン注（50mg/100mL/V、10mg/20mL/V）

| 薬 剤 名   | 標準投与量          | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|---------|----------------|-------|---------|-----|
| イミフィンジ  | 1500 * mg/body | #REF! |         | 1   |
| イジュド    | 75 mg/body     | 75    |         | 1   |
| ペメトレキセド | 500 mg/m2      | #REF! |         | 1   |
| シスプラチン  | 75 mg/m2       | #REF! |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

初回投与 7 日以上前に

|  |    |                                           |
|--|----|-------------------------------------------|
|  | 筋注 | メチコパール注500 μ g 2 A 筋注。以後、3クール（9週間）毎に1回投与。 |
|  | 内服 | バンピタン末1 g / 日（葉酸 0.5mg / 日）毎日内服。          |

Day1； 1月1日(土)

|       |   |                                           |     |        |
|-------|---|-------------------------------------------|-----|--------|
| 0時00分 | ① | 生理食塩液 50mL                                |     |        |
|       |   | 血管確保で速度適宜に点滴静注                            |     |        |
| 0時05分 | ② | 生理食塩液 100mL + イジュド                        | 0mg | 0.00mL |
|       |   | 60 分で点滴静注                                 |     |        |
|       |   | 0.2 μ m or 0.22 μ m のフィルター型輸液セットを使用する     |     |        |
| 1時05分 | ③ | 生理食塩液 50mL                                |     |        |
|       |   | フラッシュ                                     |     |        |
| 1時10分 | ④ | 生理食塩液 100mL + イミフィンジ                      | 0mg | 0.00mL |
|       |   | 60 分で点滴静注                                 |     |        |
|       |   | 0.2 μ m or 0.22 μ m のフィルター型輸液セットを使用する     |     |        |
| 2時10分 | ⑤ | 生理食塩液 50mL                                |     |        |
|       |   | フラッシュ                                     |     |        |
| 2時15分 | ⑥ | 生理食塩液 500mL + 硫酸Mg補正液 8mL                 |     |        |
|       |   | 1 時間で点滴静注                                 |     |        |
| 3時15分 | ⑦ | ソリタ T 3 号 500mL                           |     |        |
|       |   | 1 時間で点滴静注                                 |     |        |
| 4時10分 |   | 内服                                        |     |        |
|       |   | アプレビタントカプセル 125mg 1 × (1) シスプラチン開始 1 時間前頃 |     |        |
| 4時15分 | ⑧ | 生理食塩液 50mL + バロノセトロン 1V + デキサート 9.9mg     |     |        |
|       |   | 15 分で点滴静注                                 |     |        |
| 4時30分 | ⑨ | 生理食塩液 100mL + ペメトレキセド                     | 0mg | 0.00mL |
|       |   | 10 分で点滴静注                                 |     |        |
| 4時40分 | ⑩ | マンニトール 300mL                              |     |        |
|       |   | 30 分で点滴静注                                 |     |        |
| 5時10分 | ⑪ | 生理食塩液 700 mL + シスプラチン                     | 0mg | 0.00mL |
|       |   | 90 分で点滴静注                                 |     |        |
| 6時40分 | ⑫ | 生理食塩液 500mL                               |     |        |
|       |   | 1 時間で点滴静注                                 |     |        |
| 7時40分 | ⑬ | ソリタ T 3 号 500mL                           |     |        |
|       |   | 1 時間で点滴静注                                 |     |        |

Day2～3； 1月2日(日) ～ 1月3日(月)

|       |   |    |                              |
|-------|---|----|------------------------------|
| 起床後   |   | 内服 | アプレビタントカプセル 80mg 1 × (2) 起床後 |
| 4時10分 | ① |    | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg     |
|       |   |    | 15 分で点滴静注                    |
| 4時25分 | ② |    | ソリタ T 3 号 500mL × 3          |
|       |   |    | 4.5 時間 (1.5時間 × 3) で点滴静注     |

対象： 非小細胞肺癌（進行・再発） Durva+Treme+Platinum+PEM療法後における維持療法  
レジメン名： **Durva+Treme+PEM療法(メンテナンス)**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 8 日                                               |
| 目標コース：    | 維持療法を行う（Durva+PEM 1コース→Durva+Treme+PEM 1コース→Durva+PEMを継続） |
| 使用基準：     | class B                                                   |

《 注 意 》

※ **Durva+Treme+Platinum+PEM療法後の維持療法として投与。**

適正使用ガイドに準じる。

※ **Infusion reaction** に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アフィキシー様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意

※ **体重30kg以下の場合、イミフィンジの投与量は20mg/kgとする。**

《 使 用 薬 剤 》

デュルバルマブ（Durvalumab）：イミフィンジ 点滴静注 120mg/2.4mL/V、500mg/10mL/V

トレメリムマブ：イジュド（25mg/1.25mL）

ペメトレキシド（PEM）：100mg/V、500mg/V、800mg/V

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名   | 標準投与量  |                   | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|---------|--------|-------------------|-------|---------|-----|
| イミフィンジ  | 1500 * | mg/body           | #REF! |         | 1   |
| イジュド    | 75     | mg/body           | 75    |         | 1   |
| ペメトレキシド | 500    | mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |   |                                       |                                  |  |  |
|-------|---|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|
|       |   | 初回投与 7 日以上に （ペメトレキシド最終投与日から22日目まで）    |                                  |  |  |
|       |   | 筋注                                    | メチコパール注500μg 2A筋注。以後、約9週毎に1回投与   |  |  |
|       |   | 内服                                    | バンピタン末1 g / 日（葉酸 0.5mg/日） 毎日内服。  |  |  |
| Day1； |   | 1月1日(土)                               |                                  |  |  |
| 0時00分 | ① | 生理食塩液 50mL                            | 血管確保用で速度適宜に点滴静注                  |  |  |
| 0時05分 | ② | 生理食塩液 100mL + イジュド 0mg 0.00mL         | 60 分で点滴静注                        |  |  |
|       |   |                                       | 0.2μm or 0.22μmのフィルー体型輸液セットを使用する |  |  |
| 1時05分 | ③ | 生理食塩液 50mL                            | フラッシュ                            |  |  |
| 1時10分 | ④ | 生理食塩液 100mL + イミフィンジ 0mg 0.00mL       | 60 分で点滴静注                        |  |  |
|       |   |                                       | 0.2μm or 0.22μmのフィルー体型輸液セットを使用する |  |  |
| 2時10分 | ⑤ | 生理食塩液 50mL                            | フラッシュ                            |  |  |
| 2時15分 | ⑥ | 生理食塩液 50mL + パロノセトロン 1V + デキサート 6.6mg | 15 分で点滴静注                        |  |  |
| 2時30分 | ⑦ | 生理食塩液 100mL + ペメトレキシド 0mg 0.00mL      | 10 分で点滴静注                        |  |  |
| 2時40分 | ⑧ | 生理食塩液 50mL                            | フラッシュ                            |  |  |

REFERENCE

Melissa L. Johnson, Byoung Chul Cho, Alexander Luft, et al : Durvalumab With or Without Tremelimumab in combination With Chemotherapy as First-Line Therapy for Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer: The Phase III POSEIDON Study. J Clin Oncol 41:1213-1227

2023年12月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2023年12月11日

対象： 非小細胞肺癌（進行・再発） Durva+Treme+CBDCA+nabPTX療法後における維持療法

レジメン名： **Durva+Treme療法(メンテナンス)**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1コース 28日間                                     |
| 目標コース：    | 維持療法を行う（Durva 1コース→Durva+Treme 1コース→Durvaを継続） |

《 注 意 》

- ※ **Durva+Treme+CBDCA+nabPTX療法後の維持療法として投与。**
- 適正使用ガイドに準じる。
- ※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)
- 重度のInfusion reaction（アフィキシー様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。
- ※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意
- ※ **体重30kg以下の場合、イミフィンジの投与量は20mg/kgとする。**

《 使用薬剤 》

デュルバルマブ（Durvalumab）：イミフィンジ 点滴静注 120mg/2.4mL/V、500mg/10mL/V

トレメリマブ：イジュド（25mg/1.25mL）

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名  | 標準投与量          | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|--------|----------------|-------|---------|-----|
| イミフィンジ | 1500 * mg/body | #REF! |         | 1   |
| イジュド   | 75 mg/body     | 75    |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Day1； | 1月1日(土)                                                                           |
| 0時00分 | ① 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                                   |
| 0時05分 | ② 生理食塩液 100mL + イジュド 0mg 0.00mL<br>60分で点滴静注<br>0.2μm or 0.22μmのフィルター型輸液セットを使用する   |
| 1時05分 | ③ 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                             |
| 1時10分 | ④ 生理食塩液 100mL + イミフィンジ 0mg 0.00mL<br>60分で点滴静注<br>0.2μm or 0.22μmのフィルター型輸液セットを使用する |
| 2時10分 | ⑤ 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                             |

REFERENCE

Melissa L. Johnson, Byoung Chul Cho, Alexander Luft, et al：Durvalumab With or Without Tremelimumab in combination With Chemotherapy as First-Line Therapy for Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer: The Phase III POSEIDON Study. J Clin Oncol 41:1213-1227

2023年12月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2023年12月11日

対象： 非小細胞肺癌（進行・再発） Durva+Treme+CBDCA+nabPTX療法後における維持療法  
レジメン名： **Durvalumab療法(メンテナンス)**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 8 日                                   |
| 目標コース：    | 維持療法を行う（Durva 1コース→Durva+Treme 1コース→Durvaを継続） |

《 注 意 》

- ※ **Durva+Treme+CBDCA+nabPTX療法後の維持療法として投与。**  
適正使用ガイドに準じる。
- ※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)  
重度のInfusion reaction（アフリキシー様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。
- ※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意
- ※ **体重30kg以下の場合、イミフィンジの投与量は20mg/kgとする。**

《 使用 薬 剤 》

デュルバルマブ（Durvalumab）：イミフィンジ 点滴静注 120mg/2.4mL/V、500mg/10mL/V

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名  | 標準投与量          | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|--------|----------------|-------|---------|-----|
| イミフィンジ | 1500 * mg/body | #REF! |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Day1； | 1月1日(土)                                                                                |
| 0時00分 | ① 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                                        |
| 0時05分 | ② 生理食塩液 100mL + イミフィンジ 0mg 0.00mL<br>60 分で点滴静注<br>0.2 μm or 0.22 μmのフィルター一体型輸液セットを使用する |
| 1時05分 | ③ 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                  |

REFERENCE

Melissa L. Johnson, Byoung Chul Cho, Alexander Luft, et al : Durvalumab With or Without Tremelimumab in combination With Chemotherapy as First-Line Therapy for Metastatic Non–Small-Cell Lung Cancer: The Phase III POSEIDON Study. J Clin Oncol 41:1213-1227

2023年12月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2023年12月11日

対象： 胸腺癌（進行・再発） 1st Line  
レジメン名： CBDCA+AMR療法

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 投与スケジュール： | 1コース 21日間 |
| 使用基準：     | class A   |

《 注 意 》  
1st LineではAMRは35mg/m<sup>2</sup>、2nd Lineでは30mg/m<sup>2</sup>を推奨。

《 使用 薬 剤 》  
カルボプラチン（CBDCA）：（カルボプラチン） 150mg/V、450mg/V  
アムルピシン（AMR）：（カルセド） 50mg/V、20mg/V

|              |       |                                              |       |         |     |
|--------------|-------|----------------------------------------------|-------|---------|-----|
| 《 投 与 量 》    |       |                                              |       |         |     |
| Cre値 (mg/dl) |       | Calvertの計算式：投与量(mg/body) = 目標AUC値 × (GFR+25) |       |         |     |
| 目標AUC        | 4     | GFRはCcrを代用して計算。                              |       |         |     |
| 薬 剤 名        | 標準投与量 |                                              | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
| カルボプラチン      | 4     | AUC                                          | #REF! |         | 1   |
| カルセド         | 35    | mg/m <sup>2</sup>                            | #REF! |         | 1～3 |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》  
※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |   |                                       |                                            |  |        |
|-------|---|---------------------------------------|--------------------------------------------|--|--------|
| Day1； |   | 1月1日(土)                               |                                            |  |        |
| 0時00分 |   | 内服                                    | アブレピタントカプセル 125mg 1 × (1) カルボプラチン開始 1 時間前頃 |  |        |
| 0時25分 | ① | 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1V + デキサート 9.9mg |                                            |  |        |
|       |   | 15 分で点滴静注                             |                                            |  |        |
| 0時40分 | ② | 生理食塩液 50mL                            |                                            |  |        |
|       |   | 5 分で点滴静注                              |                                            |  |        |
| 0時45分 | ③ | 生理食塩液 50mL + カルセド                     |                                            |  | 0mg    |
|       |   | 全開 (10分以内) で点滴静注                      |                                            |  |        |
| 0時55分 | ④ | 生理食塩液 50mL                            |                                            |  |        |
|       |   | 5 分で点滴静注                              |                                            |  |        |
| 1時00分 | ⑤ | 5 % ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン             |                                            |  | 0mg    |
|       |   | 60 分で点滴静注                             |                                            |  | 0.00mL |
| 2時00分 | ⑥ | 生理食塩液 50mL                            |                                            |  |        |
|       |   | フラッシュ                                 |                                            |  |        |

| Day2～3； |   | 1月2日(日)                                            | ～                            | 1月3日(月) |
|---------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|---------|
| 起床後     |   | 内服                                                 | アブレピタントカプセル 80mg 1 × (2) 起床後 |         |
| 0時25分   | ① | 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1A + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注 |                              |         |
| 0時40分   | ② | 生理食塩液 50mL<br>5 分で点滴静注                             |                              |         |
| 0時45分   | ③ | 生理食塩液 50mL + カルセド 0mg<br>全開 (10分以内) で点滴静注          |                              |         |
| 0時55分   | ④ | 生理食塩液 250mL<br>30 分で点滴静注                           |                              |         |

REFERENCE  
Inoue A, Sugawara S, Harada M, et al : Phase II study of amrubicin combined with carboplatin for thymic carcinoma and invasive thymoma. J Thorac Oncol. 2014;9:1805-1809.  
迅速審査承認：2024年3月14日

対象： 非小細胞肺癌 （進行・再発） 1st Line  
レジメン名： **weeklyCBDCA+PTX療法+RT**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |            |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|------------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    | アルコールアレルギー |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |            |

※必ず無しを確認

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 4 2 日間（続いてDurvalumab維持療法を行う場合は3 6 日間） |
| 使用基準：     | 開始時；class A 2回目以降；class C                   |

《 注 意 》  
適正使用ガイドに準じる。

《 使 用 薬 剤 》  
カルボプラチン（CBDCA）：（カルボプラチン） 150mg/15mL/V、450mg/45mL/V  
パクリタキセル（PTX）：（パクリタキセル） 30mg/5mL/V、100mg/16.7mL/V

|             |       |                                              |       |         |                 |
|-------------|-------|----------------------------------------------|-------|---------|-----------------|
| Cre値（mg/dl） |       | Calvertの計算式：投与量(mg/body) = 目標AUC値 × (GFR+25) |       |         |                 |
| 目標AUC       | 2     | GFRはCcrを代用して計算。                              |       |         |                 |
| 薬 剤 名       | 標準投与量 |                                              | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日             |
| パクリタキセル     | 40    | mg/m <sup>2</sup>                            | #REF! |         | 1,8,15,22,29,36 |
| カルボプラチン     | 2     | AUC                                          | #REF! |         | 1,8,15,22,29,36 |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|               |          |                                                   |                                                                              |
|---------------|----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Day1,8,15 ;   | 1月1日(月)  | 1月8日(月)                                           | 1月15日(月)                                                                     |
| Day22,29,36 ; | 1月22日(月) | 1月29日(月)                                          | 2月5日(月)                                                                      |
| 0時00分         | 内服       | レスタミンコーワ錠(10mg) 5錠 ①の点滴直前に内服                      |                                                                              |
| 0時00分         | ①        | 生理食塩液 50mL + ファモチジン 1A + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注 |                                                                              |
| 0時15分         | ②        | 生理食塩液 100mL + グラニセトロン 1A<br>30 分で点滴静注             |                                                                              |
| 0時45分         | ③        | 生理食塩液 250mL +                                     | パクリタキセル 0mg 0.00mL<br>60 分で点滴静注<br><u>0.2μm or 0.22μmのフィルター一体型輸液セットを使用する</u> |
| 1時45分         | ④        | 5 %ブドウ糖液 250mL +                                  | カルボプラチン 0mg 0.00mL<br>60 分で点滴静注                                              |
| 2時45分         | ⑤        | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                               |                                                                              |

REFERENCE

Nobuyuki Yamamoto, Kazuhiko Nakagawa, Yasumasa Nishimura, et al. Phase 3 study comparing Second- and Third-Generation Regimens With Concurrent Thoracic Radiotherapy in Patients With Unresectable Stage 3 Non-Small-Cell Lung Cancer: West Japan Thracic Oncology Group WJTOG0105

迅速審査承認：2024年6月5日

2024年度6月度化学療法プロトコール審査委員会承認：2024年6月10日

対象： EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌（進行・再発）1st line  
レジメン名： **Osimertinib+CDDP+PEM療法(short hydration)**

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間                                |
| 目標コース：    | <b>4 コース施行後、維持療法を行う（Osimertinib+PEMを継続）</b> |
| 使用基準：     | class A （扁平上皮癌への使用は避けること。）                  |

《 注 意 》  
適正使用ガイドに準じる。  
指示 1： 体重測定                      毎日起床時  
注意： Day4以降も水分摂取が少ない場合や尿量が少ない場合には、輸液を考慮すること

《 使用 薬 剤 》  
オシメルチニブ：タグリッソ錠 40mg 80mg  
ペメトレキシド：（ペメトレキシド） 100mg・500mg・800mg/V  
シスプラチン；（C D D P）：シスプラチン注（50mg/100mL/V、10mg/20mL/V）

| 薬 剤 名   | 標準投与量                          | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日  |
|---------|--------------------------------|-------|---------|------|
| タグリッソ   | 80                      mg/日   | 80    |         | 1～21 |
| ペメトレキシド | 500                      mg/m2 | #REF! |         | 1    |
| シスプラチン  | 75                      mg/m2  | #REF! |         | 1    |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》  
※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|              |         |                                                     |             |        |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------|-------------|--------|
| 初回投与 7 日以上前に |         |                                                     |             |        |
|              | 筋注      | メチコパール注500 μ g 2 A 筋注。以後、3 クール（9 週間）毎に 1 回投与。       |             |        |
|              | 内服      | バンピタン末1 g / 日（葉酸 0.5mg/日）毎日内服。                      |             |        |
| Day1；        | 1月1日(土) |                                                     |             |        |
| 0時00分        | ①       | 生理食塩液 500mL + 硫酸Mg補正液 8mL<br>1 時間で点滴静注              |             |        |
| 1時00分        | ②       | ソリタ T 3 号 500mL<br>1 時間で点滴静注                        |             |        |
| 1時55分        | 内服      | アプレビタントカプセル 125mg 1 × (1) シスプラチン開始 1 時間前頃           |             |        |
| 2時00分        | ③       | 生理食塩液 50mL + パロノセトロン 1 V + デキサート 9.9mg<br>15 分で点滴静注 |             |        |
| 2時15分        | ④       | 生理食塩液 100mL +                                       | ペメトレキシド 0mg | 0.00mL |
|              |         | 10 分で点滴静注                                           |             |        |
| 2時25分        | ⑤       | マンニトール 300mL<br>30 分で点滴静注                           |             |        |
| 2時55分        | ⑥       | 生理食塩液 700 mL +                                      | シスプラチン 0mg  | 0.00mL |
|              |         | 90 分で点滴静注                                           |             |        |
| 4時25分        | ⑦       | 生理食塩液 500mL<br>1 時間で点滴静注                            |             |        |
| 5時25分        | ⑧       | ソリタ T 3 号 500mL<br>1 時間で点滴静注                        |             |        |

|         |         |                                                 |          |
|---------|---------|-------------------------------------------------|----------|
| Day2～3； | 1月2日(日) | ～                                               | 1月3日(月)  |
| 起床後     | 内服      | アプレビタントカプセル 80mg 1 × (2) 起床後                    |          |
| 2時00分   | ①       | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注           |          |
| 2時15分   | ③       | ソリタ T 3 号 500mL × 3<br>4.5 時間 (1.5時間 × 3) で点滴静注 |          |
| 連日；     | 1月1日(土) | ～                                               | 1月21日(金) |
|         | 内服      | タグリッソ錠 0mg                                      | 1日1回     |

REFERENCE  
David Planchard, Pasi A. Janne, Ying Cheng, et al. Osimertinib with or without Chemotherapy in EGFR-Mutated Advanced NSCLC. NEJM Med 2023; 389: 1935-1948.  
2024年7月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2024年7月8日

対象： EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌（進行・再発）1st line  
レジメン名： **Osimertinib+CBDCA+PEM療法**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1コース 21日間                                  |
| 目標コース：    | <b>4コース施行後、維持療法を行う（Osimertinib+PEMを継続）</b> |
| 使用基準：     | class A （扁平上皮癌への使用は避けること。）                 |

《 注 意 》  
適正使用ガイドに準じる。

《 使用薬剤 》  
オシメルチニブ：タグリッソ錠 40mg 80mg  
カルボプラチン（CBDCA）：（カルボプラチン） 150mg/V、450mg/V  
ペメトレキセド（PEM）：（ペメトレキセド） 100mg・500mg・800mg/V

|             |           |                                                                 |         |      |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------|------|
| 《 投 与 量 》   |           |                                                                 |         |      |
| Cre値（mg/dl） |           | Calvertの計算式：投与量(mg/body) = 目標AUC値 × (GFR+25)<br>GFRはCcrを代用して計算。 |         |      |
| 目標AUC       | 5         |                                                                 |         |      |
| 薬 剤 名       | 標準投与量     | 計算値                                                             | 投与量(mg) | 投与日  |
| タグリッソ       | 80 mg/日   | 80                                                              |         | 1～21 |
| カルボプラチン     | 5 AUC     | #REF!                                                           |         | 1    |
| ペメトレキセド     | 500 mg/m2 | #REF!                                                           |         | 1    |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》  
※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|          |   |              |                                                    |          |                     |
|----------|---|--------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------|
|          |   | 初回投与 7 日以上前に |                                                    |          |                     |
|          |   | 筋注           | メチコパール注500μ g 2 A 筋注。以後、3 クール（9 週間）毎に 1 回投与。       |          |                     |
|          |   | 内服           | パンピタン末1 g /日（葉酸 0.5mg/日）毎日内服。                      |          |                     |
| Day1 ；   |   | 1月1日(土)      |                                                    |          |                     |
| 0時00分    |   | 内服           | アプレピタントカプセル 125mg 1 ×（1）カルボプラチン開始 1 時間前頃           |          |                     |
| 0時35分    | ① |              | 生理食塩液 50mL + パロノセトロン 1V + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注 |          |                     |
| 0時50分    | ② |              | 生理食塩液 100mL + ペメトレキセド                              | 0mg      | 0.00mL<br>10 分で点滴静注 |
| 1時00分    | ③ |              | 5 %ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン                           | 0mg      | 0.00mL<br>60 分で点滴静注 |
| 2時00分    | ④ |              | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                |          |                     |
|          |   |              |                                                    |          |                     |
| Day2～3 ； |   | 1月2日(日)      | ～                                                  | 1月3日(月)  |                     |
| 起床後      |   | 内服           | アプレピタントカプセル 80mg 1 ×（2）起床後                         |          |                     |
|          |   |              |                                                    |          |                     |
| 連日 ；     |   | 1月1日(土)      | ～                                                  | 1月21日(金) |                     |
|          |   | 内服           | タグリッソ錠                                             | 0mg      | 1日1回                |

REFERENCE  
David Planchard, Pasi A. Janne, Ying Cheng, et al. Osimertinib with or without Chemotherapy in EGFR-Mutated Advanced NSCLC. NEJM Med 2023; 389: 1935-1948.  
2024年7月度化学療法プロトコール審査委員会承認：2024年7月8日

対象： EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌（進行・再発）  
レジメン名： **Osimertinib+PEM維持療法**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間               |
| 使用基準：     | class A （扁平上皮癌への使用は避けること。） |

《 注 意 》  
適正使用ガイドに準じる。

**Osimertinib+CDDP+PEM療法又は、Osimertinib+CBDCA+PEM療法後のメンテナンスとして使用すること。**

《 使用 薬 剤 》  
オシメルチニブ：タグリッソ錠 40mg 80mg  
ペメトレキセド（PEM）：（ペメトレキセド） 100mg・500mg・800mg／V

| 薬 剤 名   | 標準投与量     | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日  |
|---------|-----------|-------|---------|------|
| タグリッソ   | 80 mg/日   | 80    |         | 1～21 |
| ペメトレキセド | 500 mg/m2 | #REF! |         | 1    |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》  
**※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。**

|              |         |                                                    |                                                 |        |
|--------------|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| 初回投与 7 日以上前に |         |                                                    |                                                 |        |
|              |         | 筋注                                                 | メチコバル注500 μ g 2 A 筋注。以後、 3 クール（ 9 週間） 毎に 1 回投与。 |        |
|              |         | 内服                                                 | パンビタン末1 g /日（葉酸 0.5mg/日） 毎日内服。                  |        |
| Day1 ；       | 1月1日(土) |                                                    |                                                 |        |
| 0時00分        | ①       | 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1A + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注 |                                                 |        |
| 0時15分        | ②       | 生理食塩液 100mL + ペメトレキセド                              | 0mg                                             | 0.00mL |
|              |         | 10 分で点滴静注                                          |                                                 |        |
| 0時25分        | ③       | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                |                                                 |        |

|     |           |            |          |
|-----|-----------|------------|----------|
| 連日； | 1月1日(土)   | ～          | 1月21日(金) |
|     | <b>内服</b> | タグリッソ錠 0mg | 1日1回     |

レジメン名: **Ami+CBDCA+PEM療法(1コース目)(80kg未満)**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|        |       |
|--------|-------|
| 患者ID : | #REF! |
| 患者氏名 : | #REF! |

| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 投与スケジュール: | 1コース 21日間                                           |
| 目標コース:    | 4コース施行後、Amivantamab+Pemetrexed療法を投与                 |
| 使用基準:     | class A                                             |
| コンパニオン:   | EGFR遺伝子エクソン20挿入変異; 1st line～、EGFR遺伝子変異陽性; 2nd line～ |

適正使用ガイドに準じる。

重度のInfusion reaction（アライキ様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

ペメトレキセド (PEM) : (ペメトレキセド) 100mg・500mg・800mg/V

| 投 与 量        |                       | Calvertの計算式：投与量(mg/body)＝目標AUC値×(GFR÷25) |         |      |
|--------------|-----------------------|------------------------------------------|---------|------|
| Cre値 (mg/dl) |                       | GFRはCreを代入して計算。                          |         |      |
| 目標AUC        | 5                     |                                          |         |      |
| 薬 剤 名        | 標準投与量                 | 計算値                                      | 投与量(mg) | 投与日  |
| ライブリバント      | 350 mg/body           | 350                                      | 350     | 1    |
| ライブリバント      | 1050 mg/body          | 1050                                     | 1050    | 2    |
| ライブリバント      | 1400 mg/body          | 1400                                     | 1400    | 8.15 |
| カルボプラチン      | 5 AUC                 | #REF!                                    | 5       | 1    |
| ペトレキセド       | 500 mg/m <sup>2</sup> | #REF!                                    | 500     | 1    |

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 内服 | バンピタン末1g/日（葉酸 0.5mg/日）毎日内服。 |
|----|-----------------------------|

分 ④ 生理食塩液 50mL

1000

④ 生理食塩液 50mL

分 ④ 生理食塩液 50mL

ed NSCLC after disease progression on osimertinib: primary results from the phase III MARIPOSA-2

2024年12月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2024年12月3日 更新：2025年6月9日

対象： 非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）（進行・再発） 1st Line、2nd Line  
レジメン名： **Ami+CBDCA+PEM療法(2コース目)(80kg未満)**

|            |                                                   |                       |       |       |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|
|            | コース目                                              |                       |       |       |
| 患者 I D :   | #REF!                                             |                       |       |       |
| 患者氏名 :     | #REF!                                             |                       |       |       |
| 身長(cm)     | 体重(kg)                                            | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!      | #REF!                                             | #REF!                 | #REF! | #REF! |
| 投与スケジュール : | 1 コース    2 1 日間                                   |                       |       |       |
| 目標コース :    | 4コース施行後、Amivantamab+Pemetrexed療法を投与               |                       |       |       |
| 使用基準 :     | class A                                           |                       |       |       |
| コンパニオン :   | EGFR遺伝子エクソン20挿入変異；1st line～、EGFR遺伝子変異陽性；2nd line～ |                       |       |       |

《 注 意 》

対象：EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（1st line～）  
対象：EGFR-TKI治療歴のあるEGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（2nd line～）  
適正使用ガイドに準じる。

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)  
重度のInfusion reaction（アライキシ-様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

《 使 用 薬 剤 》

アミバンタマブ：（ライブリバント） 350mg/V  
カルボプラチン（CBDCA）：（カルボプラチン） 150mg/V、450mg/V  
ペメトレキシド（PEM）：（ペメトレキシド） 100mg・500mg・800mg/V

《 投 与 量 》

|              |       |                                              |       |         |     |
|--------------|-------|----------------------------------------------|-------|---------|-----|
| Cre値 (mg/dl) |       | Calvertの計算式：投与量(mg/body) = 目標AUC値 × (GFR+25) |       |         |     |
| 目標AUC        | 5     | GFRはCcrを代用して計算。                              |       |         |     |
| 薬 剤 名        | 標準投与量 |                                              | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
| ライブリバント      | 1400  | mg/body                                      | 1400  | 1400    | 1   |
| カルボプラチン      | 5     | AUC                                          | #REF! | 5       | 1   |
| ペメトレキシド      | 500   | mg/m2                                        | #REF! | 500     | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|              |         |                                                    |         |                                                                                                 |
|--------------|---------|----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 初回投与 7 日以上前に |         |                                                    |         |                                                                                                 |
|              | 筋注      | メチコパール注500 $\mu$ g 2 A 筋注。以後、3クール（9週間）毎に1回投与。      |         |                                                                                                 |
|              | 内服      | バンビタン末1 g / 日（葉酸 0.5mg/日）毎日内服。                     |         |                                                                                                 |
| Day1 ;       | 1月1日(土) |                                                    |         |                                                                                                 |
| 0時00分        | 内服      | アブレピタントカプセル 125mg 1 $\times$ (1) カルボプラチン開始 1 時間前頃  |         |                                                                                                 |
| 0時00分        | 内服      | カロナール 200mg 4 錠                                    |         |                                                                                                 |
| 0時00分        | 内服      | レスタミンコーワ錠(10mg) 5 錠                                |         |                                                                                                 |
| 0時35分        | ①       | 生理食塩液 50mL + パロノセトロン 1V + デキサート 9.9mg<br>15 分で点滴静注 |         |                                                                                                 |
| 0時50分        | ②       | 生理食塩液 100mL + ペメトレキシド                              | 500mg   | 20.00mL<br>10 分で点滴静注                                                                            |
| 1時00分        | ③       | 5 %ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン                           | 5mg     | 0.50mL<br>60 分で点滴静注                                                                             |
| 2時00分        | ④       | 生理食塩液 250mL + ライブリバント                              | 1400mg  | 28.00mL<br><u>0.2 <math>\mu</math>m or 0.22 <math>\mu</math>mのフィルター型輸液セットを使用する</u><br>2 時間で点滴静注 |
| 4時00分        | ⑤       | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                |         |                                                                                                 |
| <hr/>        |         |                                                    |         |                                                                                                 |
| Day2～3 ;     | 1月2日(日) | ～                                                  | 1月3日(月) |                                                                                                 |
| 起床後          | 内服      | アブレピタントカプセル 80mg 1 $\times$ (2) 起床後                |         |                                                                                                 |

REFERENCE

C. Zhou et al. Amivantamab plus Chemotherapy in NSCLC with EGFR Exon 20 Insertions.NEJM Med 2023; 389: 2039-51  
A.Passaro, J.Wang, Y.Wang, et al. Amivantamab plus chemotherapy with and without lazertinib in EGFRmutant advanced NSCLC after disease progression on osimertinib: primary results from the phase III MARIPOSA-2 study5. Ann Oncol. 2024 Jan;35(1):77-90.

2024年12月度化学療法プロトコール審査委員会承認：2024年12月3日 更新：2025年6月9日

対象： 非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）（進行・再発） 1st Line、2nd Line  
レジメン名： **Ami+CBDCA+PEM療法(3-4コース目)(80kg未満)**

|            |                                                   |                       |       |       |      |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|------|
|            |                                                   |                       |       |       | コース目 |
| 患者 I D :   | #REF!                                             |                       |       |       |      |
| 患者氏名 :     | #REF!                                             |                       |       |       |      |
| 身長(cm)     | 体重(kg)                                            | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |      |
| #REF!      | #REF!                                             | #REF!                 | #REF! | #REF! |      |
| 投与スケジュール : | 1 コース    2 1 日間                                   |                       |       |       |      |
| 目標コース :    | 4コース施行後、Amivantamab+Pemetrexed療法を投与               |                       |       |       |      |
| 使用基準 :     | class A                                           |                       |       |       |      |
| コンパニオン :   | EGFR遺伝子エクソン20挿入変異；1st line～、EGFR遺伝子変異陽性；2nd line～ |                       |       |       |      |

《 注 意 》

対象：EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（1st line～）  
対象：EGFR-TKI治療歴のあるEGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（2nd line～）  
適正使用ガイドに準じる。

※ **Infusion reaction** に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)  
重度のInfusion reaction（アライキシ-様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

《 使 用 薬 剤 》

アミバンタマブ：（ライブリバント） 350mg/V  
カルボプラチン（CBDCA）：（カルボプラチン） 150mg/V、450mg/V  
ペメトレキシド（PEM）：（ペメトレキシド） 100mg・500mg・800mg/V

《 投 与 量 》

|              |       |                                              |       |         |     |
|--------------|-------|----------------------------------------------|-------|---------|-----|
| Cre値 (mg/dl) |       | Calvertの計算式：投与量(mg/body) = 目標AUC値 × (GFR+25) |       |         |     |
| 目標AUC        | 5     | GFRはCcrを代用して計算。                              |       |         |     |
| 薬 剤 名        | 標準投与量 |                                              | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
| ライブリバント      | 1750  | mg/body                                      | 1750  | 1750    | 1   |
| カルボプラチン      | 5     | AUC                                          | #REF! | 5       | 1   |
| ペメトレキシド      | 500   | mg/m2                                        | #REF! | 500     | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|              |         |                                                           |         |         |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
| 初回投与 7 日以上前に |         |                                                           |         |         |
|              | 筋注      | メチコパール注500 μ g 2 A 筋注。以後、 3 クール（ 9 週間） 毎に 1 回投与。          |         |         |
|              | 内服      | バンピタン末1 g / 日（葉酸 0.5mg/日） 毎日内服。                           |         |         |
| Day1 ；       | 1月1日(土) |                                                           |         |         |
| 0時00分        | 内服      | アブレピタントカプセル 125mg 1 ×（1） カルボプラチン開始 1 時間前頃                 |         |         |
| 0時00分        | 内服      | カロナール 200mg 4 錠                                           |         |         |
| 0時00分        | 内服      | レスタミンコーワ錠(10mg) 5 錠                                       |         |         |
| 0時35分        | ①       | 生理食塩液 50mL + パロノセトロン 1V + デキサート 9.9mg<br>15 分で点滴静注        |         |         |
| 0時50分        | ②       | 生理食塩液 100mL + ペメトレキシド                                     | 500mg   | 20.00mL |
|              |         | 10 分で点滴静注                                                 |         |         |
| 1時00分        | ③       | 5 %ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン                                  | 5mg     | 0.50mL  |
|              |         | 60 分で点滴静注                                                 |         |         |
| 2時00分        | ④       | 生理食塩液 250mL + ライブリバント                                     | 1750mg  | 35.00mL |
|              |         | <u>0.2 μ m or 0.22 μ m のフィルター型輸液セットを使用する</u><br>2 時間で点滴静注 |         |         |
| 4時00分        | ⑤       | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                       |         |         |
|              |         |                                                           |         |         |
| Day2～3 ；     | 1月2日(日) | ～                                                         | 1月3日(月) |         |
| 起床後          | 内服      | アブレピタントカプセル 80mg 1 ×（2） 起床後                               |         |         |

REFERENCE

C. Zhou et al. Amivantamab plus Chemotherapy in NSCLC with EGFR Exon 20 Insertions.NEJM Med 2023; 389: 2039-51  
A.Passaro, J.Wang, Y.Wang, et al. Amivantamab plus chemotherapy with and without lazertinib in EGFRmutant advanced NSCLC after disease progression on osimertinib: primary results from the phase III MARIPOSA-2 study5. Ann Oncol. 2024 Jan;35(1):77-90.

2024年12月度化学療法プロトコール審査委員会承認：2024年12月3日 更新：2025年6月9日

対象： 非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）（進行・再発） 1st Line、2nd Line  
レジメン名： **Ami+PEM維持療法(80kg未満)**

|                                                           |        |                       |       |       |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|
|                                                           |        | コース目                  |       |       |
| 患者 I D :                                                  | #REF!  |                       |       |       |
| 患者氏名 :                                                    | #REF!  |                       |       |       |
| 身長(cm)                                                    | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!                                                     | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |
| 投与スケジュール： 1 コース 2 1 日間                                    |        |                       |       |       |
| 使用基準： class A                                             |        |                       |       |       |
| コンパニオン： EGFR遺伝子エクソン20挿入変異；1st line～、EGFR遺伝子変異陽性；2nd line～ |        |                       |       |       |

《 注 意 》

対象：EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（1st line～）  
対象：EGFR-TKI治療歴のあるEGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（2nd line～）  
適正使用ガイドに準じる。

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)  
重度のInfusion reaction（アフィキシー様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

《 使用薬剤 》

アミバンタマブ：（ライブリバント） 350mg／V  
ペメトレキシド（PEM）：（ペメトレキシド） 100mg・500mg・800mg／V

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名   | 標準投与量        | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|---------|--------------|-------|---------|-----|
| ライブリバント | 1750 mg/body | 1750  | 1750    | 1   |
| ペメトレキシド | 500 mg/m2    | #REF! | 500     | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|              |         |                                                                                                  |                     |  |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| 初回投与 7 日以上前に |         |                                                                                                  |                     |  |
| Day1 ;       | 筋注      | メチコパール注500μ g 2 A 筋注。以後、 3 クール（ 9 週間） 毎に 1 回投与。                                                  |                     |  |
|              | 内服      | バンピタン末1 g /日（葉酸 0.5mg/日） 毎日内服。                                                                   |                     |  |
|              | 1月1日(土) |                                                                                                  |                     |  |
|              | 0時00分   | 内服                                                                                               | カロナール 200mg 4 錠     |  |
|              | 0時00分   | 内服                                                                                               | レスタミンコーワ錠(10mg) 5 錠 |  |
| 0時00分        | ①       | 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1A + デキサート 9.9mg<br>15 分で点滴静注                                               |                     |  |
| 0時15分        | ②       | 生理食塩液 100mL + ペメトレキシド 500mg 20.00mL<br>10 分で点滴静注                                                 |                     |  |
| 0時25分        | ③       | 生理食塩液 250mL + ライブリバント 1750mg 35.00mL<br><u>0.2μ m or 0.22μ mのフィルター一体型輸液セットを使用する</u><br>2 時間で点滴静注 |                     |  |
| 2時25分        | ④       | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                              |                     |  |

REFERENCE

C. Zhou et al. Amivantamab plus Chemotherapy in NSCLC with EGFR Exon 20 Insertions.NEJM Med 2023; 389: 2039-51  
A.Passaro, J.Wang, Y.Wang, et al. Amivantamab plus chemotherapy with and without lazertinib in EGFRmutant advanced NSCLC after disease progression on osimertinib: primary results from the phase III MARIPOSA-2 study5. Ann Oncol. 2024 Jan;35(1):77-90.

レジメン名: **Ami+CBDCA+PEM療法(1コース目)(80kg以上)**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|        |       |
|--------|-------|
| 患者ID : | #REF! |
| 患者氏名 : | #REF! |

| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 投与スケジュール: | 1コース 21日間                                           |
| 目標コース:    | 4コース施行後、Amivantamab+Pemetrexed療法を投与                 |
| 使用基準:     | class A                                             |
| コンパニオン:   | EGFR遺伝子エクソン20挿入変異: 1st line～、EGFR遺伝子変異陽性: 2nd line～ |

適正使用ガイドに準じる。

重度のInfusion reaction（アブライシキニ様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

ペメトレキセド (PEM) : (ペメトレキセド) 100mg・500mg・800mg/V

| 投 与 量        |              | Calvertの計算式：投与量(mg/body)＝目標AUC値×(GFR+25)<br>GFRはCcrを代用して計算。 |         |      |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------|---------|------|
| Ccr値 (mg/dl) |              |                                                             |         |      |
| 目標AUC        | 5            |                                                             |         |      |
| 薬 剤 名        | 標準投与量        | 計算値                                                         | 投与量(mg) | 投与日  |
| ライブリバント      | 350 mg/body  | 350                                                         | 350     | 1    |
| ライブリバント      | 1400 mg/body | 1400                                                        | 1400    | 2    |
| ライブリバント      | 1750 mg/body | 1750                                                        | 1750    | 8,15 |
| カルボプラチン      | 5 AUC        | #REF!                                                       | 5       | 1    |
| ペメトレキセド      | 500 mg/m2    | #REF!                                                       | 500     | 1    |

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 内服 | バンピタン末1g/日（葉酸 0.5mg/日）毎日内服。 |
|----|-----------------------------|

分 ④ 生理食鹽液 50mL

**Figure 1**

フミシロ

生理血液流 50 ml

study5. Ann Oncol. 2024 Jan;35(1):77-90.

2024年12月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2024年12月3日 更新：2025年6月9日

対象： 非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）（進行・再発） 1st Line、2nd Line  
レジメン名： **Ami+CBDCA+PEM療法(2コース目)(80kg以上)**

|            |                                                   |                       |       |       |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|
|            | コース目                                              |                       |       |       |
| 患者 I D :   | #REF!                                             |                       |       |       |
| 患者氏名 :     | #REF!                                             |                       |       |       |
| 身長(cm)     | 体重(kg)                                            | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!      | #REF!                                             | #REF!                 | #REF! | #REF! |
| 投与スケジュール : | 1 コース    2 1 日間                                   |                       |       |       |
| 目標コース :    | 4コース施行後、Amivantamab+Pemetrexed療法を投与               |                       |       |       |
| 使用基準 :     | class A                                           |                       |       |       |
| コンパニオン :   | EGFR遺伝子エクソン20挿入変異；1st line～、EGFR遺伝子変異陽性；2nd line～ |                       |       |       |

《 注 意 》

対象：EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（1st line～）  
対象：EGFR-TKI治療歴のあるEGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（2nd line～）  
適正使用ガイドに準じる。

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)  
重度のInfusion reaction（アライキシ-様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

《 使 用 薬 剤 》

アミバンタマブ：（ライブリバント） 350mg/V  
カルボプラチン（CBDCA）：（カルボプラチン） 150mg/V、450mg/V  
ペメトレキシド（PEM）：（ペメトレキシド） 100mg・500mg・800mg/V

《 投 与 量 》

|              |       |                                              |       |         |     |
|--------------|-------|----------------------------------------------|-------|---------|-----|
| Cre値 (mg/dl) |       | Calvertの計算式：投与量(mg/body) = 目標AUC値 × (GFR+25) |       |         |     |
| 目標AUC        | 5     | GFRはCcrを代用して計算。                              |       |         |     |
| 薬 剤 名        | 標準投与量 |                                              | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
| ライブリバント      | 1750  | mg/body                                      | 1750  | 1750    | 1   |
| カルボプラチン      | 5     | AUC                                          | #REF! | 5       | 1   |
| ペメトレキシド      | 500   | mg/m2                                        | #REF! | 500     | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|              |         |                                                                                         |                                                   |         |  |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|--|
| 初回投与 7 日以上前に |         |                                                                                         |                                                   |         |  |
|              |         | 筋注                                                                                      | メチコパール注500 $\mu$ g 2 A 筋注。以後、3 クール（9 週間）毎に 1 回投与。 |         |  |
|              |         | 内服                                                                                      | バンピタン末1 g / 日（葉酸 0.5mg/日）毎日内服。                    |         |  |
| Day1 ；       | 1月1日(土) |                                                                                         |                                                   |         |  |
| 0時00分        | 内服      | アブレピタントカプセル 125mg 1 ×（1）カルボプラチン開始 1 時間前頃                                                |                                                   |         |  |
| 0時00分        | 内服      | カロナール 200mg 4 錠                                                                         |                                                   |         |  |
| 0時00分        | 内服      | レスタミンコーワ錠(10mg) 5 錠                                                                     |                                                   |         |  |
| 0時35分        | ①       | 生理食塩液 50mL + パロノセトロン 1V + デキサート 9.9mg<br>15 分で点滴静注                                      |                                                   |         |  |
| 0時50分        | ②       | 生理食塩液 100mL + ペメトレキシド                                                                   | 500mg                                             | 20.00mL |  |
|              |         | 10 分で点滴静注                                                                               |                                                   |         |  |
| 1時00分        | ③       | 5 %ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン                                                                | 5mg                                               | 0.50mL  |  |
|              |         | 60 分で点滴静注                                                                               |                                                   |         |  |
| 2時00分        | ④       | 生理食塩液 250mL + ライブリバント                                                                   | 1750mg                                            | 35.00mL |  |
|              |         | <u>0.2 <math>\mu</math> m or 0.22 <math>\mu</math> m のフィルター型輸液セットを使用する</u><br>2 時間で点滴静注 |                                                   |         |  |
| 4時00分        | ⑤       | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                     |                                                   |         |  |
| <hr/>        |         |                                                                                         |                                                   |         |  |
| Day2～3 ；     |         | 1月2日(日)                                                                                 | ～                                                 | 1月3日(月) |  |
| 起床後          | 内服      | アブレピタントカプセル 80mg 1 ×（2）起床後                                                              |                                                   |         |  |

REFERENCE

C. Zhou et al. Amivantamab plus Chemotherapy in NSCLC with EGFR Exon 20 Insertions.NEJM Med 2023; 389: 2039-51  
A.Passaro, J.Wang, Y.Wang, et al. Amivantamab plus chemotherapy with and without lazertinib in EGFRmutant advanced NSCLC after disease progression on osimertinib: primary results from the phase III MARIPOSA-2 study5. Ann Oncol. 2024 Jan;35(1):77-90.

2024年12月度化学療法プロトコール審査委員会承認：2024年12月3日 更新：2025年6月9日

対象： 非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）（進行・再発） 1st Line、2nd Line  
レジメン名： **Ami+CBDCA+PEM療法(3-4コース目)(80kg以上)**

|            |                                                   |                       |       |       |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|
|            | コース目                                              |                       |       |       |
| 患者 I D :   | #REF!                                             |                       |       |       |
| 患者氏名 :     | #REF!                                             |                       |       |       |
| 身長(cm)     | 体重(kg)                                            | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!      | #REF!                                             | #REF!                 | #REF! | #REF! |
| 投与スケジュール : | 1 コース    2 1 日間                                   |                       |       |       |
| 目標コース :    | 4コース施行後、Amivantamab+Pemetrexed療法を投与               |                       |       |       |
| 使用基準 :     | class A                                           |                       |       |       |
| コンパニオン :   | EGFR遺伝子エクソン20挿入変異；1st line～、EGFR遺伝子変異陽性；2nd line～ |                       |       |       |

《 注 意 》

対象：EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（1st line～）  
対象：EGFR-TKI治療歴のあるEGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（2nd line～）  
適正使用ガイドに準じる。

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)  
重度のInfusion reaction（アライキシ-様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

《 使 用 薬 剤 》

アミバンタマブ：（ライブリバント） 350mg/V  
カルボプラチン（CBDCA）：（カルボプラチン） 150mg/V、450mg/V  
ペメトレキシド（PEM）：（ペメトレキシド） 100mg・500mg・800mg/V

《 投 与 量 》

|              |       |                                              |       |         |     |
|--------------|-------|----------------------------------------------|-------|---------|-----|
| Cre値 (mg/dl) |       | Calvertの計算式：投与量(mg/body) = 目標AUC値 × (GFR+25) |       |         |     |
| 目標AUC        | 5     | GFRはCcrを代用して計算。                              |       |         |     |
| 薬 剤 名        | 標準投与量 |                                              | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
| ライブリバント      | 2100  | mg/body                                      | 2100  | 2100    | 1   |
| カルボプラチン      | 5     | AUC                                          | #REF! | 5       | 1   |
| ペメトレキシド      | 500   | mg/m2                                        | #REF! | 500     | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|              |         |                                                           |         |         |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
| 初回投与 7 日以上前に |         |                                                           |         |         |
|              | 筋注      | メチコパール注500 μ g 2 A 筋注。以後、 3 クール（ 9 週間） 毎に 1 回投与。          |         |         |
|              | 内服      | バンピタン末1 g / 日（葉酸 0.5mg/日） 毎日内服。                           |         |         |
| Day1 ；       | 1月1日(土) |                                                           |         |         |
| 0時00分        | 内服      | アブレピタントカプセル 125mg 1 ×（ 1 ） カルボプラチン開始 1 時間前頃               |         |         |
| 0時00分        | 内服      | カロナール 200mg 4 錠                                           |         |         |
| 0時00分        | 内服      | レスタミンコーワ錠(10mg) 5 錠                                       |         |         |
| 0時35分        | ①       | 生理食塩液 50mL + パロノセトロン 1V + デキサート 9.9mg<br>15 分で点滴静注        |         |         |
| 0時50分        | ②       | 生理食塩液 100mL + ペメトレキシド                                     | 500mg   | 20.00mL |
|              |         | 10 分で点滴静注                                                 |         |         |
| 1時00分        | ③       | 5 %ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン                                  | 5mg     | 0.50mL  |
|              |         | 60 分で点滴静注                                                 |         |         |
| 2時00分        | ④       | 生理食塩液 250mL + ライブリバント                                     | 2100mg  | 42.00mL |
|              |         | <u>0.2 μ m or 0.22 μ m のフィルター型輸液セットを使用する</u><br>2 時間で点滴静注 |         |         |
| 4時00分        | ⑤       | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                       |         |         |
|              |         |                                                           |         |         |
| Day2～3 ；     | 1月2日(日) | ～                                                         | 1月3日(月) |         |
| 起床後          | 内服      | アブレピタントカプセル 80mg 1 ×（ 2 ） 起床後                             |         |         |

REFERENCE

C. Zhou et al. Amivantamab plus Chemotherapy in NSCLC with EGFR Exon 20 Insertions.NEJM Med 2023; 389: 2039-51  
A.Passaro, J.Wang, Y.Wang, et al. Amivantamab plus chemotherapy with and without lazertinib in EGFRmutant advanced NSCLC after disease progression on osimertinib: primary results from the phase III MARIPOSA-2 study5. Ann Oncol. 2024 Jan;35(1):77-90.

2024年12月度化学療法プロトコール審査委員会承認：2024年12月3日 更新：2025年6月9日

対象： 非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）（進行・再発） 1st Line、2nd Line  
レジメン名： **Ami+PEM維持療法(80kg以上)**

|           |                                                     |                       |       |       |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|
|           | コース目                                                |                       |       |       |
| 患者 I D :  | #REF!                                               |                       |       |       |
| 患者氏名 :    | #REF!                                               |                       |       |       |
| 身長(cm)    | 体重(kg)                                              | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!     | #REF!                                               | #REF!                 | #REF! | #REF! |
| 投与スケジュール: | 1 コース 2 1 日間                                        |                       |       |       |
| 使用基準:     | class A                                             |                       |       |       |
| コンパニオン:   | EGFR遺伝子エクソン20挿入変異; 1st line～、EGFR遺伝子変異陽性; 2nd line～ |                       |       |       |

《 注 意 》

対象：EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（1st line～）  
対象：EGFR-TKI治療歴のあるEGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（2nd line～）  
適正使用ガイドに準じる。

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)  
重度のInfusion reaction（アフィキシー様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

《 使用薬剤 》

アミバンタマブ：（ライブリバント） 350mg／V  
ペメトレキシド（PEM）：（ペメトレキシド） 100mg・500mg・800mg／V

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名   | 標準投与量        | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|---------|--------------|-------|---------|-----|
| ライブリバント | 2100 mg/body | 2100  | 2100    | 1   |
| ペメトレキシド | 500 mg/m2    | #REF! | 500     | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|              |         |                                                                                           |                     |  |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| 初回投与 7 日以上前に |         |                                                                                           |                     |  |
| Day1 ;       | 筋注      | メチコパール注500μ g 2 A 筋注。以後、 3 クール（ 9 週間） 毎に 1 回投与。                                           |                     |  |
|              | 内服      | バンピタン末1 g /日（葉酸 0.5mg/日） 毎日内服。                                                            |                     |  |
|              | 1月1日(土) |                                                                                           |                     |  |
|              | 0時00分   | 内服                                                                                        | カロナール 200mg 4 錠     |  |
|              | 0時00分   | 内服                                                                                        | レスタミンコーワ錠(10mg) 5 錠 |  |
| 0時00分        | ①       | 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1A + デキサート 9.9mg<br>15 分で点滴静注                                        |                     |  |
| 0時15分        | ②       | 生理食塩液 100mL + ペメトレキシド 500mg 20.00mL<br>10 分で点滴静注                                          |                     |  |
| 0時25分        | ③       | 生理食塩液 250mL + ライブリバント 2100mg 42.00mL<br>0.2 μm or 0.22 μmのフィルター一体型輸液セットを使用する<br>2 時間で点滴静注 |                     |  |
| 2時25分        | ④       | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                       |                     |  |

REFERENCE

C. Zhou et al. Amivantamab plus Chemotherapy in NSCLC with EGFR Exon 20 Insertions.NEJM Med 2023; 389: 2039-51  
A.Passaro, J.Wang, Y.Wang, et al. Amivantamab plus chemotherapy with and without lazertinib in EGFRmutant advanced NSCLC after disease progression on osimertinib: primary results from the phase III MARIPOSA-2 study5. Ann Oncol. 2024 Jan;35(1):77-90.

対象： 非小細胞肺癌（ROS1融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発例）

レジメン名： **Repotrectinib療法**

コース目

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 通常、成人にはレポトレクチニブとして1回 160mgを1日1回14日間経口投与する。その後、1回 160mgを1日2回経口投与する。なお患者の状態により適宜増減する。 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|

《 注 意 》

ROS1融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

適正使用ガイドに準じる

※投与開始後14日間において、忍容性が認められない場合には、1日2回投与に増量しない。

|       |            |            |
|-------|------------|------------|
| 減量レベル | 投与量        |            |
| 通常投与量 | 160mg 1日1回 | 160mg 1日2回 |
| 1段階減量 | 120mg 1日1回 | 120mg 1日2回 |
| 2段階減量 | 80mg 1日1回  | 80mg 1日2回  |

《 使用 薬 剤 》

レポトレクチニブ：オータイロカプセル40mg

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名 | 標準投与量 |      | 計算値 | 投与量(mg) | 投与日    |
|-------|-------|------|-----|---------|--------|
| オータイロ | 160   | mg/日 | 160 |         | 1-14   |
| オータイロ | 320   | mg/日 | 320 |         | 15日目以降 |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

|          |    |           |       |           |
|----------|----|-----------|-------|-----------|
| day1-14; | 内服 | オータイロカプセル | 0mg/回 | 1日1回 経口投与 |
| day15以降; | 内服 | オータイロカプセル | 0mg/回 | 1日2回 経口投与 |

REFERENCE

A.Drilon, D.R.Camidge, J.J.Lin, et al. Repotrectinib in ROS1 Fusion-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2024;390:118-31.

2024年12月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2024年12月9日

対象： 非小細胞肺癌（扁平上皮癌）1st line  
レジメン名： **Necitumumab+CDDP+GEM療法(short hydration)**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間                          |
| 目標コース：    | <b>4コース施行後、Necitumumab療法(メナツス)を投与</b> |
| 使用基準：     | class A, Day8：class C                 |

《 注 意 》  
適正使用ガイドに準じる。  
※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)  
重度のInfusion reaction (アレルギー様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等) が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。  
※ 低マグネシウム血症があらわれることがあるので、血清中電解質をモニタリングすること  
指示 1： 体重測定 毎日起床時  
注意： Day4以降も水分摂取が少ない場合や尿量が少ない場合には、輸液を考慮すること

《 使 用 薬 剤 》  
ネシツムマブ：ポートラーザ (800mg/50mL)  
シスプラチン； ( C D D P )：シスプラチン注 (50mg/100mL/V、10mg/20mL/V)  
ゲムシタビン (GEM)：ゲムシタビン点滴静注用 200、1000 mg/V

| 薬 剤 名  | 標準投与量                  | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|--------|------------------------|-------|---------|-----|
| ポートラーザ | 800 mg/body            | 800   |         | 1.8 |
| シスプラチン | 75 mg/m <sup>2</sup>   | #REF! |         | 1   |
| ゲムシタビン | 1250 mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1.8 |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》  
※**記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。**

|         |                   |                                                             |               |  |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--|
| Day1；   | 1月1日(土)           |                                                             |               |  |
| 0時00分   | ①                 | 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                               |               |  |
| 0時05分   | ②                 | 生理食塩液 <b>200mL</b> + <b>ポートラーザ注</b> <b>0mg</b><br>60 分で点滴静注 | <b>0.00mL</b> |  |
| 1時05分   | ③                 | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                         |               |  |
| 1時10分   | ④                 | 生理食塩液 500mL + 硫酸Mg補正液 8mL<br>1 時間で点滴静注                      |               |  |
| 2時10分   | ⑤                 | ソリタ T 3 号 500mL<br>1 時間で点滴静注                                |               |  |
| 3時10分   | ⑥                 | 生理食塩液 50mL + バロノセトロン 1V + デキサート 9.9mg<br>15 分で点滴静注          |               |  |
| 3時25分   |                   | <b>内服</b> アプレビタントカプセル 125mg 1 × (1) シスプラチン開始 1 時間前頃         |               |  |
| 3時25分   | ⑦                 | 生理食塩液 100mL + <b>ゲムシタビン</b> <b>0mg</b><br>30 分で点滴静注         |               |  |
| 3時55分   | ⑧                 | マンニトール 300mL<br>30 分で点滴静注                                   |               |  |
| 4時25分   | ⑨                 | 生理食塩液 <b>700 mL</b> + <b>シスプラチン</b> <b>0mg</b><br>90 分で点滴静注 | <b>0.00mL</b> |  |
| 5時55分   | ⑩                 | 生理食塩液 500mL<br>1 時間で点滴静注                                    |               |  |
| 6時55分   | ⑪                 | ソリタ T 3 号 500mL<br>1 時間で点滴静注                                |               |  |
| Day2～3； | 1月2日(日) ～ 1月3日(月) |                                                             |               |  |
| 起床後     |                   | <b>内服</b> アプレビタントカプセル 80mg 1 × (2) 起床後                      |               |  |
| 3時10分   | ①                 | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注                       |               |  |
| 3時25分   | ②                 | ソリタ T 3 号 500mL × 3<br>4.5 時間 (1.5時間 × 3) で点滴静注             |               |  |
| Day8；   | 1月8日(土)           |                                                             |               |  |
| 0時00分   | ①                 | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注                       |               |  |
| 0時15分   | ②                 | 生理食塩液 <b>200mL</b> + <b>ポートラーザ注</b> <b>0mg</b><br>60 分で点滴静注 | <b>0.00mL</b> |  |
| 1時15分   | ③                 | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                         |               |  |
| 1時20分   | ④                 | 生理食塩液 100mL + <b>ゲムシタビン</b> <b>0mg</b><br>30 分で点滴静注         |               |  |
| 1時50分   | ⑤                 | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                         |               |  |

REFERENCE  
Thatcher N, et al. Necitumumab plus gemcitabine and cisplatin versus gemcitabine and cisplatin alone as first-line therapy in patients with stage IV squamous non-small-cell lung cancer. Lancet Oncol. 2015 ;16(7) :763-774  
S Watanabe, et al. Necitumumab plus gemcitabine and cisplatin versus gemcitabine and cisplatin alone as first-line treatment for stage IV squamous non-small cell lung cancer: A phase 1b and randomized, open-label, multicenter, phase 2 trial in Japan. Lung Cancer. 2019; 129 :55-62  
2025年2月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2025年2月10日

対象： 非小細胞肺癌（扁平上皮癌）1st line

レジメン名： **Necitumumab療法(メンテナンス)**

コース目

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

投与スケジュール： 1 コース 2 1 日間

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

**Necitumumab+CDDP+GEM療法後のメンテナンスとして使用すること。**

※ **Infusion reaction** に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アフィキシ様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 低マグネシウム血症があらわれることがあるので、血清中電解質をモニタリングすること

《 使用 薬 剤 》

ネシツムマブ：ポートラーザ（800mg/50mL）

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名  | 標準投与量       | 計算値 | 投与量(mg) | 投与日 |
|--------|-------------|-----|---------|-----|
| ポートラーザ | 800 mg/body | 800 |         | 1.8 |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|         |         |                                               |
|---------|---------|-----------------------------------------------|
| Day1,8； | 1月1日(土) | 1月8日(土)                                       |
| 0時00分   | ①       | 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                 |
| 0時05分   | ②       | 生理食塩液 200mL + ポートラーザ注 0mg 0.00mL<br>60 分で点滴静注 |
| 1時05分   | ③       | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                           |

## REFERENCE

Thatcher N, et al. Necitumumab plus gemcitabine and cisplatin versus gemcitabine and cisplatin alone as first-line therapy in patients with stage IV squamous non-small-cell lung cancer. Lancet Oncol. 2015 ;16(7) :763-774

S Watanabe, et al. Necitumumab plus gemcitabine and cisplatin versus gemcitabine and cisplatin alone as first-line treatment for stage IV squamous non-small cell lung cancer: A phase 1b and randomized, open-label, multicenter, phase 2 trial in Japan. Lung Cancer. 2019; 129 :55-62

2025年2月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2025年2月10日

対象： 小細胞肺癌 2nd line以降  
レジメン名： **Tarlatamab療法(1コース目)**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |         |
|-----------|---------|
| 投与スケジュール： | 1コース28日 |
|-----------|---------|

《 注 意 》

※ **CRS（サイトカイン放出症候群）**に要注意。  
CRS（発熱、低血圧、低酸素症、悪寒、頻脈、頭痛及び呼吸困難感など）が発現することがある。投与初期に多く認められ、1コース目の各投与は入院管理を検討すること。特に初回と2回目の投与後24時間は必ず入院管理とすること。CRSを認めた場合、解熱剤、デキサメタゾン 10mg/日、トシリズマブ 8mg/kg（800mgを超えないこと）などの投与を検討すること。

※ **ICANS（免疫エフェクター細胞関連神経毒性症候群）**に要注意。  
ICANS（失語症、意識レベルの変化、認知能力の障害、筋力低下、痙攣発作、脳浮腫など）が発現することがある。異常が認められた場合には、デキサメタゾン 10mg/回などの投与を検討すること。

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)  
重度のInfusion reaction（7フィブリン様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

《 使 用 薬 剤 》  
タルラタマブ：イムデトラ点滴静注1mg、10mg

| 薬 剤 名 | 標準投与量      | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日     |
|-------|------------|-------|---------|---------|
| イムデトラ | 1 mg/body  |       |         | 1       |
| イムデトラ | 10 mg/body |       |         | 8,15    |
| アクテムラ | 8 mg/kg    | #REF! |         | CRS 必要時 |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》  
※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |   |                          |       |                  |
|-------|---|--------------------------|-------|------------------|
| Day1； |   | 1月1日(土)                  |       |                  |
| 0時00分 | ① | 生理食塩液 50mL + デキサート 9.9mg |       |                  |
|       |   | 15 分で点滴静注                |       |                  |
| 0時15分 | ② | 生理食塩液 100mL              |       |                  |
|       |   | 1 時間で点滴静注                |       |                  |
| 1時15分 | ③ | 生理食塩液 236mL + イムデトラ      | 0.0mg | + 注射用水 20mL(溶解用) |
|       |   | 1 時間で点滴静注                |       | + 輸液安定化液 13mL    |
| 2時15分 | ④ | 生理食塩液 500mL              |       |                  |
|       |   | 2 時間で点滴静注                |       |                  |
| 4時15分 | ⑤ | 生理食塩液 500mL              |       |                  |
|       |   | 2 時間で点滴静注                |       |                  |

|       |   |                          |       |                  |
|-------|---|--------------------------|-------|------------------|
| Day8； |   | 1月8日(土)                  |       |                  |
| 0時00分 | ① | 生理食塩液 50mL + デキサート 9.9mg |       |                  |
|       |   | 15 分で点滴静注                |       |                  |
| 0時15分 | ② | 生理食塩液 100mL              |       |                  |
|       |   | 1 時間で点滴静注                |       |                  |
| 1時15分 | ③ | 生理食塩液 233mL + イムデトラ      | 0.0mg | + 注射用水 20mL(溶解用) |
|       |   | 1 時間で点滴静注                |       | + 輸液安定化液 13mL    |
| 2時15分 | ④ | 生理食塩液 500mL              |       |                  |
|       |   | 2 時間で点滴静注                |       |                  |
| 4時15分 | ⑤ | 生理食塩液 500mL              |       |                  |
|       |   | 2 時間で点滴静注                |       |                  |

|        |   |                     |       |                  |
|--------|---|---------------------|-------|------------------|
| Day15； |   | 1月15日(土)            |       |                  |
| 0時00分  | ① | 生理食塩液 50mL          |       |                  |
|        |   | 血管確保で速度適宜に点滴静注      |       |                  |
| 0時05分  | ② | 生理食塩液 233mL + イムデトラ | 0.0mg | + 注射用水 20mL(溶解用) |
|        |   | 1 時間で点滴静注           |       | + 輸液安定化液 13mL    |
| 0時15分  | ③ | 生理食塩液 500mL         |       |                  |
|        |   | 2 時間で点滴静注           |       |                  |
| 2時15分  | ④ | 生理食塩液 500mL         |       |                  |
|        |   | 2 時間で点滴静注           |       |                  |

|           |                                   |   |          |
|-----------|-----------------------------------|---|----------|
| Day1-3；   | 1月1日(土)                           | ～ | 1月3日(月)  |
| Day8-10；  | 1月8日(土)                           | ～ | 1月10日(月) |
| Day15-17； | 1月15日(土)                          | ～ | 1月17日(月) |
| CRS 必要時   | 生理食塩液 50mL + デキサート 9.9mg          |   |          |
|           | 15 分で点滴静注                         |   |          |
|           | ※CRSが出現時、必要に応じて投与すること             |   |          |
| CRS 必要時   | 生理食塩液 250mL + アクテムラ               |   |          |
|           | 0.00mg 0.00mL                     |   |          |
|           | 1 時間で点滴静注                         |   |          |
|           | 0.2μm or 0.22μmの7ml以下体型輸液セットを使用する |   |          |
|           | ※CRSが出現時、必要に応じて投与すること             |   |          |

対象： 小細胞肺癌 2nd line以降  
レジメン名： **Tarlatamab療法(2コース目以降)**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |         |
|-----------|---------|
| 投与スケジュール： | 1コース14日 |
|-----------|---------|

《 注 意 》

※ **CRS（サイトカイン放出症候群）** に要注意。

CRS（発熱、低血圧、低酸素症、悪寒、頻脈、頭痛及び呼吸困難感など）が発現することがある。投与初期に多く認められ、1コース目の各投与は入院管理を検討すること。特に初回と2回目の投与後24時間は必ず入院管理とすること。CRSを認めた場合、解熱剤、デキサメタゾン 10mg/日、トシリズマブ 8mg/kg（800mgを超えないこと）などの投与を検討すること。

※ **ICANS（免疫エフェクター細胞関連神経毒性症候群）** に要注意。

ICANS（失語症、意識レベルの変化、認知能力の障害、筋力低下、痙攣発作、脳浮腫など）が発現することがある。異常が認められた場合には、デキサメタゾン 10mg/回などの投与を検討すること。

※ **Infusion reaction** に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アフィリキシー様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

《 使用 薬 剤 》

タルラタマブ：イムデトラ点滴静注1mg、10mg

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名 | 標準投与量      | 計算値 | 投与量(mg) | 投与日 |
|-------|------------|-----|---------|-----|
| イムデトラ | 10 mg/body |     |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| Day1； | 1月1日(土)                                                                    |
| 0時00分 | ① 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                            |
| 0時05分 | ② 生理食塩液 233mL + イムデトラ 0.0mg + 注射用水 20mL(溶解用)<br>1 時間で点滴静注<br>+ 輸液安定化液 13mL |
| 0時15分 | ③ 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                      |

REFERENCE

MJ Ahn, BC Cho, E Felip, et al. Tarlatamab for patients with previously treated small-cell lung cancer. N Engl J Med. 2023 Nov 30;389(22):2063-2075. PMID: 37861218

2025年4月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2025年4月14日 更新：2025年7月13日



対象： 非小細胞肺癌（進行・再発） 1st Line

レジメン名： **Amivantamab+Lazertinib療法(2コース目以降)(80kg以上**

|       |       |
|-------|-------|
|       | コース目  |
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |             |
|-----------|-------------|
| 投与スケジュール： | 1コース 28日間   |
| コンパニオン：   | EGFR遺伝子変異陽性 |

《 注 意 》

対象：EGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（1st line～）

適正使用ガイドに準じる。

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アナフィラキシー様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 静脈血栓塞栓症の発症抑制の為、併用開始後4ヵ月間はアピキサバン1回2.5mg 1日2回経口投与を検討すること

《 使用薬剤 》

アミバンタマブ：（ライブリバント） 350mg/V

ラゼルチニブ：（ラズクルーズ） 80mg・240mg/T

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名   | 標準投与量        | 計算値  | 投与量(mg) | 投与日  |
|---------|--------------|------|---------|------|
| ライブリバント | 1400 mg/body | 1400 |         | 1,15 |
| ラズクルーズ  | 240 mg/day   | 240  |         | 連日   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|          |         |                                                                                           |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Day1,15； | 1月1日(土) | 1月15日(土)                                                                                  |
| 0時00分    | 内服      | カロナール 200mg 4錠                                                                            |
| 0時00分    | 内服      | レスタミンコーワ錠(10mg) 5錠                                                                        |
| 0時00分    | ①       | 生理食塩液 100mL<br>30分で点滴静注                                                                   |
| 0時30分    | ②       | 生理食塩液 250mL + ライブリバント 0mg 0.00mL<br>0.2μm or 0.22μmのフィルター体型輸液セットを使用する<br>↓ 125 mL/hrで点滴静注 |
| 2時30分    | ③       | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                       |

|     |    |         |       |           |
|-----|----|---------|-------|-----------|
| 連日； | 内服 | ラズクルーズ錠 | 0mg/回 | 1日1回 経口投与 |
|-----|----|---------|-------|-----------|

REFERENCE

B.C. Cho, S. Lu, E. Felip, et al. Amivantamab plus Lazertinib in Previously Untreated EGFR-Mutated Advanced NSCLC. N Engl J Med 2024;391:1486-98.

2025年6月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2025年6月9日



対象： 非小細胞肺癌（進行・再発） 1st Line

レジメン名： **Amivantamab+Lazertinib療法(2コース目以降)(80kg未満**

コース目

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |             |
|-----------|-------------|
| 投与スケジュール： | 1コース 28日間   |
| コンパニオン：   | EGFR遺伝子変異陽性 |

《 注 意 》

対象：EGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（1st line～）

適正使用ガイドに準じる。

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アナフィラキシー様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 静脈血栓塞栓症の発症抑制の為、併用開始後4ヵ月間はアピキサバン1回2.5mg 1日2回経口投与を検討すること

《 使用薬剤 》

アミバンタマブ：（ライブリバント） 350mg/V

ラゼルチニブ：（ラズクルーズ） 80mg・240mg/T

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名   | 標準投与量        | 計算値  | 投与量(mg) | 投与日  |
|---------|--------------|------|---------|------|
| ライブリバント | 1050 mg/body | 1050 |         | 1,15 |
| ラズクルーズ  | 240 mg/day   | 240  |         | 連日   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|          |         |                                                                                           |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Day1,15； | 1月1日(土) | 1月15日(土)                                                                                  |
| 0時00分    | 内服      | カロナール 200mg 4錠                                                                            |
| 0時00分    | 内服      | レスタミンコーワ錠(10mg) 5錠                                                                        |
| 0時00分    | ①       | 生理食塩液 100mL<br>30分で点滴静注                                                                   |
| 0時30分    | ②       | 生理食塩液 250mL + ライブリバント 0mg 0.00mL<br>0.2μm or 0.22μmのフィルター体型輸液セットを使用する<br>↓ 125 mL/hrで点滴静注 |
| 2時30分    | ③       | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                       |

|     |    |         |       |           |
|-----|----|---------|-------|-----------|
| 連日； | 内服 | ラズクルーズ錠 | 0mg/回 | 1日1回 経口投与 |
|-----|----|---------|-------|-----------|

REFERENCE

B.C. Cho, S. Lu, E. Felip, et al. Amivantamab plus Lazertinib in Previously Untreated EGFR-Mutated Advanced NSCLC. N Engl J Med 2024;391:1486-98.

2025年6月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2025年6月9日

|            |                                                 |                       |       |       |
|------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|
|            | コース目                                            |                       |       |       |
| 患者 I D :   | #REF!                                           |                       |       |       |
| 患者氏名 :     | #REF!                                           |                       |       |       |
| 身長(cm)     | 体重(kg)                                          | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!      | #REF!                                           | #REF!                 | #REF! | #REF! |
| 投与スケジュール : | 1 コース 2 1 日間                                    |                       |       |       |
| 目標コース :    | 6 コース施行後、Pembrolizumab投与（Pembrolizumabは最大35コース） |                       |       |       |
| 使用基準 :     | class A                                         |                       |       |       |

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アライジー様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意

《 使 用 薬 剤 》

ペムブロリズマブ：（キイトルーダ）100mg/V

カルボプラチン（CBDCA）：（カルボプラチン）150mg/V、450mg/V

ペメトレキセド（PEM）：（ペメトレキセド）100mg・500mg・800mg/V

|             |             |                                              |         |     |
|-------------|-------------|----------------------------------------------|---------|-----|
| Cre値（mg/dl） |             | Calvertの計算式：投与量(mg/body) = 目標AUC値 × (GFR+25) |         |     |
| 目標AUC       | 5           | GFRはCcrを代用して計算。                              |         |     |
| 薬 剤 名       | 標準投与量       | 計算値                                          | 投与量(mg) | 投与日 |
| キイトルーダ      | 200 mg/body | 200                                          |         | 1   |
| カルボプラチン     | 5 AUC       | #REF!                                        |         | 1   |
| ペメトレキセド     | 500 mg/m2   | #REF!                                        |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|              |                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 初回投与 7 日以上前に |                                                                                           |
| 筋注           | メチコバール注500 μ g 2 A 筋注。以後、3 クール（9 週間）毎に1 回投与。                                              |
| 内服           | バンビタン末1 g /日（葉酸 0.5mg/日）毎日内服。                                                             |
| Day1；        | 1月1日(土)                                                                                   |
| 0時00分        | ① 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                                           |
| 0時05分        | ② 内服 アプレビタントカプセル 125mg 1 × (1) カルボプラチン開始 1 時間前頃                                           |
| 0時05分        | ② 生理食塩液 100mL + キイトルーダ 0mg 0.00mL<br>30 分で点滴静注<br>0.2 μ m or 0.22 μ m のフィルター一体型輸液セットを使用する |
| 0時35分        | ③ 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                     |
| 0時40分        | ④ 生理食塩液 50mL + パロノセトロン 1V + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注                                      |
| 0時55分        | ⑤ 生理食塩液 100mL + ペメトレキセド 0mg 0.00mL<br>10 分で点滴静注                                           |
| 1時05分        | ⑥ 5 %ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン 0mg 0.00mL<br>60 分で点滴静注                                        |
| 2時05分        | ⑦ 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                     |

|         |         |                              |         |
|---------|---------|------------------------------|---------|
| Day2～3； | 1月2日(日) | ～                            | 1月3日(月) |
| 起床後     | 内服      | アプレビタントカプセル 80mg 1 × (2) 起床後 |         |

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間                                    |
| 目標コース：    | 6 コース施行後、Pembrolizumab投与（Pembrolizumabは最大35コース） |
| 使用基準：     | class A                                         |

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アライキ-様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意

指示1： 体重測定 毎日起床時

注意： Day4以降も水分摂取が少ない場合や尿量が少ない場合には、輸液を考慮すること

《 使 用 薬 剤 》

ペムブロリズマブ：（キイトルーダ）100mg/V

ペメトレキセド：（ペメトレキセド）100mg・500mg・800mg/V

シスプラチン；（C D D P）：シスプラチン注（50mg/100mL/V、10mg/20mL/V）

| 薬 剤 名   | 標準投与量       | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|---------|-------------|-------|---------|-----|
| キイトルーダ  | 200 mg/body | 200   |         | 1   |
| ペメトレキセド | 500 mg/m2   | #REF! |         | 1   |
| シスプラチン  | 75 mg/m2    | #REF! |         | 1   |

|                                          |                   |                                                                                      |  |  |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 《 タイムスケジュール：開始時刻 》                       |                   |                                                                                      |  |  |
| ※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。 |                   |                                                                                      |  |  |
| 初回投与 7 日以上前に                             |                   |                                                                                      |  |  |
|                                          | 筋注                | メチコバル注500 μ g 2 A 筋注。以後、3 クール（9 週間）毎に1 回投与。                                          |  |  |
|                                          | 内服                | バンビタン末1 g /日（葉酸 0.5mg/日）毎日内服。                                                        |  |  |
| Day1；                                    | 1月1日(土)           |                                                                                      |  |  |
| 0時00分                                    | ①                 | 生理食塩液 50mL<br>血管確保で速度適宜に点滴静注                                                         |  |  |
| 0時05分                                    | ②                 | 生理食塩液 100mL + キイトルーダ 0mg 0.00mL<br>30 分で点滴静注<br>0.2 μ m or 0.22 μ mのフィル-体型輸液セットを使用する |  |  |
| 0時35分                                    | ③                 | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                  |  |  |
| 0時40分                                    | ④                 | 生理食塩液 500mL + 硫酸Mg補正液 8mL<br>1 時間で点滴静注                                               |  |  |
| 1時40分                                    | ⑤                 | ソリタ T 3 号 500mL<br>1 時間で点滴静注                                                         |  |  |
| 2時35分                                    | 内服                | アプレビタントカプセル 125mg 1 ×(1) シスプラチン開始 1 時間前頃                                             |  |  |
| 2時40分                                    | ⑥                 | 生理食塩液 50mL + パロノセトロン 1V + デキサート 9.9mg<br>15 分で点滴静注                                   |  |  |
| 2時55分                                    | ⑦                 | 生理食塩液 100mL + ペメトレキセド 0mg 0.00mL<br>10 分で点滴静注                                        |  |  |
| 3時05分                                    | ⑧                 | マンニトール 300mL<br>30 分で点滴静注                                                            |  |  |
| 3時35分                                    | ⑨                 | 生理食塩液 700 mL + シスプラチン 0mg 0.00mL<br>90 分で点滴静注                                        |  |  |
| 5時05分                                    | ⑩                 | 生理食塩液 500mL<br>1 時間で点滴静注                                                             |  |  |
| 6時05分                                    | ⑪                 | ソリタ T 3 号 500mL<br>1 時間で点滴静注                                                         |  |  |
|                                          |                   |                                                                                      |  |  |
| Day2～3；                                  | 1月2日(日) ～ 1月3日(月) |                                                                                      |  |  |
| 起床後                                      | 内服                | アプレビタントカプセル 80mg 1 ×(2) 起床後                                                          |  |  |
| 2時35分                                    | ①                 | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注                                                |  |  |
| 2時50分                                    | ③                 | ソリタ T 3 号 500mL × 3<br>4.5 時間（1.5時間 × 3）で点滴静注                                        |  |  |

対象： 悪性胸膜中皮腫 1st Line

レジメン名： **Pembrolizumab療法(メンテナンス)**

コース目

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |              |
|-----------|--------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間 |
|-----------|--------------|

《 注 意 》

※**Pembrolizumab+Platinum+PEM療法の維持療法として投与**

適正使用ガイドに準じる。

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction (アフィキシー様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等) が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用 (間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等) に注意

《 使用 薬 剤 》

ペムブロリズマブ： (キイトルーダ) 100mg/V

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名  | 標準投与量       | 計算値 | 投与量(mg) | 投与日 |
|--------|-------------|-----|---------|-----|
| キイトルーダ | 200 mg/body | 200 |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Day1； | 1月1日(土)                                                                                                   |
| 0時00分 | ① 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                                                           |
| 0時05分 | ② 生理食塩液 100mL + キイトルーダ <b>0mg</b> <b>0.00mL</b><br>30 分で点滴静注<br><u>0.2μm or 0.22μmのフィルター一体型輸液セットを使用する</u> |
| 0時35分 | ③ 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                                     |

REFERENCE

Quincy Chu, Francesco Perrone, Laurent Greillier, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy versus chemotherapy in untreated advanced pleural mesothelioma in Canada, Italy, and France: a phase 3, open-label, randomised controlled trial. Lancet 2023; 402: 2295–306

2025年7月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2025年7月14日

対象： 悪性胸膜中皮腫 1st Line

レジメン名： **Pembrolizumab療法(メンテナンス)(6w)**

コース目

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

投与スケジュール： 1 コース 4 2 日間

《 注 意 》

※**Pembrolizumab+Platinum+PEM療法の維持療法として投与**

※ 通常、2～3ヵ月は3週間の投与間隔のレジメンにて治療開始し、その間、継続に問題となるような重大な副作用の発現がないこと、PDでないことを確認した後に、6週間の投与間隔のレジメンに切り替えることが望ましい適正使用ガイドに準じる。

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アフィキシー様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意

《 使用 薬 剤 》

ペムブロリズマブ：（キイトルーダ）100mg/V

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名  | 標準投与量       | 計算値 | 投与量(mg) | 投与日 |
|--------|-------------|-----|---------|-----|
| キイトルーダ | 400 mg/body | 400 |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

Day1； 1月1日(土)

|       |   |                                                                             |        |
|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 0時00分 | ① | 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                               |        |
| 0時05分 | ② | 生理食塩液 100mL + キイトルーダ 0mg<br>30 分で点滴静注<br>0.2μm or 0.22μmのフィルター一体型輸液セットを使用する | 0.00mL |
| 0時35分 | ③ | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                         |        |

#### REFERENCE

Quincy Chu, Francesco Perrone, Laurent Greillier, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy versus chemotherapy in untreated advanced pleural mesothelioma in Canada, Italy, and France: a phase 3, open-label, randomised controlled trial. Lancet 2023; 402: 2295–306

2025年7月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2025年7月14日

対象： 非小細胞肺癌（扁平上皮癌）術前補助化学療法  
レジメン名： <術前>Pembrolizumab+CDDP+GEM療法(short hydration)

|         |       |
|---------|-------|
|         | コース目  |
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間                           |
| 目標コース：    | 最大 4 コース（術後にPembrolizumab療法を最大13コース実施） |
| 使用基準：     | class A, Day8：class C                  |

《 注 意 》  
適正使用ガイドに準じる。  
**NSCLC Stage II -III B(T3-4N2)の術前患者を対象**  
※ 4コースの場合、初回投与から20週以内に外科切除（4コース未満の場合、最終投与後4-8週以内に外科切除）  
※ 術後補助療法はPembrolizumab療法を最大13コース実施  
※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)  
重度のInfusion reaction（*アレルギー*様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。  
※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意  
指示 1： 体重測定 毎日起床時  
注意： Day4以降も水分摂取が少ない場合や尿量が少ない場合には、輸液を考慮すること

《 使用 薬 剤 》  
ペムプロリズマブ：（キイトルーダ）100mg/V  
シスプラチン；（CDDP）：シスプラチン注（50mg/100mL/V、10mg/20mL/V）  
ゲムシタビン（GEM）：ゲムシタビン点滴静注用 200、1000 mg/V

| 薬 剤 名  | 標準投与量 |                   | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|--------|-------|-------------------|-------|---------|-----|
| キイトルーダ | 200   | mg/body           | 200   |         | 1   |
| シスプラチン | 75    | mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1   |
| ゲムシタビン | 1000  | mg/m <sup>2</sup> | #REF! |         | 1.8 |

|                                          |    |                                       |                                           |  |
|------------------------------------------|----|---------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| 《 タイムスケジュール：開始時刻 》                       |    |                                       |                                           |  |
| ※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。 |    |                                       |                                           |  |
| Day1；                                    |    | 1月1日(土)                               |                                           |  |
| 0時00分                                    | ①  | 生理食塩液 50mL                            | 血管確保用で速度適宜に点滴静注                           |  |
| 0時05分                                    | ②  | 生理食塩液 100mL + キイトルーダ 0mg              | 0.00mL                                    |  |
|                                          |    | 30 分で点滴静注                             | 0.2 μm or 0.22 μmのフィルター型輸液セットを使用する        |  |
| 0時35分                                    | ③  | 生理食塩液 50mL                            | フラッシュ                                     |  |
| 0時40分                                    | ④  | 生理食塩液 500mL + 硫酸Mg補正液 8mL             | 1 時間で点滴静注                                 |  |
| 1時40分                                    | ⑤  | ソリタ T 3 号 500mL                       | 1 時間で点滴静注                                 |  |
| 2時40分                                    | ⑥  | 生理食塩液 50mL + パロノセトロン 1V + デキサート 9.9mg | 15 分で点滴静注                                 |  |
| 2時55分                                    | 内服 |                                       | アプレビタントカプセル 125mg 1 × (1) シスプラチン開始 1 時間前頃 |  |
| 2時55分                                    | ⑦  | 生理食塩液 100mL + ゲムシタビン 0mg              | 30 分で点滴静注                                 |  |
| 3時25分                                    | ⑧  | マンニトール 300mL                          | 30 分で点滴静注                                 |  |
| 3時55分                                    | ⑨  | 生理食塩液 700 mL + シスプラチン 0mg             | 0.00mL                                    |  |
|                                          |    | 90 分で点滴静注                             |                                           |  |
| 5時25分                                    | ⑩  | 生理食塩液 500mL                           | 1 時間で点滴静注                                 |  |
| 6時25分                                    | ⑪  | ソリタ T 3 号 500mL                       | 1 時間で点滴静注                                 |  |
| Day2～3； 1月2日(日) ～ 1月3日(月)                |    |                                       |                                           |  |
| 起床後                                      | 内服 |                                       | アプレビタントカプセル 80mg 1 × (2) 起床後              |  |
| 2時40分                                    | ①  | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg              | 15 分で点滴静注                                 |  |
| 2時55分                                    | ②  | ソリタ T 3 号 500mL × 3                   | 4.5 時間 (1.5時間 × 3) で点滴静注                  |  |
| Day8； 1月8日(土)                            |    |                                       |                                           |  |
| 2時40分                                    | ①  | 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg              | 15 分で点滴静注                                 |  |
| 2時55分                                    | ②  | 生理食塩液 100mL + ゲムシタビン 0mg              | 30 分で点滴静注                                 |  |
| 3時25分                                    | ③  | 生理食塩液 50mL                            | フラッシュ                                     |  |



対象： 非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）術後補助化学療法

レジメン名： <術後>Pembrolizumab療法

コース目

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |              |
|-----------|--------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間 |
| 目標コース：    | 最大13コース      |

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

※ Pembrolizumab+CDDP+Chemo(PEMorGEM)療法で術前治療を行い、手術をした患者が対象

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アライキシ-様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意

《 使用 薬 剤 》

ペムブロリズマブ：（キイトルーダ）100mg/V

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名               | 標準投与量       | 計算値 | 投与量(mg) | 投与日 |
|---------------------|-------------|-----|---------|-----|
| キイトルーダ <sup>®</sup> | 200 mg/body | 200 |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Day1； | 1月1日(土)                                                                                |
| 0時00分 | ① 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                                        |
| 0時05分 | ② 生理食塩液 100mL + キイトルーダ 0mg 0.00mL<br>30 分で点滴静注<br>0.2 μm or 0.22 μmのフィルター一体型輸液セットを使用する |
| 0時35分 | ③ 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                  |

REFERENCE

H. Wakelee, M. Liberman, T. Kato, et al. Perioperative Pembrolizumab for Early-Stage Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2023;389:491-503.

2025年7月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2025年7月14日

対象： 非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）術後補助化学療法

レジメン名： <術後>Pembrolizumab療法(6w)

コース目

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 投与スケジュール： | 1コース 42日間        |
| 目標コース：    | 最大13コース（※q3wとして） |

#### 《 注 意 》

※ 通常、2～3ヵ月は3週間の投与間隔のレジメンにて治療開始し、その間、継続に問題となるような重大な副作用の発現がないこと、PDでないことを確認した後に、6週間の投与間隔のレジメンに切り替えることが望ましい適正使用ガイドに準じる。

※ **Pembrolizumab+CDDP+Chemo(PEMorGEM)療法で術前治療を行い、手術をした患者が対象**

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アフィキシー様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意

#### 《 使用 薬 剤 》

ペムブロリズマブ：（キイトルーダ）100mg／V

#### 《 投 与 量 》

| 薬 剤 名  | 標準投与量       | 計算値 | 投与量(mg) | 投与日 |
|--------|-------------|-----|---------|-----|
| キイトルーダ | 400 mg/body | 400 |         | 1   |

#### 《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Day1； | 1月1日(土)                                                                                    |
| 0時00分 | ① 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                                            |
| 0時05分 | ② 生理食塩液 100mL + キイトルーダ 0mg 0.00mL<br>30分で点滴静注<br><u>0.2μm or 0.22μmのフィルター一体型輸液セットを使用する</u> |
| 0時35分 | ③ 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                      |

#### REFERENCE

H. Wakelee, M. Liberman, T. Kato, et al. Perioperative Pembrolizumab for Early-Stage Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2023;389:491-503.

2025年7月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2025年7月14日

対象： 非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）術前補助化学療法  
レジメン名： <術前>Durva+CBDCA+PEM療法

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日                         |
| 目標コース：    | 最大 4 コース（術後にDurvalumab療法を最大12コース実施） |
| 使用基準：     | class B                             |

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

NSCLC Stage II - IIIB(N2)の術前患者を対象

※ EGFR遺伝子変異陽性又はALK融合遺伝子陽性が確認されている患者は除外

※ Infusion reaction に注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アナフィラキシー様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意

※ 体重30kg以下の場合、イミフィンジの投与量は20mg/kgとする。

《 使用 薬 剤 》

デュルバルマブ（Durvalumab）：イミフィンジ 点滴静注 120mg/2.4mL/V、500mg/10mL/V

カルボプラチン（CBDCA）：150mg/V、450mg/V

ペメトレキセド（PEM）：100mg/V、500mg/V、800mg/V

《 投 与 量 》

|              |                |                                              |         |     |  |
|--------------|----------------|----------------------------------------------|---------|-----|--|
| Cre値 (mg/dl) |                | Calvertの計算式：投与量(mg/body) = 目標AUC値 × (GFR+25) |         |     |  |
| 目標AUC        | 5              | GFRはCcrを代用して計算。                              |         |     |  |
| 薬 剤 名        | 標準投与量          | 計算値                                          | 投与量(mg) | 投与日 |  |
| イミフィンジ       | 1500 * mg/body | #REF!                                        |         | 1   |  |
| カルボプラチン      | 5 AUC          | #REF!                                        |         | 1   |  |
| ペメトレキセド      | 500 mg/m2      | #REF!                                        |         | 1   |  |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |         |                                                    |                                            |                                                                       |
|-------|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|       |         | 初回投与 7 日以上前に（ペメトレキセド最終投与日から22日目まで）                 |                                            |                                                                       |
|       |         | 筋注                                                 | メチコパール注500μg 2A筋注。以後、約9週毎に1回投与             |                                                                       |
|       |         | 内服                                                 | バンビタン末1 g / 日（葉酸 0.5mg/日） 毎日内服。            |                                                                       |
| Day1； | 1月1日(土) |                                                    |                                            |                                                                       |
| 0時00分 | ①       | 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                      |                                            |                                                                       |
| 0時05分 | ②       | 生理食塩液 100mL                                        | +                                          | イミフィンジ 0mg 0.00mL<br>60 分で点滴静注<br>0.2μm or 0.22μm の714mlー体型輸液セットを使用する |
| 0時35分 | 内服      |                                                    | アプレピタントカプセル 125mg 1 × (1) カルボプラチン開始 1 時間前頃 |                                                                       |
| 1時05分 | ③       | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                |                                            |                                                                       |
| 1時10分 | ④       | 生理食塩液 50mL + パロノセトロン 1V + デキサート 6.6mg<br>15 分で点滴静注 |                                            |                                                                       |
| 1時25分 | ⑤       | 生理食塩液 100mL + ペメトレキセド                              | 0mg                                        | 0.00mL<br>10 分で点滴静注                                                   |
| 1時35分 | ⑥       | 5 %ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン                           | 0mg                                        | 0.00mL<br>60 分で点滴静注                                                   |
| 2時35分 | ⑦       | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                |                                            |                                                                       |

|         |         |                              |         |
|---------|---------|------------------------------|---------|
| Day2～3； | 1月2日(日) | ～                            | 1月3日(月) |
| 起床後     | 内服      | アプレピタントカプセル 80mg 1 × (2) 起床後 |         |

REFERENCE

Heymach JV, Harpole D, Mistudomi T, et al. Perioperative durvalumab for resectable non-small-cell lung cancer. N Engl J Med. 2023 Nov 2;389(18):1672-1684.

2025年10月度化学療法プロトコール審査委員会承認：2025年10月20日

対象： 非小細胞肺癌（扁平上皮癌）術前補助化学療法  
レジメン名： <術前>Durva+CBDCA+PTX療法

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |            |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|------------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    | アルコールアレルギー |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |            |

※必ず無しを確認

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日                         |
| 目標コース：    | 最大 4 コース（術後にDurvalumab療法を最大12コース実施） |
| 使用基準：     | class B                             |

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

NSCLC Stage II -IIIB(N2)の術前患者を対象

※ EGFR遺伝子変異陽性又はALK融合遺伝子陽性が確認されている患者は除外

※ **Infusion reaction** に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アフィキシー様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意

※ **体重30kg以下の場合、イミフィンジの投与量は20mg/kgとする。**

《 使 用 薬 剤 》

デュルバルマブ（Durvalumab）：イミフィンジ 点滴静注 120mg/2.4mL/V、500mg/10mL/V

カルボプラチン（CBDCA）：（カルボプラチン） 150mg/V、450mg/V

パクリタキセル：（パクリタキセル） 100mg /V

《 投 与 量 》

|              |        |                                           |       |         |     |
|--------------|--------|-------------------------------------------|-------|---------|-----|
| Cre値 (mg/dl) |        | Calvertの計算式：投与量(mg/body)= 目標AUC値×(GFR+25) |       |         |     |
| 目標AUC        | 6      | GFRはCcrを代用して計算。                           |       |         |     |
| 薬 剤 名        | 標準投与量  |                                           | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
| イミフィンジ       | 1500 * | mg/body                                   | #REF! |         | 1   |
| カルボプラチン      | 6      | AUC                                       | #REF! |         | 1   |
| パクリタキセル      | 200    | mg/m2                                     | #REF! |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Day1； | 1月1日(土)                                                                              |
| 0時00分 | ① 生理食塩液 50mL<br>血管確保用に速度適宜に点滴静注                                                      |
| 0時05分 | ② 生理食塩液 100mL + イミフィンジ 0mg 0.00mL<br>60 分で点滴静注<br>0.2μm or 0.22μmのフィルトレー型輸液セットを使用する  |
| 1時05分 | ③ 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                |
| 1時10分 | 内服 レスタミンコーワ錠(10mg) 5 錠 点滴直前に内服                                                       |
| 1時10分 | ④ 生理食塩液 50mL + ファモチジン 1A + デキサート 16.5mg<br>15 分で点滴静注                                 |
| 1時25分 | ⑤ 生理食塩液 100mL + パロノセトロン 1A<br>30 分で点滴静注                                              |
| 1時55分 | ⑥ 生理食塩液 500mL + パクリタキセル 0mg 0.00mL<br>3 時間で点滴静注<br>0.2μm or 0.22μmのフィルトレー型輸液セットを使用する |
| 4時55分 | ⑦ 5 %ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン 0mg 0.00mL<br>60 分で点滴静注 0.00mL                            |
| 5時55分 | ⑧ 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                |

REFERENCE

Heymach JV, Harpole D, Mistudomi T, et al. Perioperative durvalumab for resectable non-small-cell lung cancer. N Engl J Med. 2023 Nov 2;389(18):1672-1684.

2025年10月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2025年10月20日

対象： 非小細胞肺癌 術後補助化学療法

レジメン名： <術後>Durvalumab療法

コース目

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |             |
|-----------|-------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 8 日 |
| 目標コース：    | 1 2 コース     |

《 注 意 》

※ Durvalumab+CBDCA+Chemo(PEMorPTX)療法で術前治療を行い、手術をした患者が対象  
適正使用ガイドに準じる。

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)  
重度のInfusion reaction (アフィクション様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等) が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用(間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等) に注意

※ **体重30kg以下の場合、イミフィンジの投与量は20mg/kgとする。**

《 使 用 薬 剤 》

デュルバルマブ (Durvalumab)：イミフィンジ 点滴静注 120mg/2.4mL/V、500mg/10mL/V

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名  | 標準投与量          | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|--------|----------------|-------|---------|-----|
| イミフィンジ | 1500 * mg/body | #REF! |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Day1； | 1月1日(土)                                                                                     |
| 0時00分 | ① 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                                             |
| 0時05分 | ② 生理食塩液 100mL + イミフィンジ 0mg 0.00mL<br>60 分で点滴静注<br><u>0.2μm or 0.22μmのフィルター一体型輸液セットを使用する</u> |
| 1時05分 | ③ 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                       |

REFERENCE

Heymach JV, Harpole D, Mistudomi T, et al. Perioperative durvalumab for resectable non-small-cell lung cancer.  
N Engl J Med. 2023 Nov 2;389(18):1672-1684.

2025年10月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2025年10月20日

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |            |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|------------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    | アルコールアレルギー |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |            |

※必ず無しを確認

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間                    |
| 目標コース：    | 4 - 6 コース施行後、Atezolizumab単独にて投与 |
| 使用基準：     | class B                         |

《 注 意 》  
適正使用ガイドに準じる。  
※ **Infusion reaction** に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)  
重度のInfusion reaction (アナフィキシー様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等) が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。  
※ 免疫関連副作用 (間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等) に注意

《 使 用 薬 剤 》  
アテゾリズマブ： (テセントリク) 1200mg/V  
カルボプラチン (CBDCA)： (カルボプラチン) 150mg/V、450mg/V  
パクリタキセル： (パクリタキセル) 100mg /V

|              |              |                                              |         |     |  |
|--------------|--------------|----------------------------------------------|---------|-----|--|
| Cre値 (mg/dl) |              | Calvertの計算式：投与量(mg/body) = 目標AUC値 × (GFR+25) |         |     |  |
| 目標AUC        | 6            | GFRはCcrを代用して計算。                              |         |     |  |
| 薬 剤 名        | 標準投与量        | 計算値                                          | 投与量(mg) | 投与日 |  |
| テセントリク       | 1200 mg/body | 1200                                         |         | 1   |  |
| カルボプラチン      | 6 AUC        | #REF!                                        |         | 1   |  |
| パクリタキセル      | 200 mg/m2    | #REF!                                        |         | 1   |  |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》  
※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Day1； | 1月1日(土)                                                                                                       |
| 0時00分 | ① 生理食塩液 50mL<br>血管確保用で速度適宜に点滴静注                                                                               |
| 0時05分 | ② 生理食塩液 250mL + テセントリク 0mg 0.00mL<br>60 分で点滴静注<br>(60分で忍容性が良好であれば30分に変更可)<br>0.2μm or 0.22μmのフィルター型輸液セットを使用する |
| 1時05分 | ③ 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                                         |
| 1時10分 | 内服 レスタミンコーワ錠(10mg) 5 錠 点滴直前に内服                                                                                |
| 1時10分 | ④ 生理食塩液 50mL + ファモチジン 1A + デキサート 16.5mg<br>15 分で点滴静注                                                          |
| 1時25分 | ⑤ 生理食塩液 100mL + パロノセトロン 1A<br>30 分で点滴静注                                                                       |
| 1時55分 | ⑥ 生理食塩液 500mL + パクリタキセル 0mg 0.00mL<br>3 時間で点滴静注<br>0.2μm or 0.22μmのフィルター型輸液セットを使用する                           |
| 4時55分 | ⑦ 5 %ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン 0mg 0.00mL<br>60 分で点滴静注 0.00mL                                                     |
| 5時55分 | ⑧ 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                                                                         |

REFERENCE

Shukuya T, Asao T, Goto Y, et al. Activity and safety of atezolizumab plus carboplatin and paclitaxel in patients with advanced or recurrent thymic carcinoma (MARBLE): a multicentre, single-arm, phase 2 trial. Lancet Oncol 2025; 26: 331–42.

対象： 胸腺癌 1st line

レジメン名： **Atezolizumab療法**

コース目

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

投与スケジュール： 1 コース 2 1 日間

《 注 意 》

**Atezolizumab+CBDCA+PTX療法のメンテナンスとして投与すること**

適正使用ガイドに準じる。

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アフィキシン様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

※ 免疫関連副作用（間質性肺疾患、心筋炎、大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、下垂体炎等）に注意

《 使 用 薬 剤 》

アテゾリズマブ：（テセントリク）1200mg／V

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名  | 標準投与量        | 計算値  | 投与量(mg) | 投与日 |
|--------|--------------|------|---------|-----|
| テセントリク | 1200 mg/body | 1200 |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

Day1； 1月1日(土)

0時00分 ① 生理食塩液 50mL

血管確保用で速度適宜に点滴静注

0時05分 ② 生理食塩液 250mL + テセントリク 0mg 0.00mL

60 分で点滴静注

(60分で忍容性が良好であれば30分に変更可)

0.2μm or 0.22μmのフィルター一体型輸液セットを使用する

1時05分 ③ 生理食塩液 50mL

フラッシュ

REFERENCE

Shukuya T, Asao T, Goto Y, et al. Activity and safety of atezolizumab plus carboplatin and paclitaxel in patients with advanced or recurrent thymic carcinoma (MARBLE): a multicentre, single-arm, phase 2 trial. Lancet Oncol 2025; 26: 331–42.

2026年3月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2026年3月9日

対象： 非小細胞肺癌（進行・再発） 1st Line  
レジメン名： **Ami+Laze療法(1コース目)(80kg以上)(SC)**

|           |             |                       |       |       |
|-----------|-------------|-----------------------|-------|-------|
|           | コース目        |                       |       |       |
| 患者ID：     | #REF!       |                       |       |       |
| 患者氏名：     | #REF!       |                       |       |       |
| 身長(cm)    | 体重(kg)      | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!     | #REF!       | #REF!                 | #REF! | #REF! |
| 投与スケジュール： | 1コース 28日間   |                       |       |       |
| コンパニオン：   | EGFR遺伝子変異陽性 |                       |       |       |

《 注 意 》

対象：EGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（1st line～）

適正使用ガイドに準じる。

- ※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)  
重度のInfusion reaction（アフィリクシ様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。
- ※ **静脈血栓塞栓症の発症抑制の為、併用開始後4ヵ月間はアピキサバン1回2.5mg 1日2回経口投与を検討すること**

《 使用 薬 剤 》

アミバンタマブ：（リプロファズ） 1600mg/V  
ラゼルチニブ：（ラズクルーズ） 80mg・240mg/T

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名  | 標準投与量 |         | 計算値  | 投与量(mg) | 投与日       |
|--------|-------|---------|------|---------|-----------|
| リプロファズ | 2240  | mg/body | 2240 |         | 1,8,15,22 |
| ラズクルーズ | 240   | mg/day  | 240  |         | 連日        |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|               |         |                                                   |          |          |
|---------------|---------|---------------------------------------------------|----------|----------|
| Day1,8,15,22； | 1月1日(土) | 1月8日(土)                                           | 1月15日(土) | 1月22日(土) |
| 0時00分         | 内服      | カロナール 200mg 4錠                                    |          |          |
| 0時00分         | 内服      | レスタミンコーワ錠(10mg) 5錠                                |          |          |
| 0時00分         | 内服      | デカドロン錠4mg 2錠                                      |          |          |
|               |         | リプロファズ投与1時間前に内服                                   |          |          |
| 1時00分         | ①皮下注    | リプロファズ皮下注 0mg                                     | 0.00mL   |          |
|               |         | 腹部皮下に約5分かけて投与                                     |          |          |
|               |         | ※複数のシリンジで投与する場合は、へその周り5cmを外した異なる腹部四分円に連続して投与すること。 |          |          |
|               |         | ※他の部位への投与はデータが得られていない。                            |          |          |
|               |         | ※皮膚の発赤、挫傷、圧痛、硬結又は瘢痕がある部位には注射しないこと。                |          |          |
|               |         | ※患者が痛みを感じた場合は、注射速度を減速又は注射を中断する。                   |          |          |
|               |         | ※減速又は中断をしても痛みが軽減しない場合は、残りを左右逆側の腹部に投与することができる。     |          |          |
|               |         | ※必要に応じ、生理食塩液にて皮下投与セットをフラッシュすること。                  |          |          |

|     |    |         |       |           |
|-----|----|---------|-------|-----------|
| 連日； | 内服 | ラズクルーズ錠 | 0mg/回 | 1日1回 経口投与 |
|-----|----|---------|-------|-----------|

REFERENCE

B.C. Cho, S. Lu, E. Felip, et al. Amivantamab plus Lazertinib in Previously Untreated EGFR-Mutated Advanced NSCLC. N Engl J Med 2024;391:1486-98.

NB. Leighl, et al. Subcutaneous Versus Intravenous Amivantamab, Both in Combination With Lazertinib, in Refractory Epidermal Growth Factor Receptor–Mutated Non–Small Cell Lung Cancer: Primary Results From the Phase III PALOMA-3 Study. J Clin Oncol 42:3593-3605.

2026年3月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2026年3月9日

対象： 非小細胞肺癌（進行・再発） 1st Line  
レジメン名： **Ami+Laze療法(1コース目)(80kg未満)(SC)**

|           |             |                       |       |       |
|-----------|-------------|-----------------------|-------|-------|
|           | コース目        |                       |       |       |
| 患者ID：     | #REF!       |                       |       |       |
| 患者氏名：     | #REF!       |                       |       |       |
| 身長(cm)    | 体重(kg)      | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!     | #REF!       | #REF!                 | #REF! | #REF! |
| 投与スケジュール： | 1コース 28日間   |                       |       |       |
| コンパニオン：   | EGFR遺伝子変異陽性 |                       |       |       |

《 注 意 》

対象：EGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（1st line～）

適正使用ガイドに準じる。

- ※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)  
重度のInfusion reaction（アフィリクシ様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。
- ※ **静脈血栓塞栓症の発症抑制の為、併用開始後4ヵ月間はアピキサバン1回2.5mg 1日2回経口投与を検討すること**

《 使用 薬 剤 》

アミバンタマブ：（リプロファズ） 1600mg/V  
ラゼルチニブ：（ラズクルーズ） 80mg・240mg/T

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名  | 標準投与量 |         | 計算値  | 投与量(mg) | 投与日       |
|--------|-------|---------|------|---------|-----------|
| リプロファズ | 1600  | mg/body | 1600 |         | 1,8,15,22 |
| ラズクルーズ | 240   | mg/day  | 240  |         | 連日        |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|               |         |                                                   |          |          |
|---------------|---------|---------------------------------------------------|----------|----------|
| Day1,8,15,22； | 1月1日(土) | 1月8日(土)                                           | 1月15日(土) | 1月22日(土) |
| 0時00分         | 内服      | カロナール 200mg 4錠                                    |          |          |
| 0時00分         | 内服      | レスタミンコーワ錠(10mg) 5錠                                |          |          |
| 0時00分         | 内服      | デカドロン錠4mg 2錠                                      |          |          |
|               |         | リプロファズ投与1時間前に内服                                   |          |          |
| 1時00分         | ①皮下注    | リプロファズ皮下注 0mg                                     | 0.00mL   |          |
|               |         | 腹部皮下に約5分かけて投与                                     |          |          |
|               |         | ※複数のシリンジで投与する場合は、へその周り5cmを外した異なる腹部四分円に連続して投与すること。 |          |          |
|               |         | ※他の部位への投与はデータが得られていない。                            |          |          |
|               |         | ※皮膚の発赤、挫傷、圧痛、硬結又は瘢痕がある部位には注射しないこと。                |          |          |
|               |         | ※患者が痛みを感じた場合は、注射速度を減速又は注射を中断する。                   |          |          |
|               |         | ※減速又は中断をしても痛みが軽減しない場合は、残りを左右逆側の腹部に投与することができる。     |          |          |
|               |         | ※必要に応じ、生理食塩液にて皮下投与セットをフラッシュすること。                  |          |          |

|     |    |         |       |           |
|-----|----|---------|-------|-----------|
| 連日； | 内服 | ラズクルーズ錠 | 0mg/回 | 1日1回 経口投与 |
|-----|----|---------|-------|-----------|

REFERENCE

B.C. Cho, S. Lu, E. Felip, et al. Amivantamab plus Lazertinib in Previously Untreated EGFR-Mutated Advanced NSCLC. N Engl J Med 2024;391:1486-98.

NB. Leighl, et al. Subcutaneous Versus Intravenous Amivantamab, Both in Combination With Lazertinib, in Refractory Epidermal Growth Factor Receptor–Mutated Non–Small Cell Lung Cancer: Primary Results From the Phase III PALOMA-3 Study. J Clin Oncol 42:3593-3605.

2026年3月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2026年3月9日

対象： 非小細胞肺癌（進行・再発） 1st Line  
レジメン名： **Ami+Laze療法(2コース目以降)(80kg以上)(SC)**

|           |              |                       |       |       |
|-----------|--------------|-----------------------|-------|-------|
|           |              | コース目                  |       |       |
| 患者 I D :  | #REF!        |                       |       |       |
| 患者氏名 :    | #REF!        |                       |       |       |
| 身長(cm)    | 体重(kg)       | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!     | #REF!        | #REF!                 | #REF! | #REF! |
| 投与スケジュール: | 1 コース 2 8 日間 |                       |       |       |
| コンパニオン:   | EGFR遺伝子変異陽性  |                       |       |       |

《 注 意 》  
対象：EGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（1st line～）  
適正使用ガイドに準じる。  
※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)  
重度のInfusion reaction（アフラキシン様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。  
※ 静脈血栓塞栓症の発症抑制の為、併用開始後4ヵ月間はアピキサバン1回2.5mg 1日2回経口投与を検討すること

《 使用 薬 剤 》  
アミバンタマブ：（リプロファズ）1600mg/V  
ラゼルチニブ：（ラズクルーズ）80mg・240mg/T

|        |              |      |         |      |
|--------|--------------|------|---------|------|
| 薬 剤 名  | 標準投与量        | 計算値  | 投与量(mg) | 投与日  |
| リプロファズ | 2240 mg/body | 2240 |         | 1,15 |
| ラズクルーズ | 240 mg/day   | 240  |         | 連日   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》  
※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|          |         |                      |
|----------|---------|----------------------|
| Day1,15； | 1月1日(土) | 1月15日(土)             |
| 0時00分    | 内服      | カロナール 200mg 4錠       |
| 0時00分    | 内服      | レスタミンコーワ錠(10mg) 5錠   |
|          |         | リプロファズ投与30分前に内服      |
| 0時30分    | ①皮下注    | リプロファズ皮下注 0mg 0.00mL |

腹部皮下に約5分かけて投与  
※複数のシリンジで投与する場合は、へその周り5cmを外した異なる腹部四分円に連続して投与すること。  
※他の部位への投与はデータが得られていない。  
※皮膚の発赤、挫傷、圧痛、硬結又は瘢痕がある部位には注射しないこと。  
※患者が痛みを感じた場合は、注射速度を減速又は注射を中断する。  
※減速又は中断をしても痛みが軽減しない場合は、残りを左右逆側の腹部に投与することができる。  
※必要に応じ、生理食塩液にて皮下投与セットをフラッシュすること。

|     |    |         |       |           |
|-----|----|---------|-------|-----------|
| 連日； | 内服 | ラズクルーズ錠 | 0mg/回 | 1日1回 経口投与 |
|-----|----|---------|-------|-----------|

REFERENCE  
B.C. Cho, S. Lu, E. Felip, et al. Amivantamab plus Lazertinib in Previously Untreated EGFR-Mutated Advanced NSCLC. N Engl J Med 2024;391:1486-98.  
NB. Leighl, et al. Subcutaneous Versus Intravenous Amivantamab, Both in Combination With Lazertinib, in Refractory Epidermal Growth Factor Receptor–Mutated Non–Small Cell Lung Cancer: Primary Results From the Phase III PALOMA-3 Study. J Clin Oncol 42:3593-3605.  
2026年3月度化学療法プロトコール審査委員会承認：2026年3月9日

対象： 非小細胞肺癌（進行・再発） 1st Line  
レジメン名： **Ami+Laze療法(2コース目以降)(80kg未満)(SC)**

|            |                |                       |       |       |
|------------|----------------|-----------------------|-------|-------|
|            | コース目           |                       |       |       |
| 患者 I D :   | #REF!          |                       |       |       |
| 患者氏名 :     | #REF!          |                       |       |       |
| 身長(cm)     | 体重(kg)         | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!      | #REF!          | #REF!                 | #REF! | #REF! |
| 投与スケジュール : | 1 コース   2 8 日間 |                       |       |       |
| コンパニオン :   | EGFR遺伝子変異陽性    |                       |       |       |

《 注 意 》  
対象：EGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（1st line～）  
適正使用ガイドに準じる。  
※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)  
重度のInfusion reaction（アフラキシン様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。  
※ 静脈血栓塞栓症の発症抑制の為、併用開始後4ヵ月間はアピキサバン1回2.5mg 1日2回経口投与を検討すること

《 使用 薬 剤 》  
アミバンタマブ：（リプロファズ） 1600mg／V  
ラゼルチニブ：（ラズクルーズ） 80mg・240mg/T

|        |              |      |         |      |
|--------|--------------|------|---------|------|
| 薬 剤 名  | 標準投与量        | 計算値  | 投与量(mg) | 投与日  |
| リプロファズ | 1600 mg/body | 1600 |         | 1,15 |
| ラズクルーズ | 240 mg/day   | 240  |         | 連日   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》  
※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。  
Day1,15； 1月1日(土) 1月15日(土)  
0時00分 内服 カロナール 200mg 4錠  
0時00分 内服 レスタミンコーワ錠(10mg) 5錠  
リプロファズ投与30分前に内服  
0時30分 ①皮下注 リプロファズ皮下注 0mg 0.00mL  
腹部皮下に約5分かけて投与  
※複数のシリンジで投与する場合は、へその周り5cmを外した異なる腹部四分円に連続して投与すること。  
※他の部位への投与はデータが得られていない。  
※皮膚の発赤、挫傷、圧痛、硬結又は瘢痕がある部位には注射しないこと。  
※患者が痛みを感じた場合は、注射速度を減速又は注射を中断する。  
※減速又は中断をしても痛みが軽減しない場合は、残りを左右逆側の腹部に投与することができる。  
※必要に応じ、生理食塩液にて皮下投与セットをフラッシュすること。

|     |    |         |       |           |
|-----|----|---------|-------|-----------|
| 連日； | 内服 | ラズクルーズ錠 | 0mg/回 | 1日1回 経口投与 |
|-----|----|---------|-------|-----------|

REFERENCE  
B.C. Cho, S. Lu, E. Felip, et al. Amivantamab plus Lazertinib in Previously Untreated EGFR-Mutated Advanced NSCLC. N Engl J Med 2024;391:1486-98.  
NB. Leighl, et al. Subcutaneous Versus Intravenous Amivantamab, Both in Combination With Lazertinib, in Refractory Epidermal Growth Factor Receptor–Mutated Non–Small Cell Lung Cancer: Primary Results From the Phase III PALOMA-3 Study. J Clin Oncol 42:3593-3605.  
2026年3月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2026年3月9日

対象： 非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）（進行・再発） 1st Line

レジメン名： **Ami+CBDCA+PEM療法(1コース目)(80kg以上)(SC)**

コース目

患者ID：

#REF!

患者氏名：

#REF!

身長(cm)

体重(kg)

体表面積(m<sup>2</sup>)

年齢(歳)

性別

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

投与スケジュール：

1コース 21日間

目標コース：

4コース施行後、Amivantamab+Pemetrexed療法を投与

使用基準：

class A

コンパニオン：

EGFR遺伝子エクソン20挿入変異；1st line～、EGFR遺伝子変異陽性；2nd line～

《 注 意 》

対象：EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能進行・再発の非小細胞肺癌（1st line～）

対象：EGFR-TKI治療歴のあるEGFR遺伝子変異陽性の切除不能進行・再発の非小細胞肺癌（2nd line～）

適正使用ガイドに準じる。

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アライバー様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

《 使用薬剤 》

アミバンタマブ：（リプロファズ）1600mg／V

カルボプラチン（CBDCA）：（カルボプラチン） 150mg／V、450mg／V

ペメトレキセド（PEM）：（ペメトレキセド） 100mg・500mg・800mg／V

《 投 与 量 》

Cre値（mg/dl）

Calvertの計算式：投与量(mg/body)＝目標AUC値×（GFR+25）

目標AUC

5

GFRはCcrを代用して計算。

薬 剤 名

標準投与量

計算値

投与量(mg)

投与日

リプロファズ

2240 mg/body

2240

1

リプロファズ

3360 mg/body

3360

8,15

カルボプラチン

5 AUC

#REF!

1

ペメトレキセド

500 mg/m2

#REF!

1

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

初回投与7日以上前に

筋注

メチコパール注500μg 2 A 筋注。以後、3クール（9週間）毎に1回投与。

内服

バンピタン末1g/日（薬酸0.5mg/日）毎日内服。

Day1：

1月1日(土)

0時00分

内服

アプレビタントカプセル 125mg 1×(1) カルボプラチン開始1時間前頃

①

生理食塩液 50mL + バロノセトロン 1V + ファモチジン 1A + デキサート 9.9mg

15 分で点滴静注

0時50分

②

生理食塩液 100mL + ペメトレキセド

0mg

0.00mL

10 分で点滴静注

1時00分

内服

カロナール 200mg 4錠

内服

レスタミンコーフ錠(10mg) 5錠

1時00分

③

5 %ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン

0mg

0.00mL

60 分で点滴静注

2時00分

④

生理食塩液 50mL

フラッシュ

2時00分

⑤皮下注

リプロファズ皮下注

0mg

0.00mL

腹部皮下に約5分かけて投与

※各投与量は15mLを超えてはならない。

※15mLを超える用量を投与する場合は、複数のシリンジに均等に分割する。

※複数のシリンジで投与する場合は、へその周り5cmを外した異なる腹部四分円に連続して投与すること。

※他の部位への投与はデータが得られていない。

※皮膚の発赤、挫傷、圧痛、硬結又は瘡痕がある部位には注射しないこと。

※患者が痛みを感じた場合は、注射速度を減速又は注射を中断する。

※減速又は中断をしても痛みが軽減しない場合は、残りを左右逆側の腹部に投与することができる。

※必要に応じ、生理食塩液にて皮下投与セットをフラッシュすること。

Day2～3：

1月2日(日)

～

1月3日(月)

起床後

内服

アプレビタントカプセル 80mg 1×(2) 起床後

Day8,15：

1月8日(土)

1時00分

内服

カロナール 200mg 4錠

1時00分

内服

レスタミンコーフ錠(10mg) 5錠

1時00分

内服

デカドロン錠4mg 2錠

リプロファズ投与1時間前に内服

2時00分

①皮下注

リプロファズ皮下注

0mg

0.00mL

腹部皮下に約5分かけて投与

※各投与量は15mLを超えてはならない。

※15mLを超える用量を投与する場合は、複数のシリンジに均等に分割する。

※複数のシリンジで投与する場合は、へその周り5cmを外した異なる腹部四分円に連続して投与すること。

※他の部位への投与はデータが得られていない。

※皮膚の発赤、挫傷、圧痛、硬結又は瘡痕がある部位には注射しないこと。

※患者が痛みを感じた場合は、注射速度を減速又は注射を中断する。

※減速又は中断をしても痛みが軽減しない場合は、残りを左右逆側の腹部に投与することができる。

※必要に応じ、生理食塩液にて皮下投与セットをフラッシュすること。

REFERENCE

C. Zhou et al. Amivantamab plus Chemotherapy in NSCLC with EGFR Exon 20 Insertions.NEJM Med 2023; 389: 2039-51

A.Passaro, J.Wang, Y.Wang, et al. Amivantamab plus chemotherapy with and without lazertinib in EGFRmutant advanced NSCLC after disease progression on osimertinib: primary results from the phase III MARIPOSA-2 study5. Ann Oncol. 2024 Jan;35(1):77-90.

2026年3月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2026年3月9日

対象： 非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）（進行・再発） 1st Line

レジメン名： **Ami+CBDCA+PEM療法(1コース目)(80kg未満)(SC)**

コース目

患者ID：

#REF!

患者氏名：

#REF!

身長(cm)

体重(kg)

体表面積(m<sup>2</sup>)

年齢(歳)

性別

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

投与スケジュール：

1コース 21日間

目標コース：

4コース施行後、Amivantamab+Pemetrexed療法を投与

使用基準：

class A

コンパニオン：

EGFR遺伝子エクソン20挿入変異；1st line～、EGFR遺伝子変異陽性；2nd line～

《 注 意 》

対象：EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能進行・再発の非小細胞肺癌（1st line～）

対象：EGFR-TKI治療歴のあるEGFR遺伝子変異陽性の切除不能進行・再発の非小細胞肺癌（2nd line～）

適正使用ガイドに準じる。

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)

重度のInfusion reaction（アライバー様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現することがある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

《 使用薬剤 》

アミバンタマブ：（リプロファズ）1600mg／V

カルボプラチン（CBDCA）：（カルボプラチン） 150mg／V、450mg／V

ペメトレキセド（PEM）：（ペメトレキセド） 100mg・500mg・800mg／V

《 投 与 量 》

Cre値（mg/dl）

Calvertの計算式：投与量(mg/body)＝目標AUC値×（GFR+25）

目標AUC

5

GFRはCcrを代用して計算。

薬 剤 名

標準投与量

計算値

投与量(mg)

投与日

リプロファズ

1600 mg/body

1600

1

リプロファズ

2400 mg/body

2400

8,15

カルボプラチン

5 AUC

#REF!

1

ペメトレキセド

500 mg/m2

#REF!

1

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

初回投与7日以上前に

筋注

メチコパール注500μg 2 A 筋注。以後、3クール（9週間）毎に1回投与。

Day1：

内服

バンビタン末1g/日（薬酸0.5mg/日）毎日内服。

Day1：

1月1日(土)

0時00分

内服

アプレビタントカプセル 125mg 1×(1) カルボプラチン開始1時間前頃

0時35分

①

生理食塩液 50mL + バロノセトロン 1V + ファモチジン 1A + デキサート 9.9mg  
15 分で点滴静注

0時50分

②

生理食塩液 100mL + ペメトレキセド 0mg 0.00mL  
10 分で点滴静注

1時00分

内服

カロナール 200mg 4錠

1時00分

内服

レスタミンコーフ錠(10mg) 5錠

1時00分

③

5 %ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン 0mg 0.00mL  
60 分で点滴静注

2時00分

④

生理食塩液 50mL  
フラッシュ

2時00分

⑤皮下注

リプロファズ皮下注 0mg 0.00mL  
腹部皮下に約5分かけて投与  
※各投与量は15mLを超えてはならない。  
※15mLを超える用量を投与する場合は、複数のシリンジに均等に分割する。  
※複数のシリンジで投与する場合は、へその周り5cmを外した異なる腹部四分円に連続して投与すること。  
※他の部位への投与はデータが得られていない。  
※皮膚の発赤、挫傷、圧痛、硬結又は瘡痕がある部位には注射しないこと。  
※患者が痛みを感じた場合は、注射速度を減速又は注射を中断する。  
※減速又は中断をしても痛みが軽減しない場合は、残りを左右逆側の腹部に投与することができる。  
※必要に応じ、生理食塩液にて皮下投与セットをフラッシュすること。

Day2～3：

1月2日(日) ～ 1月3日(月)

起床後

内服

アプレビタントカプセル 80mg 1×(2) 起床後

Day8,15：

1月8日(土)

1時00分

内服

カロナール 200mg 4錠

1時00分

内服

レスタミンコーフ錠(10mg) 5錠

1時00分

内服

デカドロン錠4mg 2錠

2時00分

①皮下注

リプロファズ皮下注 0mg 0.00mL  
腹部皮下に約5分かけて投与  
※各投与量は15mLを超えてはならない。  
※15mLを超える用量を投与する場合は、複数のシリンジに均等に分割する。  
※複数のシリンジで投与する場合は、へその周り5cmを外した異なる腹部四分円に連続して投与すること。  
※他の部位への投与はデータが得られていない。  
※皮膚の発赤、挫傷、圧痛、硬結又は瘡痕がある部位には注射しないこと。  
※患者が痛みを感じた場合は、注射速度を減速又は注射を中断する。  
※減速又は中断をしても痛みが軽減しない場合は、残りを左右逆側の腹部に投与することができる。  
※必要に応じ、生理食塩液にて皮下投与セットをフラッシュすること。

REFERENCE

C. Zhou et al. Amivantamab plus Chemotherapy in NSCLC with EGFR Exon 20 Insertions.NEJM Med 2023; 389: 2039-51

A.Passaro, J.Wang, Y.Wang, et al. Amivantamab plus chemotherapy with and without lazertinib in EGFRmutant advanced NSCLC after disease progression on osimertinib: primary results from the phase III MARIPOSA-2 study5. Ann Oncol. 2024 Jan;35(1):77-90.

2026年3月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2026年3月9日

対象： 非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）（進行・再発） 1st Line  
レジメン名： **Ami+CBDCA+PEM療法(2-4コース目)(80kg以上)(SC)**

コース目

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1コース　2 1日間                                        |
| 目標コース：    | <b>4コース施行後、Amivantamab+Pemetrexed療法を投与</b>        |
| 使用基準：     | class A                                           |
| コンパニオン：   | EGFR遺伝子エクソン20挿入変異；1st line～、EGFR遺伝子変異陽性；2nd line～ |

《 注 意 》  
対象：EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（1st line～）  
対象：EGFR-TKI治療歴のあるEGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（2nd line～）  
適正使用ガイドに準じる。  
※ **Infusion reaction**に要注意。　投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)  
重度のInfusion reaction（アライアシー様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現すること  
がある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

《 使 用 薬 剤 》  
アミバンタマブ：（リプロファズ） 1600mg／V  
カルボプラチン（CBDCA）：（カルボプラチン） 150mg／V、450mg／V  
ペメトレキシド（PEM）：（ペメトレキシド） 100mg・500mg・800mg／V

|             |               |                                          |         |     |  |
|-------------|---------------|------------------------------------------|---------|-----|--|
| Cre値（mg/dl） |               | Calvertの計算式：投与量(mg/body)＝目標AUC値×(GFR+25) |         |     |  |
| 目標AUC       | 5             | GFRはCcrを代用して計算。                          |         |     |  |
| 薬　剤　名       | 標準投与量         | 計算値                                      | 投与量(mg) | 投与日 |  |
| リプロファズ      | 3360　　mg/body | 3360                                     |         | 1   |  |
| カルボプラチン     | 5　　AUC        | #REF!                                    |         | 1   |  |
| ペメトレキシド     | 500　　mg/m2    | #REF!                                    |         | 1   |  |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》  
※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|       |             |                                       |                                           |               |
|-------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
|       |             | 初回投与 <b>7 日以上前</b> に                  |                                           |               |
|       |             | <b>筋注</b>                             | メチコバール注500 μ g 2 A 筋注。以後、3クール（9週間）毎に1回投与。 |               |
|       |             | <b>内服</b>                             | バンピタン末1 g /日（葉酸 0.5mg/日）毎日内服。             |               |
| Day1； | 1月1日(土)     |                                       |                                           |               |
| 0時00分 | <b>内服</b>   | アプレビタントカプセル 125mg 1 × (1)             | カルボプラチン開始 1 時間前頃                          |               |
| 0時35分 | ①           | 生理食塩液 50mL + バロノセトロン 1V + デキサート 9.9mg |                                           |               |
|       |             | 15 分で点滴静注                             |                                           |               |
| 0時50分 | ②           | 生理食塩液 100mL + <b>ペメトレキシド</b>          | <b>0mg</b>                                | <b>0.00mL</b> |
|       |             | 10 分で点滴静注                             |                                           |               |
| 1時00分 | <b>内服</b>   | カロナール 200mg 4 錠                       |                                           |               |
| 1時00分 | <b>内服</b>   | レスタミンコーワ錠(10mg) 5 錠                   |                                           |               |
| 1時00分 | ③           | 5 %ブドウ糖液 250mL + <b>カルボプラチン</b>       | <b>0mg</b>                                | <b>0.00mL</b> |
|       |             | 60 分で点滴静注                             |                                           |               |
| 2時00分 | ④           | 生理食塩液 50mL                            |                                           |               |
|       |             | フラッシュ                                 |                                           |               |
| 2時00分 | <b>⑤皮下注</b> | <b>リプロファズ皮下注</b>                      | <b>0mg</b>                                | <b>0.00mL</b> |
|       |             | 腹部皮下に約5分かけて投与                         |                                           |               |
|       |             | ※各投与量は15mL を超えてはならない。                 |                                           |               |
|       |             | ※15mL を超える用量を投与する場合は、複数のシリンジに均等に分割する。 |                                           |               |
|       |             | ※複数のシリンジで投与する場合は、へその周り5cm を外した異なる     |                                           |               |
|       |             | 腹部四分円に連続して投与すること。                     |                                           |               |
|       |             | ※他の部位への投与はデータが得られていない。                |                                           |               |
|       |             | ※皮膚の発赤、挫傷、圧痛、硬結又は瘢痕がある部位には注射しないこと。    |                                           |               |
|       |             | ※患者が痛みを感じた場合は、注射速度を減速又は注射を中断する。       |                                           |               |
|       |             | ※減速又は中断をしても痛みが軽減しない場合は、残りを左右逆側の腹部に    |                                           |               |
|       |             | 投与することができる。                           |                                           |               |
|       |             | ※必要に応じ、生理食塩液にて皮下投与セットをフラッシュすること。      |                                           |               |

|         |           |                          |         |
|---------|-----------|--------------------------|---------|
| Day2～3； | 1月2日(日)   | ～                        | 1月3日(月) |
| 起床後     | <b>内服</b> | アプレビタントカプセル 80mg 1 × (2) | 起床後     |

REFERENCE

C. Zhou et al. Amivantamab plus Chemotherapy in NSCLC with EGFR Exon 20 Insertions.NEJM Med 2023; 389: 2039-51

A.Passaro, J.Wang, Y.Wang, et al. Amivantamab plus chemotherapy with and without lazertinib in EGFRmutant advanced NSCLC after disease progression on osimertinib: primary results from the phase III MARIPOSA-2 study5. Ann Oncol. 2024 Jan;35(1):77-90.

2026年3月度化学療法プロトコール審査委員会承認：2026年3月9日

対象： 非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）（進行・再発） 1st Line  
レジメン名： **Ami+CBDCA+PEM療法(2-4コース目)(80kg未満)(SC)**

コース目

|         |       |
|---------|-------|
| 患者 I D： | #REF! |
| 患者氏名：   | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1コース 21日間                                         |
| 目標コース：    | 4コース施行後、Amivantamab+Pemetrexed療法を投与               |
| 使用基準：     | class A                                           |
| コンパニオン：   | EGFR遺伝子エクソン20挿入変異；1st line～、EGFR遺伝子変異陽性；2nd line～ |

《 注 意 》  
対象：EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（1st line～）  
対象：EGFR-TKI治療歴のあるEGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（2nd line～）  
適正使用ガイドに準じる。  
※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)  
重度のInfusion reaction（アライアシー様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現すること  
がある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

《 使 用 薬 剤 》  
アミバンタマブ：（リプロファズ） 1600mg／V  
カルボプラチン（CBDCA）：（カルボプラチン） 150mg／V、450mg／V  
ペメトレキシド（PEM）：（ペメトレキシド） 100mg・500mg・800mg／V

|             |              |                                          |         |     |   |
|-------------|--------------|------------------------------------------|---------|-----|---|
| Cre値（mg/dl） |              | Calvertの計算式：投与量(mg/body)＝目標AUC値×(GFR+25) |         |     |   |
| 目標AUC       | 5            | GFRはCcrを代用して計算。                          |         |     |   |
| 薬 剤 名       | 標準投与量        | 計算値                                      | 投与量(mg) | 投与日 |   |
| リプロファズ      | 2400 mg/body | 2400                                     |         |     | 1 |
| カルボプラチン     | 5 AUC        | #REF!                                    |         |     | 1 |
| ペメトレキシド     | 500 mg/m2    | #REF!                                    |         |     | 1 |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

初回投与 7 日以上前に

筋注

メチコバール注500 μ g 2 A 筋注。以後、3クール（9週間）毎に1回投与。

内服

バンピタン末1 g / 日（葉酸 0.5mg / 日）毎日内服。

Day1；

1月1日(土)

0時00分

0時35分

0時50分

1時00分

1時00分

1時00分

2時00分

2時00分

①

②

③

④

④皮下注

アプレビタントカプセル 125mg 1 × (1) カルボプラチン開始 1 時間前頃

生理食塩液 50mL + バロノセトロン 1V + デキサート 9.9mg

15 分で点滴静注

生理食塩液 100mL + ペメトレキシド 0mg 0.00mL

10 分で点滴静注

カロナール 200mg 4 錠

レスタミンコーワ錠(10mg) 5 錠

5 %ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン 0mg 0.00mL

60 分で点滴静注

生理食塩液 50mL

フラッシュ

リプロファズ皮下注 0mg 0.00mL

腹部皮下に約5分かけて投与

※各投与量は15mL を超えてはならない。

※15mL を超える用量を投与する場合は、複数のシリンジに均等に分割する。

※複数のシリンジで投与する場合は、へその周り5cm を外した異なる腹部四分円に連続して投与すること。

※他の部位への投与はデータが得られていない。

※皮膚の発赤、挫傷、圧痛、硬結又は瘢痕がある部位には注射しないこと。

※患者が痛みを感じた場合は、注射速度を減速又は注射を中断する。

※減速又は中断をしても痛みが軽減しない場合は、残りを左右逆側の腹部に投与することができる。

※必要に応じ、生理食塩液にて皮下投与セットをフラッシュすること。

|         |         |                              |         |
|---------|---------|------------------------------|---------|
| Day2～3； | 1月2日(日) | ～                            | 1月3日(月) |
| 起床後     | 内服      | アプレビタントカプセル 80mg 1 × (2) 起床後 |         |

REFERENCE

C. Zhou et al. Amivantamab plus Chemotherapy in NSCLC with EGFR Exon 20 Insertions.NEJM Med 2023; 389: 2039-51

A.Passaro, J.Wang, Y.Wang, et al. Amivantamab plus chemotherapy with and without lazertinib in EGFRmutant advanced NSCLC after disease progression on osimertinib: primary results from the phase III MARIPOSA-2 study5. Ann Oncol. 2024 Jan;35(1):77-90.

2026年3月度化学療法プロトコール審査委員会承認：2026年3月9日

対象： 非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）（進行・再発） 1st Line  
レジメン名： **Ami+PEM維持療法(80kg以上)(SC)**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間                                      |
| 使用基準：     | class A                                           |
| コンパニオン：   | EGFR遺伝子エクソン20挿入変異；1st line～、EGFR遺伝子変異陽性；2nd line～ |

《 注 意 》

対象：EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（1st line～）  
対象：EGFR-TKI治療歴のあるEGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（2nd line～）  
適正使用ガイドに準じる。

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)  
重度のInfusion reaction（アフィキソン様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現すること  
がある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

《 使用 薬 剤 》

アミバンタマブ：（リプロファズ）1600mg／V  
ペメトレキシド（PEM）：（ペメトレキシド） 100mg・500mg・800mg／V

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名   | 標準投与量        | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|---------|--------------|-------|---------|-----|
| リプロファズ  | 3360 mg/body | 3360  |         | 1   |
| ペメトレキシド | 500 mg/m2    | #REF! |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|              |         |                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|---------|----------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 初回投与 7 日以上前に |         |                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 筋注           |         | メチコパール注500μ g 2 A 筋注。以後、3クール（9週間）毎に1回投与。           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 内服           |         | バンピタン末1 g / 日（葉酸 0.5mg/日）毎日内服。                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Day1；        | 1月1日(土) |                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0時00分        | 内服      | カロナール 200mg 4 錠                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0時00分        | 内服      | レスタミンコーワ錠(10mg) 5 錠                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0時05分        | ①       | 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1A + デキサート 9.9mg<br>15 分で点滴静注 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0時20分        | ②       | 生理食塩液 100mL + ペメトレキシド                              | 0mg | 0.00mL<br>10 分で点滴静注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0時30分        | ③       | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0時30分        | ④皮下注    | リプロファズ皮下注                                          | 0mg | 0.00mL<br>腹部皮下に約5分かけて投与<br>※各投与量は15mL を超えてはならない。<br>※15mL を超える用量を投与する場合は、複数のシリンジに均等に分割する。<br>※複数のシリンジで投与する場合は、へその周り5cm を外した異なる<br>腹部四分円に連続して投与すること。<br>※他の部位への投与はデータが得られていない。<br>※皮膚の発赤、挫傷、圧痛、硬結又は瘻痕がある部位には注射しないこと。<br>※患者が痛みを感じた場合は、注射速度を減速又は注射を中断する。<br>※減速又は中断をしても痛みが軽減しない場合は、残りを左右逆側の腹部に<br>投与することができる。<br>※必要に応じ、生理食塩液にて皮下投与セットをフラッシュすること。 |

REFERENCE

C. Zhou et al. Amivantamab plus Chemotherapy in NSCLC with EGFR Exon 20 Insertions.NEJM Med 2023; 389: 2039-51  
A.Passaro, J.Wang, Y.Wang, et al. Amivantamab plus chemotherapy with and without lazertinib in EGFRmutant  
advanced NSCLC after disease progression on osimertinib: primary results from the phase III MARIPOSA-2  
study5. Ann Oncol. 2024 Jan;35(1):77-90.

対象： 非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）（進行・再発） 1st Line  
レジメン名： **Ami+PEM維持療法(80kg未満)(SC)**

|  |      |
|--|------|
|  | コース目 |
|--|------|

|       |       |
|-------|-------|
| 患者ID： | #REF! |
| 患者氏名： | #REF! |

|        |        |                       |       |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 年齢(歳) | 性別    |
| #REF!  | #REF!  | #REF!                 | #REF! | #REF! |

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 投与スケジュール： | 1 コース 2 1 日間                                      |
| 使用基準：     | class A                                           |
| コンパニオン：   | EGFR遺伝子エクソン20挿入変異；1st line～、EGFR遺伝子変異陽性；2nd line～ |

《 注 意 》

対象：EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（1st line～）  
対象：EGFR-TKI治療歴のあるEGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（2nd line～）  
適正使用ガイドに準じる。

※ **Infusion reaction**に要注意。 投与中はVital signのチェック(Monitor装着を推奨)  
重度のInfusion reaction（アフィキソン様症状、血管浮腫、気管支痙攣、発熱、悪寒、呼吸困難、低血圧等）が発現すること  
がある。2回目以降の投与時に初めて発現することもある。

《 使用 薬 剤 》

アミバンタマブ：（リプロファズ）1600mg／V  
ペメトレキシド（PEM）：（ペメトレキシド）100mg・500mg・800mg／V

《 投 与 量 》

| 薬 剤 名   | 標準投与量        | 計算値   | 投与量(mg) | 投与日 |
|---------|--------------|-------|---------|-----|
| リプロファズ  | 2400 mg/body | 2400  |         | 1   |
| ペメトレキシド | 500 mg/m2    | #REF! |         | 1   |

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

|        |         |                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         | 初回投与 7 日以上前に                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |         | 筋注                                                 | メチコパール注500 μ g 2 A 筋注。以後、 3 クール（ 9 週間） 毎に 1 回投与。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |         | 内服                                                 | バンピタン末1 g / 日（葉酸 0.5mg/日） 毎日内服。                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Day1 ； | 1月1日(土) |                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0時00分  | 内服      | カロナール 200mg 4 錠                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0時00分  | 内服      | レスタミンコーワ錠(10mg) 5 錠                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0時05分  | ①       | 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1A + デキサート 9.9mg<br>15 分で点滴静注 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0時20分  | ②       | 生理食塩液 100mL + ペメトレキシド                              | 0mg                                              | 0.00mL<br>10 分で点滴静注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0時30分  | ③       | 生理食塩液 50mL<br>フラッシュ                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0時30分  | ④皮下注    | リプロファズ皮下注                                          | 0mg                                              | 0.00mL<br>腹部皮下に約5分かけて投与<br>※各投与量は15mL を超えてはならない。<br>※15mL を超える用量を投与する場合は、複数のシリンジに均等に分割する。<br>※複数のシリンジで投与する場合は、へその周り5cm を外した異なる<br>腹部四分円に連続して投与すること。<br>※他の部位への投与はデータが得られていない。<br>※皮膚の発赤、挫傷、圧痛、硬結又は瘻痕がある部位には注射しないこと。<br>※患者が痛みを感じた場合は、注射速度を減速又は注射を中断する。<br>※減速又は中断をしても痛みが軽減しない場合は、残りを左右逆側の腹部に<br>投与することができる。<br>※必要に応じ、生理食塩液にて皮下投与セットをフラッシュすること。 |

REFERENCE

C. Zhou et al. Amivantamab plus Chemotherapy in NSCLC with EGFR Exon 20 Insertions.NEJM Med 2023; 389: 2039-51  
A.Passaro, J.Wang, Y.Wang, et al. Amivantamab plus chemotherapy with and without lazertinib in EGFRmutant  
advanced NSCLC after disease progression on osimertinib: primary results from the phase III MARIPOSA-2  
study5. Ann Oncol. 2024 Jan;35(1):77-90.

2026年3月度化学療法プロトコール審査委員会承認：2026年3月9日