

Index

脳腫瘍

レジメン名	レジメンシート
Bevacizumab療法	シート

対象： 悪性神経膠腫(進行・再発) 1st Line

レジメン名： **Bevacizumab療法**

コース目

患者ID：	#REF!
患者氏名：	#REF!

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(m ²)	年齢(歳)	性別
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

投与スケジュール：	1 コース 14日
-----------	-----------

《 注 意 》

適正使用ガイドに準じる。

※ 投与前に凝固系(PT-INR,D-ダイマー,等)の検査を実施し、投与中にも必要に応じ検査を行うこと。

※ 原則、埋め込み式ポート挿入後1週間以上、腹部手術前後は6週間以上空けて投与。

※ ショック、アナフィラキシー様症状、Infusion reaction発現に要注意。

《 使用薬剤 》

ベバシズマブ：（アバスチン） 100mg/4mL/V、400mg/16mL/V

《 投 与 量 》

薬 剤 名	標準投与量	計算値	投与量(mg)	投与日
アバスチン	10 mg/kg	#REF!		1

《 タイムスケジュール：開始時刻 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

Day1；	1月1日(土)
0時00分	① 生理食塩液 50mL 血管確保用で速度適宜にて点滴静注
0時05分	② 生理食塩液 100mL + アバスチン 0mg 0.00mL 90分で点滴静注 (初回は90分、2回目以降は60分・30分に変更可)
1時35分	③ 生理食塩液 50mL フラッシュ

REFERENCE

Olivier L. Chinot,M.D., Wolfgang Wick,M.D., Warren Mason,M.D.,et al:N Ehl J Med 2014;370:709-22
Bevacizumab plus Radiotherapy-Temozolomide for Newly Diagnosed Glioblastoma
Motoo Nagane, Ryo Nishikawa, Yoshitaka Narita,et al:Jpn J Clin Oncol 2012;42(10)887-895
Phase II Study of Single-agent Bevacizumab in Japanese Patients with Recurrent Malignant Glioma
化学療法プロトコール審査委員会承認：2015年8月10日