

非小細胞肺癌（進行・再発） 1st Line
CBDCA+PEM療法

コース目

患者ID: @PATIENTID

年齢: [AGE] 歳

患者氏名: @PATIENTNAME

性別: [GENDER]

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m ²)
HEIGHT01_Dc	HEIGHT01_Dc	#VALUE!

投与スケジュール: 1コース 21日間 目標コース数: 6コース

使用基準: class A (扁平上皮癌への使用は避けること。)

《使用薬剤》

カルボプラチン (CBDCA) : (カルボプラチン) 150mg/V、450mg/V

ペメトレキセド (PEM) : (ペメトレキド) 100mg・500mg/V

投与量: CBDCA投与量はAUCより算出

Cre値 (mg/dl)	目標AUC (mg・min/ml)
	5.0

Calvertの計算式: 投与量 (mg/body) = 目標AUC値 × (GFR+25)
GFRはCcrを代用して計算。

薬剤名	標準投与量	計算値 (mg)	投与量 (mg)
カルボプラチン (CBDCA)	AUC 5mg・min/mL	#VALUE!	
ペメトレキセド (PEM)	500 mg/m ²	#VALUE!	

《タイムスケジュール: 開始時刻》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

初回投与7日以上前に

- メチコバル注500μg 2A筋注。以後、3クール（9週間）毎に1回投与。
- パンビタン末1g/日（葉酸 0.5mg/日）毎日内服。

開始日: 8月6日 (木)

0時00分	内服	アプレピタントカプセル 125mg 1×(1)	カルボプラチン開始 1時間前頃
0時35分		① 生理食塩液 50mL + アロキシ 1V + デキサート 6.6mg	
		15分で点滴静注	
day1 0時50分		② 生理食塩液 100mL + ペメトレキド	0mg
		10分で点滴静注	
1時00分		③ 5%ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン	0mg
		60分で点滴静注	0.0mL
2時00分		④ 生理食塩液 50mL	
		フラッシュ	

day2~3: 8月7日 (金) ~ 8月8日 (土)

起床後 内服 アプレピタントカプセル 80mg 1×(2) 起床後

REFERENCE

Bjorn H. Gronberg, Roy M. Bremnes, Oystein Flotten, et al : J Clin Oncol 27 : 3217-3224, 2009
Phase III study by the Norwegian lung cancer study group: pemetrexed plus carboplatin compared with gefitinib plus carboplatin as first-line chemotherapy in advanced non-small-cell lung cancer
2011年11月度化学療法プロトコール審査委員会承認: 2011年11月14日 更新: 2019年2月18日