非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）　（進行・再発）　1st Line

PTX+CBDCA+Bevacizumab療法

ｺｰｽ目

患者ＩＤ：　@PATIENTID　　年齢　TIENTAGE歳

患者氏名　：　@PATIENTNAME　　性別　ATIENTSE

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(㎡)
HEIGHT01_Do	WHEIGHT01_Do	#VALUE!

アルコールアレルギー　必ず無しを確認し選択

投与ｽｹｼﾞｭｰﾙ：　１コース　２１日間

使 用 基 準： class Ａ

※ 喀血（2.5mL以上の鮮血の喀血）の既往のある患者には禁忌。

※ ベバシズマブ添付文書及び適性使用ガイドに準じて投与すること。

※ 原則、埋め込み式ポート挿入後１週間以上、腹部手術前後は６週間以上空けて投与。

※ ショック、アナフィラキシー様症状、Infusion reaction発現に要注意。

《 使 用 薬 剤 》

カルボプラチン（CBDCA）：（カルボプラチン）　150mg/15mL/V、450mg/45mL/V

パクリタキセル（PTX）：（パクリタキセル）　30mg/5mL/V、100mg/16.7mL/V

ベバシズマブ（BEV）：（ベバシズマブ）　100mg/4mL/V、400mg/16mL/V

投与量： Ccr実測値 or Ccr値を選択。CBDCA投与量はAUCより算出。

Cre値（mg/dl）	目標AUC(mg･min/ml)
	6.0

Calvertの計算式：　投与量(mg/body)＝目標AUC値×(GFR+25)　※GFRはCcrを代用。

薬剤名	標準投与量	計 算 値(mg)	投 与 量(mg)
パクリタキセル(PTX)	200mg/㎡	#VALUE!	
カルボプラチン(CBDCA)	AUC 6mg･min/mL	#VALUE!	
ベバシズマブ(BEV)	15mg/kg	#VALUE!	

<<　タイムスケジュール：開始時刻　>>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

開始日；　1月1日　（金）　Day1

0時00分　**内服** レスタミンコーワ錠(10mg)　５錠　**点滴直前に内服**

① 生理食塩液50mL ＋ ガスター 1A ＋ デキサート 16.5mg

15分で点滴静注

0時15分　② 生理食塩液 100mL ＋ アロキシ 1V

30分で点滴静注

0時45分　③ 生理食塩液 500mL　＋　**パクリタキセル**　**0mg**

0.22μ以下のﾌｨﾙﾀｰ一体型輸液ｾｯﾄを使用する　0.0mL

3時間で点滴静注

3時45分　④ ５％ブドウ糖液 250mL　＋　**カルボプラチン**　**0mg**

60分で点滴静注　0.0mL

4時45分　⑤ 生理食塩液 100mL　＋　**ベバシズマブ**　**0mg**

90 分で点滴静注　0.0mL

（初回は90分、２回目以降は60分・30分に変更可）

6時15分　⑥ 生理食塩液 50mL

フラッシュ

REFERENCE

1. Alan Sandler, M.D., Robert Gray, Ph.D., Michael C. Perry, M.D., et al : N Engl J Med 2006;355:2542-2550
Paclitaxel-carboplatin alone or with bevacizumab for non-small-cell-lung cancer.

2. M. Nishio, T. Horai, H. Kunitoh, et al:J Clin Oncol 27:15s, 2009
Randomized, open-label, multicenter phase Ⅱ study of bevacizumab in combination with carboplatin and paclitaxel in chemotherapy-naive Japanese patients with advanced or recurrent nonsquamous non-small cell lung cancer (NSCLC):JO19907.