

# 非小細胞肺癌（進行・再発） 1st Line CBDCA+S-1療法

コース目

患者ID: @PATIENTID

年齢: @PATIENTAGE 歳

患者氏名: @PATIENTNAME

性別: @PATIENTSEX

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(m <sup>2</sup> )
HEIGHT01_Dc	HEIGHT01_Dc	#VALUE!

投与スケジュール: 1コース 21日間

目標コース数: 6コース

使用基準: class A

## 《使用薬剤》

カルボプラチン (CBDCA) : (カルボプラチン) 150mg/15mL/V、450mg/45mL/V

パクリタキセル・ギメシル・オキサリピン (S-1) : 20mg・25mg/T

投与量: CBDCA投与量はAUCより算出

Cre値 (mg/dl)	目標AUC (mg・min/ml)
	5.0

Calvertの計算式: 投与量 (mg/body) = 目標AUC値 × (GFR+25)  
GFRはCcrを代用して計算。

薬剤名	標準投与量	計算値 (mg)	投与量 (mg)	投与日
カルボプラチン (CBDCA)	AUC 5mg・min/mL	#VALUE!		1
S-1	80 mg/m <sup>2</sup>	#VALUE!		1(夕)~15(朝)

<< タイムスケジュール: 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

## ※ 内服薬は1日目夕食後より内服開始

内服薬 **内服** パクリタキセル・ギメシル・オキサリピン **0mg** 朝・夕食後 Day 1 (夕)~15(朝)

開始日: 8月6日 (木)

0時00分 ① 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1A + デキサート 13.2mg  
15分で点滴静注

day1 0時15分 ② 5%ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン **0mg**  
60分で点滴静注 *0.0mL*

1時15分 ③ 生理食塩液 50mL  
フラッシュ

## REFERENCE

Isamu Okamoto, Hiroshige Yoshioka, Satoshi Morita, et al : J Clin Oncol 28 : 5240-5246, 2010  
Phase III trial comparing oral S-1 plus Carboplatin with Paclitaxel plus Carboplatin in chemotherapy-naïve patients with advanced non-small-cell lung cancer: results of a west japan oncology group study  
2011年12月度化学療法プロトコル審査委員会承認: 2011年12月19日