

# 非小細胞肺癌（進行・再発） 1st Line

## CDDP+PEM療法(short hydration)

コース目

患者ID: @PATIENTID

患者氏名: @PATIENTNAME

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m <sup>2</sup> )
HEIGHT01_Dc	HEIGHT01_Dc	#VALUE!

投与スケジュール: 1コース 21日間

目標コース数: 6コース

使用基準: class A

扁平上皮癌への使用は避けること

指示: 体重測定 毎日起床時

注意: Day4以降も水分摂取が少ない場合や尿量が少ない場合には、輸液を考慮すること

### 《使用薬剤》

ペメトレキセド: (ペメトレキド) 100mg・500mg/V

シスプラチン; (CDDP): シスプラチン注 (50mg/100mL/V、10mg/20mL/V)

### 投与量:

薬剤	投与量	計算値	投与量 (mg)	投与日
ペメトレキド	500 mg/m <sup>2</sup>	#VALUE!		1
シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	#VALUE!		1

### << タイムスケジュール: 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

初回投与7日以上前に

- ① メチコバル注500μg 2A筋注。以後、3クール（9週間）毎に1回投与。
- ② パンビタン末1g/日（葉酸 0.5mg/日）毎日内服。

開始日: 1月1日 (金) Day1

0時00分	① 生理食塩液 500mL + 硫酸Mg補正液 8mL 1時間で点滴静注
1時00分	② ソリタ T 3号 500mL 1時間で点滴静注
1時55分	<b>内服</b> アプレピタントカプセル 125mg 1×(1) シスプラチン開始1時間前頃
2時00分	③ 生理食塩液 50mL + アロキシ 1V + デキサート 9.9mg 15分で点滴静注
2時15分	④ 生理食塩液 100mL + ペメトレキド 0mg 10分で点滴静注
2時25分	⑤ マンニトール 300mL 30分で点滴静注
2時55分	⑥ 生理食塩液 700mL + シスプラチン 0mg 90分で点滴静注 0.0mL
4時25分	⑦ 生理食塩液 500mL 1時間で点滴静注
5時25分	⑧ ソリタ T 3号 500mL 1時間で点滴静注

Day2~3: 1月2日 (土) ~ 1月3日 (日)

起床後 **内服** アプレピタントカプセル 80mg 1×(2) 起床後

2時15分	① 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg 15分で点滴静注
2時30分	② ソリタ T 3号 500mL×3 4.5時間 (1.5時間×3) で点滴静注

### REFERENCE

Giorgio Vittorio Scagliotti, Purvish Parikh, Joachim von Pawel, et al: J Clin Oncol 26: 3543-3551, 2008  
Phase III study comparing cisplatin plus gemcitabine with cisplatin plus pemetrexed in chemotherapy-naïve patients with advanced-stage non-small-cell-lung cancer.

第9回化学療法プロトコル審査委員会承認: 2009年8月6日 更新: 2011年11月14日 (SH), 2016年7月14日