

非小細胞肺癌（進行・再発） 2nd Line
DTX単独療法

()コース目

患者ID: @PATIENTID

患者氏名: @PATIENTNAME

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m ²)
\$HEIGHT01_Doc	WHEIGHT01_Do	#VALUE!

投与スケジュール: 1コース 21~28日

使用基準: class A

《使用薬剤》

ドセタキセル (DTX) : ドセタキセル点滴静注 (1V: 20mg、80mg)

投与量:

薬剤	標準投与量	計算値 (mg)	投与量 (mg)	投与日
ドセタキセル	60 mg/m ²	#VALUE!		1

<< タイムスケジュール: 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

day1

6月11日 (木)

0時00分 ① 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1A + デキサート 13.2mg
15分で点滴静注

0時15分 ② 生理食塩液 250mL + ドセタキセル mg
要注意 60分で点滴静注
注)点滴開始から10分間は点滴速度を遅めに設定して、全身状態を観察する。

1時15分 ③ 生理食塩液 50mL (フラッシュ)
フラッシュ

REFERENCE

Frances A. Shepherd, Janet Dancey, Rodryg Ramlau, et al: Prospective randomized trial of docetaxel versus best supportive care in patients with non-small-cell lung cancer previously treated with platinum-based chemotherapy. J Clin Oncol 18: 2095-2103, 2000

第3回化学療法プロトコル審査委員会承認: 2008年12月5日 更新: 2016年11月17日