

非小細胞肺癌（進行・再発） 1st Line プラチナ製剤不耐または高齢者

# GEM単独療法

( )コース目

患者ID : @PATIENTID

患者氏名 : @PATIENTNAME

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m <sup>2</sup> )
\$HEIGHT01_Doc	\$WEIGHT01_Doc	#VALUE!

投与スケジュール : 1コース 28日。 day 1、8、15 に点滴。

使用基準 : 開始時 ; class A。以降 ; class C。

《使用薬剤》

ゲムシタビン (GEM) : ゲムシタビン点滴静注用「ヤルト」 (1V:200mg, 1g)

投与量 :

薬剤	標準投与量	計算値 (mg)	投与量 (mg)
ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	#VALUE!	

<< タイムスケジュール : 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

day1	10月28日	(水)	0時00分	①	生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg 15分で点滴静注
			0時15分	②	生理食塩液 100mL + ゲムシタビン mg 30分で点滴静注
			0時45分	③	生理食塩液 50mL フラッシュ

day8 同様に行う

day15

day22 --- 休 薬 ---

## REFERENCE

H Anderson, P Hopwood, RJ Stephens, et al : British Journal of Cancer (2000) 83(4), 447-453  
Gemcitabine plus best supportive care (BSC) vs BSC in inoperable non-small cell lung cancer  
- a randomized trial with quality of life as primary outcome  
第10回プロトコル審査委員会承認 : 2009年10月28日