

非小細胞肺癌（進行・再発） 2nd Line

PEM単独療法

患者ID: @PATIENTID

患者氏名: @PATIENTNAME

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(m ²)
HEIGHT01_D0	HEIGHT01_D0	#VALUE!

投与スケジュール: 1コース 21日間

使用基準: class A

扁平上皮癌への使用は避けること

《使用薬剤》

ペメトレキセド: (ペメトレキセド) 100mg・500mg/V

投与量:

薬剤	投与量	計算値	投与量(mg)	投与日
ペメトレキセド	500 mg/m ²	#VALUE!		1

<< タイムスケジュール: 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

初回投与7日以上前に

- ① メチコバル注500μg 2A筋注。以後、3クール（9週間）毎に1回投与。
- ② パンビタン末 1g/日（葉酸 0.5mg/日）毎日内服。

開始日: 8月6日 (木) Day1

0時00分 ① 生理食塩液 50mL + グラネセロン 1A + デキサート 6.6mg
15分で点滴静注

0時15分 ② 生理食塩液 100mL + ペメトレキセド 0mg
10分で点滴静注

0時25分 ③ 生理食塩液 50mL
フラッシュ

REFERENCE

Nasser Hanna, Frances A. Shepherd, Frank V. Fossella, et al: J Clin Oncol 22: 1589-1597, 2004
Randomized phase III trial of pemetrexed versus docetaxel in patients non-small-cell-lung cancer previously treated with chemotherapy
第9回化学療法プロトコール審査委員会承認:2009年8月6日 更新:2019年2月18日

目次

therapy.