

非小細胞肺癌 (進行・再発) 1st Line プラチナ製剤不耐または高齢者 VNR単独療法

()コース目

患者ID : @PATIENTID

患者氏名 : @PATIENTNAME

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m ²)
\$HEIGHT01_Doc	\$WEIGHT01_Doc	#VALUE!

投与スケジュール : 1コース 21日。 day 1、8 に点滴。

使用基準 : class C

《使用薬剤》

ビノレルビン (VNR) : (ビノレルビン) 10mg/1mL/V、40mg/4mL/V

投与量 :

薬剤	標準投与量	計算値 (mg)	投与量 (mg)
ビノレルビン (VNR)	25 mg/m ²	#VALUE!	

<< タイムスケジュール : 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

day1	10月28日 (水)			
	0時00分	① 生理食塩液 50mL 15分で点滴静注		
	0時15分	② 生理食塩液 50mL + ビノレルビン 全開 10分以内で点滴静注 終了後、直ちに生食250mLを開始 <u>※血管痛、静脈炎に注意!</u>	mg	0.0 ml
	0時25分	③ 生理食塩液 250mL (ビノレルビン終了後直ちに) 全開 20分以内で点滴静注		

day8 同様に行う

day15 ー ー ー 休 薬 ー ー ー

REFERENCE

Shinzoh Kudoh, Koji Takeda, Kazuhiro Nakagawa, et al : J Clin Oncol 24: 3657-3663 (2006)
Phase III study of docetaxel compared with vinorelbine in elderly patients with advanced non-small-cell lung cancer
: Results of the West Japan Thoracic Oncology Group Trial (WJTOG 9904).
第10回プロトコール審査委員会承認 : 2009年10月28日 更新: 2011年2月14日