

肺小細胞癌（進行・再発） 準1st、2nd Line AMR単独療法

患者ID : @PATIENTID

コース目

患者氏名 : @PATIENTNAME

| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m ²) |
|-------------|-------------|-----------------------|
| HEIGHT01_Dc | HEIGHT01_Dc | #VALUE! |

投与スケジュール : 1コース 21日間

使用基準 : class A (次回以降 class B)

《使用薬剤》

アムルビシン (AMR) : (アムルビシン) 50mg/V、20mg/V

投与量 : 準1st Lineでは45mg/m²、2nd Lineでは40mg/m²を推奨。

| 薬剤 | 投与量 | 計算値 | 投与量(mg) | 投与日 |
|--------|----------------------|---------|---------|-----|
| アムルビシン | 40 mg/m ² | #VALUE! | | 1~3 |

<< タイムスケジュール : 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

開始日 : 6月11日 (木) ~ 6月13日 (土)

- 0時00分 ① 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1A + デキサート 6.6mg
15分で点滴静注
- 0時15分 ② 生理食塩液 50mL
5分で点滴投与 (全開)
- 0時20分 ③ 生理食塩液 50mL + アムルビシン 0mg
全開 (10分以内) で点滴静注
- 0時30分 ④ 生理食塩液 250mL
30分で点滴静注

REFERENCE

Sayaka Onoda, Noriyuki Masuda, Takashi Seto, et al

Phase III trial of amrubicin for treatment of refractory or relapsed small-cell lung cancer
:Thoracic oncology research group study 0301.

J Clin Oncol 24 : 5448-5453, 2006

第8回化学療法プロトコル審査委員会承認 : 2009年6月11日 更新:2011年2月14日