

# 肺小細胞癌（進行・再発） 1st Line CDDP+VP-16療法（RT併用）（short hydration）

患者ID： @PATIENTID

患者氏名： @PATIENTNAME RT: 1.5 Gy × 2回/日 15日間（3週間）

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(m <sup>2</sup> )
HEIGHT01_Dc	HEIGHT01_Dc	#VALUE!

アルコールアレルギー ※  
必ず無いことを確認

投与スケジュール： 1コース 28日間  
 使用基準： class A  
 指示： 体重測定 毎日起床時  
 注意： Day4以降も水分摂取が少ない場合や尿量が少ない場合には、輸液を考慮すること  
 《使用薬剤》  
 シスプラチン；（CDDP）：シスプラチン注（50mg/100mL/V、10mg/20mL/V）  
 エトポシド（VP-16）：エトポシド点滴静注液 100mg/5mL/V

投与量：

薬剤	投与量	計算値	投与量(mg)	投与日
シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	#VALUE!		1
エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	#VALUE!		1～3

<< タイムスケジュール：開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

開始日 (Day1)； 10月28日 (水)

- |       |  |       |
|-------|--|-------|
| 0時00分 | ① 生理食塩液 500mL + 硫酸Mg補正液 8mL<br>1時間で点滴静注          |       |
| 1時00分 | ② ソリタ T 3号 500mL<br>1時間で点滴静注                     |       |
| 2時00分 | ③ 生理食塩液 50mL + アロキシ 1V+ デキサート 9.9mg<br>15分で点滴静注  |       |
| 2時15分 | ④ 生理食塩液 500mL + エトポシド (VP-16) 0mg<br>60分で点滴静注    | 0.0mL |
| 2時45分 | <b>内服</b> アプレピタントカプセル 125mg 1×(1) シスプラチン開始 1時間前頃 |       |
| 3時15分 | ⑤ マンニトール 300mL<br>30分で点滴静注                       |       |
| 3時45分 | ⑥ 生理食塩液 700mL + シスプラチン 0mg<br>90分で点滴静注           | 0.0mL |
| 5時15分 | ⑦ 生理食塩液 500mL<br>1時間で点滴静注                        |       |
| 6時15分 | ⑧ ソリタ T 3号 500mL<br>1時間で点滴静注                     |       |

Day2～3 10月29日 (木) ～ 10月30日 (金)

- |       |   |       |
|-------|---|-------|
| 起床後   | <b>内服</b> アプレピタントカプセル 80mg 1×(2) 起床後          |       |
| 2時00分 | ① 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg<br>15分で点滴静注        |       |
| 2時15分 | ② 生理食塩液 500mL + エトポシド (VP-16) 0mg<br>60分で点滴静注 | 0.0mL |
| 3時15分 | ③ ソリタ T 3 500mL × 3<br>4.5時間 (1.5時間×3) で点滴静注  |       |

## REFERENCE

Minoru Takada, Masahiro Fukuoka, Masaaki Kawahara, et al: J Clin Oncol 20: 3054-3060, 2002  
 Phase III Study of Concurrent Versus Sequential Thoracic Radiotherapy in Combination With Cisplatin and Etoposide for Limited-Stage Small-Cell Lung Cancer: Results of the Japan Clinical Oncology Group Study 9104  
 第10回化学療法プロトコール審査委員会承認：2009年10月28日 更新:2011年11月14日 (SH), 2016年7月14日