

肺小細胞癌（進行・再発） 2nd Line Nogitecan療法

コース目

患者ID : @PATIENTID

患者氏名 : @PATIENTNAME

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m ²)
\$HEIGHT01_Doc	\$WEIGHT01_Doc	#VALUE!

投与スケジュール : 1コース 21日

使用基準 : class A

添付文書の注意に従う。腎機能低下時には減量が必要。

※クレアチンクリアランス20~39mL/min→初回投与量は通常量の半量とする。

※次コースの投与量は患者の状態により適宜増減すること。

1段階増量 1.2mg/m²/日

1段階減量 0.8mg/m²/日

《 使用薬剤 》

ノギテカン : (ノギテカン) 1.1mg/V

投与量 :

薬剤	標準投与量	計算値 (mg)	投与量 (mg)	投与日
ノギテカン	1.0 mg/m ²	#VALUE!		1~5

<< タイムスケジュール : 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

day 1~5 9月12日 (月) ~ 9月16日 (金)

0時00分 ① 生食 50mL + デキサート 6.6mg

15分で点滴投与

0時15分 ② 生理食塩液 100mL + ノギテカン注 . mg

30分で点滴静注

0時45分 ③ 生理食塩液 50mL

フラッシュ

REFERENCE

Joachim von pawel, Joan H. Schiller, Frances A. Shepherd, et al : CPT-11: J Clin Oncol 17:658-667, 1999
Topotecan versus cyclophosphamide, doxorubicin, and vincristine for the treatment of recurrent small-cell lung cancer

Koji Takeda, Shunichi Negoro, Toshiyuki Sawa, et al : Clinical Lung Cancer 4:224-228, 2003

A phase II study of topotecan in patients with relapsed small-cell lung cancer

2011年9月度化学療法プロトコール審査委員会承認 : 2011年9月12日