

# 乳癌（進行・再発） 3rd Line以降 CPT-11 weekly療法

コース目

患者ID : @PATIENTID

患者氏名 : @PATIENTNAME

| 身長 (cm)        | 体重 (kg)        | 体表面積 (m <sup>2</sup> ) |
|----------------|----------------|------------------------|
| \$HEIGHT01_Doc | \$WEIGHT01_Doc | #VALUE!                |

投与スケジュール： 1コース 28日（3週投1週休）

使用基準： 開始時；class B、Day8以降；class C

**下痢・腸閉塞の患者には禁忌！！**

※ UGT1A1遺伝子多型検査を考慮

《使用薬剤》

リリテカン (CPT-11)： (イリノテカン) 40mg/2mL/V、100mg/5mL/V

投与量：

| 薬剤              | 標準投与量                 | 計算値 (mg) | 投与量 (mg) | 投与日    |
|-----------------|-----------------------|----------|----------|--------|
| イリノテカン (CPT-11) | 100 mg/m <sup>2</sup> | #VALUE!  |          | 1.8.15 |

day 22 は休薬

<< タイムスケジュール：開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

day 1 **1月1日** (金) **0時00分** ① 生理食塩液 50mL + グラニセロン 1A + デキサート 6.6mg  
15分で点滴静注

**0時15分** ② 生理食塩液 250mL + イリノテカン **mg**  
90分かけて点滴静注 **0.0 ml**

**1時45分** ③ 生理食塩液 50mL (フラッシュ)

day 2 **1月2日** (土) ~内服 デカドロン (0.5mg) 16錠  
2 x (3) 朝・夕食後  
ナゼアOD錠 1錠  
1 x (3) 朝食後

## REFERENCE

Masahiko Ikeda, Junichi Kurebayashi, Hiroshi Sonoo, et al

Evaluation of irinotecan hydrochloride (CPT-11) and trastuzumab combination therapy as salvage treatment in patients with HER2 overexpressing metastatic breast cancer.

Jpn J Cancer Chemother 36: 773-777, 2009

化学療法プロトコル審査委員会承認：2009年6月11日、更新：2016年2月8日