

乳癌(補助化学療法) (70歳未満)

ddPTX療法

()コース目

患者ID: @PATIENTID

患者氏名: @PATIENTNAME

アルコールアレルギー ※
必ず無しを確認

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m ²)
\$HEIGHT01_Doc	\$WEIGHT01_Doc	#VALUE!

投与スケジュール: 1コース 14日

使用基準: class A

《使用薬剤》

パクリタキセル (PAC): パクリタキセル (1V: 30mg/5mL, 100mg/16.7mL)

投与量:

薬剤	標準投与量	計算値 (mg)	投与量 (mg)	投与日
パクリタキセル	175 mg/m ²	#VALUE!		1

<< タイムスケジュール: 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

1月1日 (日)	0時00分	内服	レスタミンコーワ (10mg) 5T 点滴直前に内服
		①	生理食塩液 50mL + ガスター 1A + デキサート 16.5mg 1V 15分かけて点滴静注
	0時15分	②	生理食塩液 100mL + アロキシ 1V 30分かけて点滴静注
	0時45分	③	生理食塩液 500mL + パクリタキセル mg 0.22μ以下のフィルタ一体型輸液セットを使用する 3時間かけて点滴静注 0.0ml
	1時45分	④	生理食塩液 50mL (フラッシュ)

1月2日 (月)	①	ジーラスタ皮下注 3.6mg 皮下注のみに使用
----------	---	----------------------------

REFERENCE

Lucia Del Mastro, Sabino De Placido, Paolo Bruzzi, et al Lancet 2015;385:1863-72

Fluorouracil and dose-dense chemotherapy in adjuvant treatment of patients with early-stage breast cancer: an open-label, 2x2 factorial, randomised phase 3 trial

福山市民病院倫理委員会 受付番号: 270

2016年6月度化学療法プロトコル審査委員会承認: 2016年6月13日 迅速審査承認 (2016年6月)