

# 乳癌（進行・再発） 1st, 2nd Line DTX bi-weekly療法

( )コース目

患者ID : @PATIENTID

患者氏名 : @PATIENTNAME

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m <sup>2</sup> )
\$HEIGHT01_Doc	\$WEIGHT01_Doc	#VALUE!

投与スケジュール: 1コース28日

使用基準: 開始時; class B、2回目以降; class C

## 《使用薬剤》

ドセタキセル (DTX) : ドセタキセル点滴静注 (1V: 20mg、80mg)

投与量:

薬剤	標準投与量	計算値 (mg)	投与量 (mg)	投与日
ドセタキセル	40 mg/m <sup>2</sup>	#VALUE!		1、15

<< タイムスケジュール: 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

day1 1月1日 (日)

0時30分 ① 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1A + デキサート 6.6mg  
15分で点滴静注

0時45分 ② 生理食塩液 250mL + ドセタキセル mg  
要注意 60分で点滴静注

点滴開始から10分間は点滴速度を遅めに設定して、全身状態を観察する。

1時45分 ③ 生理食塩液 50mL  
フラッシュ

day 2 1月2日 (月) ~内服  
デカドロン (4mg) 2錠  
2 x (2) 朝・夕食後  
ナゼアOD錠 1錠  
1 x (4) 朝食後

day 15 1月15日 (日) も同様に行う

## REFERENCE

Chugoku-Shikoku breast cancer chemotherapy study group, Masahiro Ikeda, Hiroshi Sonoo, Katsuhiko Tanaka, et al  
Evaluation of safety and efficacy for bi-weekly docetaxel and 5'-DFUR combination therapy in patients  
with advanced or recurrent breast cancer-Phase I Study

Jpn J cancer chemother 33: 767-771, 2006

化学療法プロトコール審査委員会承認: 2009年6月11日 更新: 2016年11月17日