

EC療法

()コース目

患者ID: @PATIENTID

患者氏名: @PATIENTNAME

| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m ²) |
|----------------|----------------|-----------------------|
| \$HEIGHT01_Doc | \$WEIGHT01_Doc | #VALUE! |

投与スケジュール: 1コース 21日。予定コース数; 4または6コース。

使用基準: 開始時; class A、2回目以降; class B

使用薬剤:

エピルビシン (EPI) : エピルビシン塩酸塩注射用 (1V: 10mg、50mg)

シクロホスファミド (CPA) : シクロホスファミド (1V: 100mg、500mg)

投与量:

| 薬剤 | 標準投与量 | 計算値(mg) | 投与量(mg) |
|-----------|-----------------------|---------|---------|
| エピルビシン | 90 mg/m ² | #VALUE! | |
| シクロホスファミド | 600 mg/m ² | #VALUE! | |

<< タイムスケジュール: 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

day1

0時00分 内服 アプレタクトカプセル125mg
エピルビシン開始1時間前頃

1月1日 (日)

0時45分

①

生理食塩液50mL + アロキシ 1V + デキサート9.9mg
15分で点滴静注

1時00分

②

生理食塩液 50mL + エピルビシン塩酸塩注射用
全開 10分以内で点滴静注

mg

1時10分

③

生理食塩液 250mL + シクロホスファミド
30分で点滴静注

mg

1時40分

④

生理食塩液 50mL (フラッシュ)

day1

1月1日 (日) ~内服

オプゾール (10mg) 1錠
1 × (2 1) 朝食後ロラゼパム (0.5mg) 2錠
2 × (6) 朝・夕食後アプレタクトカプセル (125mg) 1カプセル
1 × (1) エピルビシン投与1時間前頃

day2

1月2日 (月) ~内服

アプレタクトカプセル (80mg) 1カプセル
1 × (2) 起床時デカドロン (4mg) 1錠
1 × (4) 朝食後マグミット (330mg) 4錠
2 × (5) 朝・夕食後

REFERENCE

Lucia Del Mastro, Sabino De Placido, Paolo Bruzzi, et al Lancet 2015;385:1863-72

Fluorouracil and dose-dense chemotherapy in adjuvant treatment of patients with early-stage breast cancer: an open-label, 2 × 2 factorial, randomised phase 3 trial

2015年11月度化学療法プロトコール審査委員会承認:2011年11月9日 更新:2018年5月14日