

# 乳癌 進行・再発 3rd Line Eribulin単独療法

患者ID : @PATIENTID

コース目

患者氏名 : @PATIENTNAME

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(m <sup>2</sup> )
HEIGHT01_Dc	WEIGHT01_Dc	#VALUE!

アルコールアレルギー  
※必ず無いことを確認

投与スケジュール: 1コース21日

使用基準: class A (day8 class C)

使用薬剤: エリブリン: エリブリン注 1mg/2mL/V

※アントサイクリン系抗悪性腫瘍剤及びタキサン系抗悪性腫瘍剤を含む化学療法を施行後の増悪若しくは再発例を対象とすること。

※投与開始前に肝機能の状態を把握し、肝機能検査 (AST, ALTなど) を行うこと

※QT延長があらわれたとの報告があるので、投与開始前に心電図検査及び電解質検査を行い

心機能の状態を把握すること

※適正使用ガイドに準拠すること。

※アルコールアレルギーの有無について確認すること。

薬剤	投与量	計算値	投与量(mg)	投与日
エリブリン	1.4 mg/m <sup>2</sup>	#VALUE!		1, 8

## << タイムスケジュール >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

開始日 (Day1) ; 1月1日 (金)

0時00分	①	生理食塩液 50mL	+	グラセロン 1 A	+	デキサート3.3mg
		15分で点滴静注				
0時15分	②	生理食塩液 50mL	+	エリブリン注	0.0mg	
		全開5分で点滴静注			0.0mL	
0時20分	③	生理食塩液 50mL				
		フラッシュ				

day8 1月8日 (金) 同様に行う

day15 1月15日 (金) --- 休薬 ---

## REFERENCE

Javier Cortes, Joyce O' Shaughnessy, David Loesch, et al. Lancet 2011;377:914-923  
Eribulin monotherapy versus treatment of physician's choice in patients with metastatic breast cancer (EMBRACE):  
a phase 3 open-label randomised study  
2011年8月度化学療法プロトコル審査委員会承認: 2011年8月8日 更新: 2016年2月8日