

乳癌 (進行・再発) 3rd Line以降
GEM単独療法

()コース目

患者ID : @PATIENTID

患者氏名 : @PATIENTNAME

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m ²)
\$HEIGHT01_Doc	\$WEIGHT01_Doc	#VALUE!

投与スケジュール : 1コース 21日。 day 1、8 に点滴。

使用薬剤 : ゲムシタビン (GEM) : ゲムシタビン点滴静注用 200、1000 mg/V

使用基準 : 開始時 ; class A。以降 ; class C。

投与量 :

薬剤	標準投与量	計算値 (mg)	投与量 (mg)	投与日
ゲムシタビン	1250 mg/m ²	#VALUE!		1.8

<< タイムスケジュール : 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

day1	5月10日	(月)	0時00分	①	生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1A 15分で点滴静注
			0時15分	②	生理食塩液 100mL + ゲムシタビン mg 30分で点滴静注
			0時45分	③	生理食塩液 50mL フラッシュ

day8 同様に行う

day15 --- 休 薬 ---

REFERENCE

Yasuhiro Suzuki, Yutaka Tokuda, Yasuhiko Fujiwara, et al : Jpn J Clin Oncol (2009) 39(11), 699-706
Phase II study of Gemcitabine Monotherapy as a salvage treatment
for Japanese metastatic breast cancer patients after anthracycline and taxane treatment
第13回プロトコール審査委員会承認 : 2010年5月10日 更新:2016年2月8日