

乳癌（進行・再発） 1st, 2nd, 3rd Line nab-PTX tri-weekly療法

コース目

患者ID: @PATIENTID

患者氏名: @PATIENTNAME

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m ²)
\$HEIGHT01_Do	HEIGHT01_	#VALUE!

投与スケジュール: 1コース 21日間

使用基準: class A

適正使用ガイドに準じる

注意: 必ずインラインフィルター**無し**の点滴ルートを用いること

投与量が正確に投与できるよう、泡立たないように取り扱いに注意する

※ 初回治療開始時には血液製剤同意書の取得を確認すること

《 使用薬剤 》

パクリタキセル (アルブミン結合型※血漿分画製剤): (ナブパクリタキセル) 100mg/V

投与量:

薬剤	投与量	計算値	投与量 (mg)	投与日
ナブパクリタキセル	260 mg/m ²	#VALUE!		1

<< タイムスケジュール: 開始時刻 >>

開始日: 1月1日 (金) Day1

9時45分 ① 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1A
15分で点滴静注

10時00分 ② 生理食塩液 0.0mL + ナブパクリタキセル 0mg
30分で点滴静注
調整法に従い溶解。 0.0mL の懸濁液を生理食塩液容器に戻す。

10時30分 ③ 生理食塩液 50mL
フラッシュ

REFERENCE

William J. Gradishar, Sergei Tjulandin, Neville Davidson, et al: J Clin Oncol 23: 7794-7803, 2005
Phase III trial of nanoparticle albumin-bound paclitaxel compared with polyethylated castor oil-based paclitaxel in women with breast cancer
2010年11月度化学療法プロトコール審査委員会承認: 2010年11月8日 更新: 2016年12月6日