

乳癌(進行・再発) 1st Line
Pertuzumab+trastuzumab+PTX療法(導入)

()コース目

患者ID: @PATIENTID

患者氏名: @PATIENTNAME

アルコールアレルギー ※
必ず有無を確認

| 身長(cm) | 体重(kg) | 体表面積(m ²) |
|----------------|-----------------|-----------------------|
| \$HEIGHT01_Doc | \$WHEIGHT01_Doc | #VALUE! |

投与スケジュール: 1コース21日

使用基準: 開始時 classB 2回目以降 class C

使用薬剤: ペルツズマブ: ペルツズマブ (1V: 420 mg)

トラスツズマブ: トラスツズマブ (1V: 150mg, 60mg)

パクリタキセル (PTX): パクリタキセル点滴静注液 (30mg/5mL, 100mg/16.7mL)

※ 投与前~投与中の心機能異常に要注意

※ Infusion Reaction に要注意

投与中又は投与開始後24時間以内に多く現れるInfusion reactionのうちアナフィラキシー様症状、肺障害等の重篤な副作用(気管支痙攣、重度の血圧低下、急性呼吸促進症候群等)の発現の報告あり。Infusion reactionが高頻度で発現する点滴開始後2時間以内は特に要注意。

投与量:

| 薬剤 | 標準投与量 | 計算値(mg) | 投与量(mg) | 投与日 |
|---------|----------------------|---------|---------|--------|
| ペルツズマブ | 840 mg/body | 840 | | 1 |
| トラスツズマブ | 8 mg/kg | #VALUE! | | 1 |
| パクリタキセル | 80 mg/m ² | #VALUE! | | 1.8.15 |

<< タイムスケジュール: 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

day1 1月1日 (金)

※エクステンションチューブを付け、フィルター無ルートで投与すること

※CVポートより投与の場合は

コアレスニードルセットにセーフTポートを接続して投与開始

| 時間 | 薬剤 | 投与量 | 注 |
|-------|-------------------------|-----|-------------------------|
| 0時00分 | ① 生理食塩液 50mL | | 血管確保で速度適宜にて点滴静注 |
| 0時15分 | ② 生理食塩液 250mL + ペルツズマブ | mg | 60分で点滴静注 0.00 ml |
| 1時15分 | ③ 生理食塩液 100mL (フラッシュ) | | 60分で点滴静注 (経過観察を十分におこなう) |
| 2時15分 | ④ 生理食塩液 250mL + トラスツズマブ | mg | 90分で点滴静注 0.00 ml |
| 3時45分 | ⑤ 生理食塩液 50mL | | フラッシュ |

※⑥をフィルター有ルートでプライミングし、エクステンションチューブの側管から投与すること

| | | | |
|-------|-------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 4時00分 | ⑥ 生理食塩液 50mL + ガスター 1A + テカトロン (6.6mg) 1V | | ※テカトロンは初回は6.6mg、2回目以降は3.3mg(1.65mg×2A)可、半量ずつ1.65mg×0.5Aまで減量可 15分で点滴静注 |
| 4時15分 | ⑦ 生理食塩液 100mL | | 30分で点滴静注 |
| 4時45分 | ⑧ 生理食塩液 250mL + パクリタキセル | mg | 0.22μ以下のフィルター一体型輸液セットを使用する 60分で点滴静注 0.0mL |
| 5時45分 | ⑨ 生理食塩液 50mL (フラッシュ) | | |

※ ⑥と⑧の間は少なくとも30分間隔をあけて投与

day 8 1月8日 (金) day 15 1月15日 (金)

| | | | |
|-------|-------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 0時15分 | ① 生理食塩液 50mL + ガスター 1A + テカトロン (6.6mg) 1V | | ※テカトロンは初回は6.6mg、2回目以降は3.3mg(1.65mg×2A)可、半量ずつ1.65mg×0.5Aまで減量可 15分で点滴静注 |
| 0時30分 | ② 生理食塩液 100mL | | 30分で点滴静注 |
| 1時00分 | ③ 生理食塩液 250mL + パクリタキセル | mg | 0.22μ以下のフィルター一体型輸液セットを使用する 60分で点滴静注 0.0mL |
| 2時00分 | ④ 生理食塩液 50mL (フラッシュ) | | |

※ ①と③の間は少なくとも30分間隔をあけて投与

REFERENCE

Chau Dang, Neil Iyengar, Farrah Datko, et al J Clin Oncol 32. 2014 by American Society of Clinical Oncology
Phase II Study of Paclitaxel Given Once per Week Along With Trastuzumab and Pertuzumab in
Patients With Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Positive Metastatic Breast Cancer
2017年2月度化学療法プロトコル審査委員会承認: 2017年2月13日