

乳癌(補助化学療法)

PTX weekly × 12weeks療法

()コース目

患者ID: @PATIENTID

患者氏名: @PATIENTNAME

アルコールアレルギー ※
必ず無しを確認

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m ²)
\$HEIGHT01_Doc	\$WEIGHT01_Doc	#VALUE!

投与スケジュール: 1コース 7日。連続12コース。

使用基準: 開始時; class B、2回目以降; class C

《使用薬剤》

パクリタキセル (PTX) : パクリタキセル (1V: 30mg/5mL, 100mg/16.7mL)

投与量:

薬剤	標準投与量	計算値 (mg)	投与量 (mg)	投与日
パクリタキセル	80 mg/m ²	#VALUE!		1

<< タイムスケジュール: 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

10月10日 (水)

内服 レスタミンコーワ (10mg) 5T **点滴直前に内服**

0時00分 ① 生理食塩液 50mL + ガスター 1A + デキサート 6.6mg
※デキサート初回は6.6mg、2回目以降は3.3mg (1.65mg × 2A) 可、半量ずつ1.65mg × 0.5Aまで減量可

15分で点滴静注

0時15分 ② 生理食塩液 100mL

30分で点滴静注

0時45分 ③ 生理食塩液 250mL + パクリタキセル **mg**

0.22μ以下のフィルター一体型輸液セットを使用する

60分で点滴静注

0.0ml

1時45分 ④ 生理食塩液 50mL (フラッシュ)

※ ①と③の間は少なくとも30分間隔をあけて投与

REFERENCE

Joseph A. Sparano, M.D., Molin Wang, Ph.D., Silvana Martino, D.O., et al

Weekly Paclitaxel in the Adjuvant Treatment of Breast Cancer

N Engl J Med 358(16):1663-1671, 2008

化学療法プロトコール審査委員会承認: 2010年6月7日