

乳癌(進行・再発) 1st Line以降
PTX weekly療法

()コース目

患者ID: @PATIENTID

患者氏名: @PATIENTNAME

アルコールアレルギー ※
必ず無しを確認

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m ²)
\$HEIGHT01_Doc	\$WEIGHT01_Doc	#VALUE!

投与スケジュール: 1コース 28日

使用基準: 開始時; class B、2回目以降; class C

《使用薬剤》

パクリタキセル (PTX) : パクリタキセル (1V: 30mg/5mL, 100mg/16.7mL)

投与量:

薬剤	標準投与量	計算値 (mg)	投与量 (mg)	投与日
パクリタキセル	80 mg/m ²	#VALUE!		1, 8, 15

<< タイムスケジュール: 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

1月1日 (金)

内服 レスタミンコーワ (10mg) 5T 点滴直前に内服

0時00分 ① 生理食塩液 50mL + ガスター 1A + デキサート 6.6mg
※デキサート初回は6.6mg、2回目以降は3.3mg (1.65mg × 2A) 可、半量ずつ1.65mg × 0.5Aまで減量可
15分で点滴静注

0時15分 ② 生理食塩液 100mL
30分で点滴静注

0時45分 ③ 生理食塩液 250mL + パクリタキセル mg
0.22μ以下のフィルタ一体型輸液セットを使用する
60分で点滴静注 0.0ml

1時45分 ④ 生理食塩液 50mL (フラッシュ)

1月8日 と 1月15日 も同様に行う 1月22日 は休薬

※ ①と③の間は少なくとも30分間隔をあけて投与

REFERENCE

Morihiko Kimura, Tokihiro Koida and Yasuhiro Yanagita

Weekly Administration of Paclitaxel for Advanced or Metastatic Breast Cancer-Short-Course Premedications for Outpatients

Jpn J Cancer Chemother 27 (11) : 1703-1708, 2000

化学療法プロトコル委員会承認: 2010年6月7日