

乳癌（術後補助療法、進行・再発）

# Trastuzumab tri-weekly療法（導入）

( )コース目

患者ID : @PATIENTID

患者氏名 : @PATIENTNAME

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m <sup>2</sup> )
\$HEIGHT01_Doc	\$WEIGHT01_Do	#VALUE!

投与スケジュール : 1コース 21日

使用薬剤 : トラスツズマブ : トラスツズマブ (1V : 150mg, 60mg)

※ 投与前～投与中の心機能異常に要注意

※ Infusion Reaction に要注意

**投与中**又は**投与開始後24時間以内**に多く現れるInfusion reactionのうちアナフィラキシー様症状、肺障害等の重篤な副作用（気管支痙攣、重度の血圧低下、急性呼吸促進症候群等）の発現の報告あり。Infusion reactionが高頻度で発現する**点滴開始後2時間以内**は特に要注意。

投与量 :

薬剤	標準投与量	計算値 (mg)	投与量 (mg)
トラスツズマブ	8 mg/kg	#VALUE!	

<< タイムスケジュール : 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

day1	6月11日 (木)	0時00分	① 生理食塩液 50mL 血管確保用で速度適宜にて点滴静注	
		0時15分	② 生理食塩液 250mL + トラスツズマブ 90分で点滴投与	mg 0.00 ml
		1時45分	③ 生理食塩液 50mL フラッシュ	

## REFERENCE

Martine J. Piccart-Gebhart, M. D., Ph. D., Marion Procter, M. Sci., Brian Leyland-Jones, M. D., Ph. D., et al  
Trastuzumab after Adjuvant Chemotherapy in HER2-Positive Breast Cancer

N Engl J Med 353(16):1659-1671, 2005

化学療法プロトコール審査委員会承認 : 2010年6月7日