

乳癌（進行・再発） 1st,2nd,3rd Line

XT療法

() コース目

患者ID : @PATIENTID

患者氏名 : @PATIENTNAME

アルコールアレルギー ※必ず有無を確認

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m ²)
\$HEIGHT01_Doc	WEIGHT01_Doc	#VALUE!

投与スケジュール : 1コース 21日
 使用基準 : class A (2回目以降class B)

《 使用薬剤 》

ドセタキセル (DOC) : ドセタキセル点滴静注「テバ」 (1V : 20mg、80mg)
 カペシタビン (CAP) : カペシタビン錠 300mg
 ピリドキサル (VB6) : ピリドキサル錠 10mg

投与量 :

薬剤	標準投与量	計算値 (mg)	投与量 (mg)	投与日
ドセタキセル	60 mg/m ²	#VALUE!		1
カペシタビン錠 300mg	1250 mg/m ²	#VALUE!		1(夕)~15(朝)
ピリドキサル錠 10mg	4 T/分2		4 T/分2	1(夕)~22(朝)

《 タイムスケジュール 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

day1	1月1日 (日)	0:00	① 生理食塩液 50mL + グラニトロン 1A + デキサート 6.6mg 15分で点滴静注
		0:15	② 生理食塩液 250mL + ドセタキセル注 mg 60分で点滴静注 注) 点滴開始から10分間は点滴速度を遅めに設定して、全身状態を観察する。
		1:15	③ 生理食塩液 50mL フラッシュ
day2	1月2日 (月)	~内服	デカドロン (0.5mg) 16錠 2 x (2) 朝・夕食後 ナゼアOD錠 1錠 1 x (4) 朝食後

※ 内服薬は1日目夕食後より内服開始

~内服	カペシタビン錠 300mg	0錠	朝・夕食後	Day1(夕)~15(朝)
~内服	ピリドキサル錠10mg	4錠	朝・夕食後	Day1(夕)~22(朝)

REFERENCE

Joyce O'shaughnessy, David Miles, Svetislava Vukelja, et al: J Clin Oncol 20: 2812-2823, 2002

Superior Survival with capecitabine plus docetaxel combination therapy in anthracycline-pretreated patients with advanced breast cancer : phase III trial results

2011年9月度化学療法プロトコール審査委員会承認 : 2011年9月12日 更新 2016年2月8日