

胃癌（術後補助化学療法）

XELOX

（ ）コース目

患者ID： @PATIENTID

患者氏名： @PATIENTNAME

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m ²)
\$HEIGHT01_Doc	\$WEIGHT01_Doc	#VALUE!

投与スケジュール： 1コース 21日。予定コース数； 8コース。

使用基準： class A (2回目以降class B)

《 使用薬剤 》

オキサリプラチン (L-OHP)：オキサリプラチン 50mg/V 100mg/V

カペシタビン (CAP)：カペシタビン錠 300mg

ピドキサル錠 (VB6)：ピドキサル錠 10mg

投与量：

薬剤	標準投与量	計算値 (mg)	投与量 (mg)	投与日
オキサリプラチン	130 mg/m ²	#VALUE!		1
カペシタビン錠 300mg	C法に準じる	#VALUE!		1(夕)~15(朝)
ピドキサル錠 10mg	4 T/分2		4 T/分2	1(夕)~22(朝)

カペシタビン1日投与量 (C法)

1.36m²未満； 2400mg、 ~1.66m²未満； 3000mg、 ~1.96m²未満； 3600mg、 1.96m²以上； 4200mg

《 タイムスケジュール 》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

Day1	10月28日	(水)	0:00	内服	アプレピタントカプセル125mg	オキサリプラチン開始1時間前頃
			0:45		① 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1A + デキサート 6.6mg	
					15分で点滴静注	
			1:00		② 5%ブドウ糖液 500mL + オキサリプラチン注	mg
					2時間で点滴静注	
			3:00		③ 生理食塩液 50mL	
					フラッシュ	

Day2~3	10月29日	(木)	~	10月30日	(金)
			起床後	内服	アプレピタントカプセル80mg 1×(2) 起床後

※ 内服薬は1日目夕食後より内服開始

Day1(夕)~15(朝)	内服①	カペシタビン錠 300mg	0錠	朝・夕食後
Day1(夕)~22(朝)	内服②	ピドキサル錠 10mg	4錠	朝・夕食後

REFERENCE

Yung-jue Bang, Young-Woo Kim, Han-Kwang Yang, et al: Lancet 2012; 379: 315-21

Adjuvant Capecitabine and oxaliplatin for gastric cancer after D2 gastrectomy (CLASSIC): a phase 3 open-label, randomised controlled trial

Nozomu Fuse, Hideaki Bando, Keisho Chin, et al: Gastric Cancer DOI 10.1007/s10120-0606-4

Adjuvant Capecitabine plus oxaliplatin after D2 gastrectomy in Japanese patients with gastric cancer: a phase II study

2016年9月度がん化学療法プロトコル審査委員会承認：2016年9月12日 修正：20170601