

胃癌（進行・再発） 1st Line (CDDP不耐例にのみ使用)

G-SOX療法

1

コース目

患者ID : @PATIENTID

患者氏名 : @PATIENTNAME

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m ²)
HEIGHT01_Dc	HEIGHT01_Dc	#VALUE!

投与スケジュール : 1コース : 21日間

使用薬剤 : TS-1 : 20mg/Cp、25mg/Cp、20mg/包、25mg/包
オキサリプラチン (L-OHP) : オキサリプラチン 50mg/V 100mg/V

使用基準 : class A (2回目以降class B)
HER2陰性胃癌の初回治療が対象。

基本的な投与日は1~14日間の連日投与です。初回からの隔日投与等は推奨されません。

投与量 :

薬剤	投与量	計算値	投与量 (mg)	投与日
オキサリプラチン注	100 mg/m ²	#VALUE!		1
フルギマシラテラシク (S-1)	下記に従う			1(夕)~15(朝)

<< タイムスケジュール : 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

クレアチニンクリアランス ≥ 60mL/min : 1. 25m²未満 : 80mg/日、~1.5m²未満 : 100mg/日、1.5m²以上 : 120mg

50mL/min ≤ クレアチニンクリアランス < 60mL/min : 1. 25m²未満 : 60mg/日 (朝40mg、夕20mg)、~1.5m²未満 : 80mg/日、1.5m²以上 : 100mg

※ 内服薬は1日目夕食後より内服開始

内服薬 **内服** フルギマシラテラシク **0mg** 朝・夕食後 Day 1 (夕)~15(朝)

Day1 : 1月1日 (木)

0時00分 ① 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1A + デキサート 13.2mg
15分で点滴静注

0時15分 ② 5%ブドウ糖液 500mL + オキサリプラチン注 **0mg**
2時間で点滴静注

2時15分 ③ 生理食塩液 50mL
フラッシュ

REFERENCE

- David Cunningham, M.D., et al : N Engl J Med 2008; 358:36-46 Capecitabine and Oxaliplatin for advanced Esophagogastric Cancer
W. Koizumi, H. Takiuchi, Y. Yamada, et al : Annals of Oncology 21:1001-1005, 2010 Phase II study of oxaliplatin plus S-1 as first-line treatment for advanced gastric cancer
Katsuhiko Higuchi, et al : Randomized Phase III study of S-1 plus oxaliplatin versus S-1 plus cisplatin for first-line treatment of advanced gastric cancer
Y. Yamada, K. Higuchi, K. Nishikawa, et al : Annals of Oncology 26: 141-148, 2015
Phase III study comparing oxaliplatin plus S-1 with cisplatin plus S-1 in chemotherapy-naïve patients with advanced gastric cancer
2015年3月度化学療法プロトコル審査委員会承認 : 2015年3月9日 更新 : 2017年6月1日