

食道癌（進行・再発）  
DTX単独療法

2nd Line以降

( )コース目

患者ID : @PATIENTID

患者氏名 : @PATIENTNAME

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m <sup>2</sup> )
\$HEIGHT01_Doc	\$WEIGHT01_Doc	#VALUE!

投与スケジュール : 1コース 21日

使用基準 : class A

《 使用薬剤 》

ドセタキセル (DTX) : ドセタキセル点滴静注 (1V : 20mg、80mg)

投与量 :

薬剤	標準投与量	計算値 (mg)	投与量 (mg)	投与日
ドセタキセル	70 mg/m <sup>2</sup>	#VALUE!		1

<< タイムスケジュール : 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

day1 10月28日 (水)

0時00分 ① 生理食塩液50mL + グラニセトロン 1A + デキサート13.2mg  
15分で点滴静注

0時15分 ② 生理食塩液 250mL + ドセタキセル mg  
要注意 60分で点滴静注

点滴開始から10分間は点滴速度を遅めに設定して、全身状態を観察する。

1時15分 ③ 生理食塩液 50mL (フラッシュ)  
フラッシュ

REFERENCE

K. Muro, T. Hamaguchi, A. Ohtsu, et al : Annals of Oncology 15: 955-959, 2004  
A phase II study of single-agent docetaxel in patients with metastatic esophageal cancer.  
第10回化学療法プロトコル審査委員会承認 : 2009年10月28日、更新 : 2016年11月17日