

食道(進行・再発) 2nd Line
PTX weekly療法

()コース目

患者ID: @PATIENTID

患者氏名: @PATIENTNAME

アルコールアレルギー ※
必ず無しを確認

| 身長 (cm) | 体重 (kg) | 体表面積 (m ²) |
|----------------|----------------|------------------------|
| \$HEIGHT01_Doc | \$WEIGHT01_Doc | #VALUE! |

投与スケジュール: 1コース 49日 7日毎6回投与2週間休薬

使用基準: 開始時; class B、2回目以降; class C

《使用薬剤》

パクリタキセル (PTX) : パクリタキセル (1V: 30mg/5mL, 100mg/16.7mL)

投与量:

| 薬剤 | 標準投与量 | 計算値 (mg) | 投与量 (mg) | 投与日 |
|---------|-----------------------|----------|----------|----------------------|
| パクリタキセル | 100 mg/m ² | #VALUE! | | 1, 8, 15, 22, 29, 36 |

<< タイムスケジュール: 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

| | | | |
|----------|-------|----|--|
| 1月1日 (金) | 0時00分 | 内服 | レスタミンコーワ (10mg) 5T 点滴直前に内服 |
| | | ① | 生理食塩液 50mL + ガスター 1A + デキサート 6.6mg 1V 15分かけて点滴静注 |
| | 0時15分 | ② | 生理食塩液 100mL 30分かけて点滴静注 |
| | 0時45分 | ③ | 生理食塩液 250mL + パクリタキセル mg 0.22μ以下のフィルター一体型輸液セットを使用する 1時間かけて点滴静注 0.0ml |
| | 1時45分 | ④ | 生理食塩液 50mL (フラッシュ) |

| | | | |
|----------------------|--------|-------|-----|
| 1月8日 と 1月15日 と 1月22日 | も同様に行う | 2月12日 | は休薬 |
| 1月29日 と 2月5日 | | 2月19日 | |

※ ①と③の間は少なくとも30分間隔をあけて投与

REFERENCE

Ken Kato, Makoto Tahara, Shuichi Hironaka et, al Cancer Chemother Pharmacol (2011) 67:1265-1272
A phase II study of paclitaxel by weekly 1-h infusion for advanced or recurrent esophageal cancer in patients who had previously received platinum-based chemotherapy
D. H. Ilson, R. G. Wadleigh, L. P. Leichman et. al Annals Oncology 18:898-902, 2007
Paclitaxel given by a weekly 1-h infusion in advanced esophageal cancer
2012年1月度化学療法プロトコル委員会承認: 2012年1月16日