

結腸癌(術後)

FOLFOX-4療法(DIV)

()コース目


患者ID : @PATIENTID

患者氏名 : @PATIENTNAME

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(m ²)
\$HEIGHT01_Doc	WHEIGHT01_Doc	#VALUE!

投与スケジュール: 1コース14日。 DAY 1, 2に点滴施行。48時間。

目標クール回数: 12コース



使用基準: class A (2回目以降class B)

《使用薬剤》

オキサリプラチン(L-OHP): オキサリプラチン 50mg/V, 100mg/V

レボホリナート(LV): (レボホリナート) 25mg/V, 100mg/V

フルオロウラシル: フルオロウラシル注(250mg/5mL, 1000mg/20mL)

投与量:

薬剤	標準投与量	計算値(mg)	投与量(mg)
オキサリプラチン	85 mg/m ²	#VALUE!	
レボホリナート	100 mg/m ²	#VALUE!	
フルオロウラシル(急速)	400 mg/m ²	#VALUE!	
フルオロウラシル(持続)	600 mg/m ²	#VALUE!	

<< タイムスケジュール: 開始時刻を0:00とします。 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

1月1日 (金)

メイン 側管

0時00分 ① 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1A + デキサート 13.2mg
15分で点滴静注

0時15分 ② 5%ブドウ糖液 250mL + オキサリプラチン注 mg
2時間で点滴静注

③ 5%ブドウ糖液 250mL + レボホリナート注 mg
側管から②と同時開始し、2時間で点滴静注

2時15分 ④ 生理食塩液 40mL + フルオロウラシル注 mg
15分以内で急速静脈内投与 0.00 mL

⑤ 生理食塩液 500mL + フルオロウラシル注 mg
23時間で点滴静注 0.00 mL

1月2日 (土)

メイン 側管

0時15分 ① 5%ブドウ糖液 250mL + レボホリナート注 mg
側管から2時間で点滴静注

2時15分 ② 生理食塩液 40mL + フルオロウラシル注 mg
15分以内で急速静脈内投与 0.00 mL

③ 生理食塩液 500mL + フルオロウラシル注 mg
23時間で点滴静注 0.00 mL

1月3日 (日)

0時15分 ① 生理食塩液 50mL (フラッシュ)
点滴終了

REFERENCE

Thierry Andre, Corrado Boni, Matilde Navarro, et al: Improved Overall Survival With Oxaliplatin, Fluorouracil, and Leucovorin As Adjuvant Treatment in Stage II or III Colon Cancer in the MOSAIC Trial

J Clin Oncol 27: 3109-3116, 2009

第10回化学療法プロトコール審査委員会承認: 2009年10月28日 更新: 2017年6月1日