

大腸癌（術後） mFOLFOX-6療法

() コース目

(分割投与)

患者ID : @PATIENTID


患者氏名 : @PATIENTNAME

| 身長 (cm) | 体重 (kg) | 体表面積 (m ²) |
|----------------|------------|------------------------|
| \$HEIGHT01_Doc | HEIGHT01_D | #VALUE! |

投与スケジュール: 1コース14日。 DAY 1に点滴施行。48時間。

目標コース回数: 12コース

フルオロウラシル急速 (15分以内)



使用基準: class A (2回目以降class B)

《使用薬剤》

オキサリプラチン (L-OHP): オキサリプラチン 50mg/V、100mg/V

レボホリナート (L-LV): (レボホリナート) 25mg、100mg/V

フルオロウラシル: フルオロウラシル注 (250mg/5mL、1000mg/20mL)

投与量:

| 薬剤 | 標準投与量 | 計算値 (mg) | 投与量 (mg) |
|--------------|------------------------|----------|----------|
| オキサリプラチン | 85 mg/m ² | #VALUE! | |
| レボホリナート | 200 mg/m ² | #VALUE! | |
| フルオロウラシル(急速) | 400 mg/m ² | #VALUE! | |
| フルオロウラシル(持続) | 2400 mg/m ² | #VALUE! | |

《タイムスケジュール: 治療開始時刻を0:00とします。》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

1月1日 (金)

メイン 側管

0時00分 ① 生理食塩液 50mL + グラセトロン1A + デキサート13.2mg (6.6mg × 2V)

15分で点滴静注

0時15分 ② 5%ブドウ糖液 250mL + オキサリプラチン注 *mg*

③と同時に開始し、2時間で点滴静注

③ 5%ブドウ糖液 250mL + レボホリナート注 *mg*

側管から②と同時開始し、2時間で点滴静注

2時15分 ④ 生理食塩液 40mL + フルオロウラシル注 *mg*

全開 (15分以内) で急速静注

0.00 mL

⑤ 生理食塩液 500mL + フルオロウラシル注 *mg*

23時間で点滴静注

0.00 mL

1月2日 (土)

1時15分 ① 生理食塩液 500mL + フルオロウラシル注 *mg*

23時間で点滴静注

0.00 mL

1月3日 (日)

0時15分 ⑤ 生理食塩液 50mL (フラッシュ)

REFERENCE

Thierry Andre, Corrado Boni, Matilde Navarro, et al: Improved Overall Survival With Oxaliplatin, Fluorouracil, and Leucovorin As Adjuvant Treatment in Stage II or III Colon Cancer in the MOSAIC Trial

J Clin Oncol 27: 3109-3116, 2009

第10回化学療法プロトコール審査委員会承認: 2009年10月28日、更新: 2017年6月1日