

大腸癌（術後）

XELOX療法

()コース目

患者ID: @PATIENTID

患者氏名: @PATIENTNAME

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m ²)
\$HEIGHT01_Doc	\$WEIGHT01_Do	#VALUE!

投与スケジュール: 1コース 21日

目標コース: 8コース

使用基準: class A (2回目以降class B)

《使用薬剤》

オキサリプラチン (L-OHP): オキサリプラチン 50mg/V 100mg/V

カペシタビン (CAP): カペシタビン錠 300mg

ピドキサル (VB6): ピドキサル錠 10mg

投与量:

薬剤	標準投与量	計算値 (mg)	投与量 (mg)	投与日
オキサリプラチン	130 mg/m ²	#VALUE!		1
カペシタビン錠 300mg	C法に準じる	#VALUE!		1(夕)~15(朝)
ピドキサル錠 10mg	4 T/分 2		4 T/分 2	1(夕)~22(朝)

カペシタビン1日投与量 (C法)

1.36m²未満; 2400mg、~1.66m²未満; 3000mg、~1.96m²未満; 3600mg、1.96m²以上; 4200mg

《タイムスケジュール》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

Day1	10月28日 (水)	0:00	① 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1A + デキサート 13.2mg 15分で点滴静注
		0:15	② 5%ブドウ糖液 500mL + オキサリプラチン注 mg 2時間で点滴静注
		2:15	③ 生理食塩液 50mL フラッシュ

※ 内服薬は1日目夕食後より内服開始

Day1(夕)~15(朝) 内服① カペシタビン錠 300mg 0錠 朝・夕食後

Day1(夕)~22(朝) 内服② ピドキサル錠 10mg 4錠 朝・夕食後

REFERENCE

Leonard B. Saltz, Stephen Clarke, Eduardo Dias-Rubio, et al: J Clin Oncol 26: 2013-2019, 2008
Bevacizumab in combination with oxaliplatin-based chemotherapy as first-line therapy in metastatic colorectal cancer
: A randomized phase III study

2019年6月度化学療法プロトコル審査委員会承認: 2019年6月10日