

大腸癌（進行・再発） 2nd Line CPT-11単独療法（150）

コース目

患者ID : @PATIENTID

患者氏名 : @PATIENTNAME

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(m ²)
\$HEIGHT01_Doc	\$WHEIGHT01_Doc	#VALUE!

投与スケジュール : 1コース 49日

使用基準 : class B (Day8以降 class C)

下痢・腸閉塞の患者には禁忌！！

※ UGT1A1遺伝子多型検査を考慮

《 使用薬剤 》

イリノテカン (CPT-11) : (イリノテカン) 40mg/2mL/V、100mg/5mL/V

投与量 :

薬剤	標準投与量	計算値(mg)	投与量(mg)	投与日
イリノテカン(CPT-11)	150 mg/m ²	#VALUE!		1.15.29

day 43 は休薬

<< タイムスケジュール : 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

day 1 10月28日 (水) 0時00分 ① 生食 50mL + グラニセトロン1A + デキサート13.2mg
15分で点滴静注

0時15分 ② 生理食塩液 250mL + イリノテカン mg
90分で点滴静注 0.0 ml

1時45分 ③ 生理食塩液 50mL (フラッシュ)

day15 同様に行う

day29

day43 --- 休 薬 ---

REFERENCE

Yasuhiro Shimada, Masahiro Yoshino, Akira Wakui, et al : J Clin Oncol(1993) 11: 909-913
Phase II study of CPT-11, a New Camptothecin Derivative, in Metastatic Colorectal Cancer
第10回化学療法プロトコール審査委員会承認 : 2009年10月28日