

大腸癌(進行・再発) 1st, 2nd Line FOLFOX-4療法(DIV)


() クール目

患者ID : @PATIENTID

患者氏名 : @PATIENTNAME

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(m ²)
\$HEIGHT01_Doc	WHEIGHT01_Do	#VALUE!

投与スケジュール: 1コース14日。 DAY 1, 2に点滴施行。48時間。



使用基準: class A (2回目以降class B)

《使用薬剤》

オキサリプラチン(L-OHP): オキサリプラチン 50mg、100mg/V
レボホリナート(LV): (レボホリナート) 25mg、100mg/V
フルオロウラシル: フルオロウラシル注(250mg/5mL、1000mg/20mL)

投与量:

薬剤	標準投与量	計算値(mg)	投与量(mg)
オキサリプラチン	85 mg/m ²	#VALUE!	
レボホリナート	100 mg/m ²	#VALUE!	
フルオロウラシル(急速)	400 mg/m ²	#VALUE!	
フルオロウラシル(持続)	600 mg/m ²	#VALUE!	

《タイムスケジュール: 開始時刻を0:00とします。》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

1月1日 (金)

メイン 側管

-0:15	0時00分	①	生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1A + デキサート 13.2mg 15分で点滴静注		
0:00	0時15分	②	5%ブドウ糖液 250mL + オキサリプラチン注 <i>mg</i> ③と同時に2時間で点滴静注		
		③	5%ブドウ糖液 250mL + レボホリナート注 <i>mg</i> 側管から②と同時に2時間で点滴静注		
2:00	2時15分	④	生理食塩液 40mL + フルオロウラシル注 <i>mg</i> 全開(15分以内)で急速静注	0.00	mL
		⑤	生理食塩液 500mL + フルオロウラシル注 <i>mg</i> 22時間で点滴静注	0.00	mL
24:00	1月2日 (土)				
	0時15分	①	5%ブドウ糖液 250mL + レボホリナート注 <i>mg</i> 側管から2時間で点滴静注		
26:00	2時15分	②	生理食塩液 40mL + フルオロウラシル注 <i>mg</i> 全開(15分以内)で急速静注	0.00	mL
		③	生理食塩液 500mL + フルオロウラシル注 <i>mg</i> 22時間で点滴静注	0.00	mL
48:00	1月3日 (日)				
	0時15分	①	生理食塩液 50mL フラッシュ		

REFERENCE

Richard M. Goldberg, Daniel J. Sargent, Roscoe F. Morton, et al
A randomized controlled trial of fluorouracil plus leucovorin, irinotecan, and oxaliplatin combinations in patients with previously untreated metastatic colorectal cancer.

J Clin Oncol 22: 23-30, 2004

第9回化学療法プロトコル審査委員会承認: 2009年8月6日、更新: 2017年6月1日