

大腸癌（進行・再発） 1st, 2nd Line

mFOLFOX-6療法

() コース目

(分割投与)

患者ID : @PATIENTID


患者氏名 : @PATIENTNAME

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m ²)
\$HEIGHT01_Doc	HEIGHT01_D	#VALUE!

投与スケジュール: 1コース14日。 DAY 1に点滴施行。 48時間。

目標クール回数: 12コース

フルオロウラシル急速 (15分以内)



使用基準: class A (2回目以降class B)

《使用薬剤》

オキサリプラチン (L-OHP): オキサリプラチン 50mg/V、100mg/V

レボホリナート (L-LV): (レボホリナート) 25mg、100mg/V

フルオロウラシル: フルオロウラシル注 (250mg/5mL、1000mg/20mL)

投与量:

薬剤	標準投与量	計算値 (mg)	投与量 (mg)
オキサリプラチン	85 mg/m ²	#VALUE!	
レボホリナート	200 mg/m ²	#VALUE!	
フルオロウラシル(急速)	400 mg/m ²	#VALUE!	
フルオロウラシル(持続)	2400 mg/m ²	#VALUE!	

<< タイムスケジュール: 治療開始時刻を0:00とします。 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

1月1日 (金)

メイン 側管

-0:15	0:00	①	生理食塩液 50mL + グラセトン1A + デキサート13.2mg (6.6mg × 2V) 15分で点滴静注		
0:00	0:15	②	5%ブドウ糖液 250mL + オキサリプラチン注 ③と同時に2時間で点滴静注	mg	0.00 mL
		③	5%ブドウ糖液 250mL + レボホリナート注 側管から②と同時に、2時間で点滴静注	mg	
+2:00	2:15	④	生理食塩液 40mL + フルオロウラシル注 全開 (15分以内) で急速静注	mg	0.00 mL
		⑤	生理食塩液 500mL + フルオロウラシル注 23時間で点滴静注	mg	0.00 mL

+25:00 1月2日

1:15	①	生理食塩液 500mL + フルオロウラシル注 23時間で点滴静注	mg	0.00 mL
------	---	--------------------------------------	----	---------

+48:00 1月3日 (日)

0:15	①	生理食塩液 50mL (フラッシュ)		
------	---	--------------------	--	--

REFERENCE

Thierry Andre, Corrado Boni, Matilde Navarro, et al: Improved Overall Survival With Oxaliplatin, Fluorouracil, and Leucovorin As Adjuvant Treatment in Stage II or III Colon Cancer in the MOSAIC Trial
J Clin Oncol 27: 3109-3116, 2009

化学療法プロトコール審査委員会承認: 2009年10月28日、更新: 2017年6月1日