

胆道癌（進行・再発） GEM単独療法

()コース目

患者ID : @PATIENTID

患者氏名 : @PATIENTNAME

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m ²)
\$HEIGHT01_Doc	\$WEIGHT01_Doc	#VALUE!

投与スケジュール： 1コース 28日。 day 1、8、15 に点滴。

使用薬剤： ゲムシタビン（GEM）：ゲムシタビン点滴静注用「ヤルト」（1V:200mg, 1g）

使用基準： 開始時；class A。以降；class C。

投与量：

薬剤	標準投与量	計算値 (mg)	投与量 (mg)
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	#VALUE!	

<< タイムスケジュール：開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

day1	10月28日	(水)	0時00分	①	生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg 15分で点滴静注
			0時15分	②	生理食塩液 100mL + ゲムシタビン mg 30分で点滴静注
			0時45分	③	生理食塩液 50mL フラッシュ

day8 同様に行う

day15 休薬

day22 休薬

REFERENCE

Takuji Okusaka, Hiroshi Ishii, Akihiro Funakoshi, et al : Cancer Chemother Pharmacol (2006) 57: 647-653
Phase II study of single-agent gemcitabine in patients with advanced biliary tract cancer.
第10回化学療法プロトコール審査委員会議題：2009年10月28日