

膵臓癌（進行・再発） 1st Line GEM+ nab-PTX療法

コース目

患者ID : @PATIENTID

患者氏名 : @PATIENTNAME

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(m ²)
HEIGHT01_Dc	WEIGHT01_Dc	#VALUE!

投与スケジュール : 1コース 28日間

使用基準 : 開始時 ; class A。以降 ; class C。

※ 開始時に血液製剤同意書を確認すること

《 使用薬剤 》

ナブパクリタキセル (nab-PTX) : (ナブパクリタキセル) 100mg /V

ゲムシタビン 200、1000 mg/V

薬剤名	標準投与量	計算値(mg)	投与量(mg)	投与日
ナブパクリタキセル (nab-PAC)	125 mg/m ²	#VALUE!		1, 8, 15
ゲムシタビン (GEM)	1000 mg/m ²	#VALUE!		1, 8, 15

<< タイムスケジュール : 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

開始日 (day1) : 1月1日 (木) day8 1月8日 (木) day15 1月15日 (木)

0時00分 ① 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1 A + デキサート 6.6mg

15分で点滴静注

0時15分 ② 生理食塩液 100mL + ナブパクリタキセル 0mg

30分で点滴静注

調整法に従い溶解。 0.0mL

※フィルターなしルートで投与

0時45分 ③ 生理食塩液 50mL

15分で点滴静注

1時00分 ④ 生理食塩液 100mL + ゲムシタビン 0mg

30分で点滴静注

1時30分 ⑤ 生理食塩液 50mL

フラッシュ

REFERENCE

Daniel D. Von Hoff, M.D., Thomas Ervin, M.D., Francis P. Arena, M.D., et al : N Engl J Med 2013;369:1691-703

Increased Survival in Pancreatic Cancer with nab-Paclitaxel plus Gemcitabine

2015年1月度化学療法プロトコール審査委員会承認 : 2015年1月19日