

膵臓癌

進行・再発 1st Line

GEM単独療法

()クール目

患者ID : @PATIENTID

患者氏名 : @PATIENTNAME

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m ²)
\$HEIGHT01_Doc	\$WEIGHT01_Doc	#VALUE!

投与スケジュール: 1クール 28日。 day 1、8、15 に点滴。

使用薬剤: ゲムシタビン (GEM): ゲムシタビン点滴静注用「ヤルト」 (1V:200mg, 1g)

使用基準: 開始時; class A。以降; class C。

投与量:

薬剤	標準投与量	計算値 (mg)	投与量 (mg)
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	#VALUE!	

<< タイムスケジュール: 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

day1	6月11日 (木)	0時00分	① 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg 15分で点滴静注
		0時15分	② 生理食塩液 100mL + ゲムシタビン mg 30分で点滴静注
		0時45分	③ 生理食塩液 50mL フラッシュ

day8 同様に行う

day15

day22 --- 休薬 ---

REFERENCE

Howard A. Burris III, Malcolm J. Moore, John Andersen, et al: Improvements in survival and clinical benefit with gemcitabine as first-line therapy for patients with advanced pancreas cancer: A randomized trial. J Clin Oncol 15: 2403-2413, 1997
第6回プロトコール審査委員会承認: 2009年3月26日、更新: 2009年6月11日 (第8回)