

子宮肉腫 進行・再発 1st Line IT療法

コース目

患者ID: @PATIENTID

患者氏名: @PATIENTNAME

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(m ²)
HEIGHT01_D	HEIGHT01_D	#VALUE!

投与スケジュール: 1コース 21日間 目標: 6コース

使用基準: class B

《 使用薬剤 》

パクリタキセル (PTX) : (パクリタキセル) 30mg/5mL/V、100mg/16.7mL/V

イホスファミド (IFM) : (イホスファミド) 1000mg/V

投与量:

薬剤	投与量	計算値	投与量(mg)	投与日
パクリタキセル	135 mg/m ²	#VALUE!		1
イホスファミド (IFM)	1600 mg/m ²	#VALUE!		1~3

<< タイムスケジュール: 開始時刻 >>

Day1: 1月1日 (火)

- 0時00分 **内服** レスタミンコーワ (10mg) 5T **点滴直前に内服**
- ① 生理食塩液 50mL + ガスター 1A + デカドロン 13.2mg 1V
15分かけて点滴静注
- 0時15分 ② 生理食塩液 100mL + アロキシ 1V
30分かけて点滴静注
- 0時45分 ③ 生理食塩液 500mL + パクリタキセル **mg**
0.22μ以下のフィルター型輸液セットを使用する
3時間かけて点滴静注 **0.0ml**
- 3時45分 ④ 生理食塩液 250mL + イホスファミド (IFM) **mg**
2時間で点滴静注
- 3時45分 **④'** 生理食塩液 50mL + ウロミテキサン 5A (イホスファミド投与時)
④の側管より15分で点滴静注
- 5時45分 ⑤ ソリタ T3号 500mL
2時間で点滴静注
- 7時45分 ⑥ ソリタ T3号 500mL
2時間で点滴静注
- 7時45分 **⑥'** 生理食塩液 50mL + ウロミテキサン 5A (イホスファミド 4時間後)
⑥の側管より15分で点滴静注
- 9時45分 ⑦ ソリタ T3号 500mL
2時間で点滴静注
- 11時45分 ⑧ 生理食塩液 50mL + ウロミテキサン 5A (イホスファミド 8時間後)
15分で点滴静注

Day2: 1月2日 (水) ~ 1月3日 (木)

メイン 側管

- 0時30分 ① 生理食塩液 50mL + デカドロン 6.6mg
15分で点滴静注
- 0時45分 ② 生理食塩液 250mL + イホスファミド (IFM) **0mg**
2時間で点滴静注
- 0時45分 **②'** 生理食塩液 50mL + ウロミテキサン 5A (イホスファミド投与時)
②の側管より15分で点滴静注
- 2時45分 ③ ソリタ T3号 500mL
2時間で点滴静注
- 4時45分 ④ ソリタ T3号 500mL
2時間で点滴静注
- 4時45分 **④'** 生理食塩液 50mL + ウロミテキサン 5A (イホスファミド 4時間後)
④の側管より15分で点滴静注
- 6時45分 ⑤ ソリタ T3号 500mL
2時間で点滴静注
- 8時45分 ⑥ 生理食塩液 50mL + ウロミテキサン 5A (イホスファミド 8時間後)
15分で点滴静注

REFERENCE

Haward D, Homesley, Virginia Filiaci, Maurie Markman, et al: J Clin Oncol Vol25, No5, 2007: pp526-531
Phase III trial of ifosfamide with or without paclitaxel in advanced uterine carcinosarcoma: A Gynecologic
Oncology Group Study

2015年10月度 化学療法プロトコール審査委員会 2015年10月19日承認 (福山市民病院倫理委員会 受付番号242 2015年10月1日承認)