

子宮平滑筋肉腫（術後） 早期症例（Ⅰ・Ⅱ期） ドキソルビシン（ADR）単独療法

患者ID： @PATIENTID

コース目

患者氏名： @PATIENTNAME

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(m ²)
HEIGHT01_Dc	HEIGHT01_Dc	#VALUE!

投与スケジュール： 1コース 21日間

目標コース： 8コース

使用基準： class A（次回以降 class B）

注意事項： 原則、ドキソルビシン総投与量は500mg/m²以内とする。

投与前～投与中の心機能異常に要注意。

《使用薬剤》

ドキソルビシン（ADR）：ドキソルビシン塩酸塩注射用 10mg/V、50mg/V

投与量：

薬剤	投与量	計算値	投与量(mg)	投与日
ドキソルビシン	60 mg/m ²	#VALUE!		1

<< タイムスケジュール：開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

開始日： 1月1日（金）

0時00分 ① 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1A + デキサート 13.2mg
15分で点滴静注

0時15分 ② 生理食塩液 50mL + ドキソルビシン 0mg
全開 10分以内で点滴静注
※血管痛、静脈炎に注意!

0時25分 ③ 生理食塩液 250mL（ドキソルビシン終了後直ちに）
全開 20分以内で点滴静注（フラッシュ）

REFERENCE

George A. Omura, John A. Blessing, Frank Major, et al : J Clin Oncol 3:1240-1245.

A Randomized Clinical Trial of Adjuvant Adriamycin in Uterine Sarcomas: A Gynecologic Oncology Group Study.

2020年2月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2020年2月10日