

卵巣癌（進行・再発） 準1st line
CBDCA+CPA（CC）療法

クール目

患者ID： @PATIENTID

年齢 @PATIENTAGE 歳

患者氏名： @PATIENTNAME

性別 @PATIENTSEX

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m ²)
@HEIGHT01_D	@HEIGHT01_D	#VALUE!

投与スケジュール： 1クール： 21日間

使用薬剤： カルボプラチン（CBDCA）：カルボプラチン（150mg/V、450mg/V）
シクロホスファミド（CPA）：エンドキサン（1V：100mg、500mg）

使用基準： class A

投与量： CBDCA投与量はAUCより算出。Ccr実測値もしくはCre値を選択してください。

Cre値 (mg/dl)	目標AUC (mg・min/ml)
	5.0

Calvertの計算式： 投与量 (mg/body) = 目標AUC値 × (GFR+25)
GFRはCcrを代用して計算。

薬剤	標準投与量	計算値 (mg)	投与量 (mg)	投与日
カルボプラチン	AUC 5mg/min/mL	#VALUE!		1
エンドキサン	900 mg/m ²	#VALUE!		1

<< タイムスケジュール：開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

開始日： 11月19日 (木)

day1 0時00分 内服 アプレピタントカプセル 125mg 1×(1) カルボプラチン開始 1時間前頃
0時15分 ① 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1A + デキサート 9.9mg
15分で点滴静注
0時30分 ② 生理食塩液 250mL + エンドキサン 0mg
30分で点滴静注
1時00分 ③ 5%ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン 0mg
60分で点滴静注 0.0mL
2時00分 ④ 生理食塩液 50mL
フラッシュ

day2~3 11月20日 (金) ~ 11月21日 ###

起床後 内服 アプレピタントカプセル 80mg 1×(2) 起床後

REFERENCE

O. Tredan, J. F. Geay, S. Touzet, et al : Annals of Oncology 18: 256-262, 2007

Carboplatin/Cyclophosphamide or carboplatin/paclitaxel in elderly patients with advanced ovarian cancer? Analysis of two consecutive trials from the Groupe d'Investigateurs Nationaux pour l'Etude des cancers ovariens

2011年10月度化学療法プロトコール審査委員会承認：2011年10月17日