

卵巣癌（進行・再発） 1st Line CBDCA+DTX（DC）療法

ケル目

患者ID： @PATIENTID

年齢： **IENTAGE** 歳

患者氏名： @PATIENTNAME

性別： **ATIENTSE**

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m ²)
EIGHT01_D	HEIGHT01_D	#VALUE!

投与スケジュール： 1コース： 21日間

使用薬剤： カルボプラチン（CBDCA）：（カルボプラチン） 150mg/V、450mg/V
ドセタキセル（DTX）：ドセタキセル点滴静注「EE」（1V：20mg、80mg）

使用基準： class A

投与量： CBDCA投与量はAUCより算出。Ccr実測値もしくはCre値を選択してください。

Cre値 (mg/dl)	目標AUC (mg·min/ml)
	5.0

Calvertの計算式： 投与量 (mg/body) = 目標AUC値 × (GFR+25)
GFRはCcrを代用して計算。

薬剤	標準投与量	計算値 (mg)	投与量 (mg)	投与日
カルボプラチン	AUC 5mg/min/mL	#VALUE!		1
ドセタキセル	70mg/m ²	#VALUE!		1

<< タイムスケジュール：開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

開始日： 11月19日（木）

day1	0時00分	① 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1A + デキサート 9.9mg 15分で点滴静注		
	0時15分	内服 アプレピタントカプセル 125mg 1×(1) カルボプラチン開始 1時間前頃		
	0時15分	② 生理食塩液 250mL + ドセタキセル 60分で点滴静注	0mg	0.0mL
	1時15分	③ 5%ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン 60分で点滴静注	0mg	0.0mL
	2時15分	④ 生理食塩液 50mL フラッシュ		

day2~3 11月20日（金）～ 11月21日 ###

起床後 **内服** アプレピタントカプセル 80mg 1×(2) 起床後

REFERENCE

Paul A. Vasey, Gordon C. Jayson, Alan Gordon, et al
Phase III Randomized Trial of Docetaxel-Carboplatin Versus Paclitaxel-Carboplatin as First-Line
Chemotherapy for Ovarian Carcinoma. :Journal of the National Cancer Institute 96 : 1682-1691, 2004
第11回化学療法プロトコール審査委員会承認：2009年11月19日 更新：2014/2/10, 2016/11/17