

卵巣癌（進行・再発） 2nd Line以降 weekly CPT-11単独療法

コース目

患者ID : @PATIENTID

患者氏名 : @PATIENTNAME

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(m ²)
\$HEIGHT01_Doc	\$WHEIGHT01_Doc	#VALUE!

投与スケジュール : 1コース 28日 (3週投1週休)

使用基準 : class B (Day8以降 class C)

下痢・腸閉塞の患者には禁忌！！

※ UGT1A1遺伝子多型検査を考慮

《 使用薬剤 》

イリノテカン (CPT-11) : (イリノテカン) 40mg/2mL/V、100mg/5mL/V

投与量 :

薬剤	標準投与量	計算値(mg)	投与量(mg)	投与日
イリノテカン(CPT-11)	100 mg/m ²	#VALUE!		1.8.15

day 22 は休薬

<< タイムスケジュール : 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

day 1 6月11日 (木) 0時00分 ① 生食 50mL + グラニセトロン 1A + デキサート 6.6mg
15分で点滴投与

0時15分 ② 生理食塩液 250mL + イリノテカン mg
90分かけて点滴投与 0.0 ml

1時45分 ③ 生理食塩液 50mL (フラッシュ)

REFERENCE

Koji Matsumoto, Noriyuki Katsumata, Yasuhiro Yamanaka, et al : CPT-11: Gynecologic oncology100(2006)412-416
The safety and efficacy of the weekly dosing of irinotecan for platinum-and taxans-resistant epithelial ovarian cancer

2013年6月度化学療法プロトコール審査委員会承認 : 2013年6月10日