

卵巣癌 進行・再発 2nd,3rd Line  
GEM単独療法

( )クール目

患者ID : @PATIENTID

患者氏名 : @PATIENTNAME

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m <sup>2</sup> )
\$HEIGHT01_Doc	\$WEIGHT01_Doc	#VALUE!

投与スケジュール: 1コース 28日。 day 1, 8, 15 に点滴。 目標コース: 3コース

使用薬剤: ゲムシタビン (GEM): ゲムシタビン点滴静注用「ヤルト」 (1V:200mg, 1g)

使用基準: 開始時; class A。以降; class C。

投与量:

薬剤	標準投与量	計算値 (mg)	投与量 (mg)
ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	#VALUE!	

<< タイムスケジュール: 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

day1	10月17日	(月)	0時00分	①	生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg 15分で点滴静注
			0時15分	②	生理食塩液 100mL + ゲムシタビン mg 30分で点滴静注
			0時45分	③	生理食塩液 50mL フラッシュ

day8 同様に行う  
day15

day22 --- 休 薬 ---

REFERENCE

David G. Mutch, Mauro Orlando, Tiana Goss, et al: J Clin Oncol 25:2811-2818 2007  
Randomized phase III trial of Gemcitabine Compared with pegylated liposomal Doxorubicin in patients with platinum-resistant ovarian cancer

2011年10月度プロトコール審査委員会承認: 2011年10月17日