

卵巣癌・子宮頸癌（進行・再発） 1st Line CBDCA+PTX（TC）療法

ケル目

患者ID: @PATIENTID

年齢: TIENTAGE 歳

患者氏名: @PATIENTNAME

性別: ATIENTSE

アルコールアレルギーの有無

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(m ²)
HEIGHT01_D	HEIGHT01_D	#VALUE!

投与スケジュール: 1コース: 21日間

使用薬剤: カルボプラチン 150mg/V、450mg/V (カルボプラチン; CBDCA)
パクリタキセル 30mg/V、100mg/V (パクリタキセル; PTX)

使用基準: class A

投与量: CBDCA投与量はAUCより算出

Cre値 (mg/dl)	目標AUC (mg·min/ml)
	5.0

Calvertの計算式: 投与量 (mg/body) = 目標AUC値 × (GFR+25)
GFRはCcrを代用して計算。

薬剤名・標準投与量	投与量	計算値 (mg)	投与量 (mg)
パクリタキセル 175~185mg/m ²	175 mg/m ²	#VALUE!	
カルボプラチン AUC 5~6mg·min/mL	上枠内入力	#VALUE!	

<< タイムスケジュール: 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

開始日: 8月6日 (木)

0時00分	内服 レスタミンコーワ錠 (10mg) 5錠 点滴直前に内服
	① 生理食塩液 50mL + ガスター 1A + デキサート 16.5mg 15分で点滴静注
0時15分	② 生理食塩液 100mL + グラニセトロン 1A 30分で点滴静注
day1 0時45分	③ 生理食塩液 500mL + パクリタキセル 0mg 0.22μ以下のフィルター一体型輸液セットを使用する 3時間で点滴静注 0.0mL
2時45分	内服 アプレピタントカプセル 125mg 1×(1) カルボプラチン開始 1時間前頃
3時45分	④ 5%ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン 0mg 60分で点滴静注 0.0mL
4時45分	⑤ 生理食塩液 50mL フラッシュ 15分で点滴静注

day2~3 8月7日 (金) ~ 8月8日 ###

起床後 **内服** アプレピタントカプセル 80mg 1×(2) 起床後

REFERENCE

Andreas du Bois, Hans-Joachim Luck, Werner Meier, et al
A randomized clinical trial of cisplatin/paclitaxel versus carboplatin/paclitaxel as first-line treatment of ovarian cancer.
Journal of the National Cancer Institute 95: 1320-1330, 2003
第9回化学療法プロトコール審査委員会承認: 2009年8月6日