

# 前立腺癌（進行・再発） 去勢抵抗性前立腺癌 2nd line Cabazitaxel+PSL療法

( )コース目

患者ID : @PATIENTID

患者氏名 : @PATIENTNAME

アルコールアレルギー ※  
必ず有無を確認

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m <sup>2</sup> )
\$HEIGHT01_Doc	\$WEIGHT01_Doc	#VALUE!

投与スケジュール : 1コース21日

使用基準 : 開始時 ; class A、2回目以降 ; class B

感染症を合併または発熱を有し感染症の疑われる患者、肝機能障害のある患者禁忌  
発熱性好中球減少症またはGrade2以上の下痢、末梢神経障害等の副作用が出た場合、  
次コースから20mg/m<sup>2</sup>に減量する。  
適正使用ガイドに準じる。

## 《使用薬剤》

カバジタキセル : カバジタキセル点滴静注 (1V : 60mg)

投与量 :

薬剤	標準投与量	計算値 (mg)	投与量 (mg)	投与日
カバジタキセル	25 mg/m <sup>2</sup>	#VALUE!		1
プレドニン錠	10 mg/body		10	1~21

## 《タイムスケジュール : 開始時刻》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

day1	1月1日 (金)	0時00分	① 生理食塩液50mL + ホウリン 5mg + ガスター 20mg + デキサト 6.6mg 15分で点滴静注
		0時15分	② 生理食塩液 100mL 30分で点滴静注
		0時45分	③ 生理食塩液 250mL + カバジタキセル mg 1時間で点滴静注
			注) 点滴開始から10分間は点滴速度を遅めに設定し、全身状態を観察する 0.2μm or 0.22μmのフィルター一体型輸液セットを使用する
		1時45分	④ 生理食塩液 50mL (フラッシュ)

day 1	1月1日 (金)	~内服	【内服】プレドニン錠 (5mg) 2錠 2 x (21) 朝・昼食後
-------	----------	-----	---------------------------------------

## REFERENCE

- Johann Sebastian de Bono, Stephane Oudard, Mustafa Ozguroglu, et al: Lancet 2010;376:1147-54  
Prednisone plus cabazitaxel or mitoxantrone for metastatic castration-resistant prostate cancer progressing after docetaxel treatment: a randomised open-label trial
- Hirofumi Mukai, Shunji Takahashi, Masahiro Nozawa, et al: Cancer Chemother Pharmacol 2014;73:703-710  
Phase I dose-escalation and pharmacokinetic study (TED 11576) of cabazitaxel in Japanese patients with castration-resistant prostate cancer

2014年10月度化学療法プロトコール審査委員会承認 : 2014年10月20日