

# 膀胱・上部尿路 尿路上皮癌 BCG膀胱注療法

患者ID : @PATIENTID

1 コース目

患者氏名 : @PATIENTNAME

1コース : 4 2 日間

目標 : 1 ~ 2 コース

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m <sup>2</sup> )
HEIGHT01_Do	WEIGHT01_Dc	#VALUE!

使用薬剤 : カルメット・ゲラン菌 (BCG) : イムノブラダー膀胱注用 40mg/V

- ・BCG菌全身感染による菌血症に注意
- ・生菌のため、本剤に接した器具、容器は全て消毒すること。
- ・薬液注入後の最初の排尿液は別にし消毒後廃棄する。

薬剤	投与量	計算値	投与量 (mg)	投与日
イムノブラダー	40 mg/body		40	1, 8, 15, 22, 29, 36

## << タイムスケジュール >>

開始日 (Day1) : 1月1日 (日)

- ① 生理食塩液 40mL + イムノブラダー膀胱注用 40mg  
膀胱内にできるだけゆっくと注入し、2時間膀胱内に保持する。

1月8日 (日)

1月15日 (日)

1月22日 (日)

1月29日 (日)

2月5日 (日)

も同様に行う

## REFERENCE

- Takahiro Yoneyama, Chikara Ohyama, Atsushi Imai, et al:UROLOGY 71:1161-1165, 2008  
Low-dose instillation therapy with bacille Calmette-Guerin Tokyo 172 strain after transurethral resection:historical cohort study  
Shiro Hinotsu, Hideyuki Akaza, Shigeo Isaka, et al:UROLOGY 67:545-549, 2006  
Sustained prophylactic effect of intravesical bacille Calmette-Guerin for superficial bladder cancer: a smoothed hazard analysis  
in a randomized prospective study  
2011年化学療法プロトコル審査委員会承認 : 2011年5月9日