

膀胱 尿路上皮癌

Epi膀胱注療法

患者ID: @PATIENTID

コース目

患者氏名: @PATIENTNAME

1コース: 7日間

目標: 2~4コース

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(m ²)
HEIGHT01_Do	HEIGHT01_Dc	#VALUE!

使用薬剤: エピルビシン (EPI): エピルビシン塩酸塩注射用 50mg/V、10mg/V

薬剤	投与量	計算値	投与量(mg)	投与日
エピルビシン	60 mg/body		60	1~3

<< タイムスケジュール >>

開始日 (Day1): 1月1日 (土) ~ 1月3日 (月)

- ① 生理食塩液 40mL + エピルビシン注 **60mg**
膀胱腔内へ注入し、1~2時間把持する。

REFERENCE

- 新島端夫ほか: 泌尿紀要32 (9) 1986:1359-1369
共同研究によるエピルビシン (epirubicin EPI)の膀胱癌, 腎盂・尿管癌に対する第2相臨床試験成績
津島知靖ほか: 泌尿紀要 31 (12) 1985: 2215-2218
表在性膀胱腫瘍に対する4'-epi-Adriamycin膀胱腔内注入療法 (RandomizedStudy)
2011年化学療法プロトコル審査委員会承認: 2011年5月9日