

# HL/PTCL 再発又は難治性 Brentuximab Vedotin単独療法 85kg未満

患者ID : @PATIENTID

コース目

患者氏名 : @PATIENTNAME

1コース : 21日間

目標 : 16コース

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m <sup>2</sup> )
HEIGHT01_Do	HEIGHT01_Dc	#VALUE!

使用薬剤 : ブレンツキシマブ ベドチン (Brentuximab Vedotin) : ブレンツキシマブベドチン点滴静注用50mg

使用基準 : 再発又は難治性CD30陽性のホジキンリンパ腫、T細胞リンパ腫

※ **Infusion reaction**に要注意。Monitor装着によるVital signsのチェックを推奨。

※ **腫瘍崩壊症候群**に要注意 (血液中に大量の腫瘍細胞のある患者で初回投与後24時間以内に高頻度)

腎不全、高K血症、低Ca血症、高尿酸血症、高Al-P血症

開始後チェック事項 : 悪心発現した場合は次回より制吐剤併用を考慮。末梢神経障害の有無

薬剤	投与量	計算値	投与量 (mg)	投与日
ブレンツキシマブベドチン	1.8 mg/kg	#VALUE!		1

<< タイムスケジュール : 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

開始日 (Day1) : 1月1日 (金)

0時00分 ① 生理食塩液 50mL

15分で点滴静注

0時15分 ② 生理食塩液 100mL + ブレンツキシマブベドチン点滴静注用

0mg + 注射用水 20mL

30分で点滴静注

②終了後 ③ 生理食塩液 50mL

フラッシュ

## REFERENCE

Barbara Pro, Ranjana Advani, Pauline Brice, et al; J Clin Oncol 30:2190-2196. 2012.

Brentuximab Vedotin (SGN-35) in Patients With Relapsed or Refractory Systemic Anaplastic Large-Cell Lymphoma: Results of a Phase II Study

Ajay K. Gopal, Robert Chen, Scott E. Smith, et al; Blood 125:1236-1243. 2015.

Durable remissions in a pivotal phase 2 study of brentuximab vedotin in relapsed or refractory Hodgkin lymphoma

2015年10月度がん化学療法プロトコール審査委員会承認 : 2015年10月19日 更新 : 2020年2月10日