

悪性リンパ腫 再発又は難治性  
GEM単独療法

( )クール目

患者ID : @PATIENTID

患者氏名 : @PATIENTNAME

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m <sup>2</sup> )
\$HEIGHT01_Doc	\$WEIGHT01_Doc	#VALUE!

投与スケジュール: 1クール 28日。 day 1、8、15 に点滴。

使用薬剤: ゲムシタビン 200、1000 mg/V

使用基準: 開始時; class A。以降; class C。

投与量:

薬剤	標準投与量	計算値 (mg)	投与量 (mg)
ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	#VALUE!	

<< タイムスケジュール: 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

day1	6月11日 (木)	0時00分	① 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg 15分で点滴静注	
		0時15分	② 生理食塩液 100mL + ゲムシタビン 30分で点滴静注	mg
		0時45分	③ 生理食塩液 50mL フラッシュ	

day8 同様に行う  
day15

day22 --- 休 薬 ---

REFERENCE

Madelein Duvic, Rakhshandra Talpur, Sijin Wen et al: Clinical Lymphoma Myeloma Vol. 7, No. 1, 51-58, 2006  
Phase II evaluation of gemcitabine monotherapy for cutaneous T-Cell lymphoma  
2013年5月度化学療法プロトコール審査委員会承認: 2013年5月13日